

§ 初等变换

利用矩阵乘法表达矩阵的初等变换.

回顾: 矩阵的初等(行)变换 (3) } \Rightarrow 初等变换 (6)
 \hookrightarrow 矩阵的初等(列)变换 (3)

初等矩阵:

1) 交换单位矩阵的 i, j 行 (或 i, j 列)

$$S_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 0 & & 1 \\ & & & \ddots & \\ & & 1 & & 0 & & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \dots i\text{行} \\ \dots j\text{行} \end{matrix}$$

2) 将单位矩阵的第 i 行 (或 i 列) 乘以非零常数 λ .

$$D_i(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & \lambda & \\ & & & \ddots \end{pmatrix} \begin{matrix} i \end{matrix}$$

3) 将单位矩阵的第 j 行的 λ 倍加到第 i 行 (或 i 列的 λ 倍加到 j 列)

$$T_{ij}(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & \lambda & \\ & & & \ddots \end{pmatrix} \begin{matrix} i \\ j \end{matrix}$$

定理: 对矩阵作初等行变换, 相当于在矩阵的左边乘以一个相应的初等方阵

对矩阵作初等列变换, 相当于在矩阵的右边乘以一个相应的初等方阵

证: $A = (a_{ij})_{m \times n} = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_m \end{pmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \dots$

性质: 1) S_{ij} 对称且 $S_{ij}^{-1} = S_{ij}$.

2) $D_i(\lambda)$ 为对角阵 且 $D_i(\lambda)^{-1} = D_i(\lambda^{-1})$

3) $T_{ij}(\lambda)$ 为三角阵, 且 $T_{ij}(\lambda)^{-1} = T_{ij}(-\lambda)$

证: 显然 \square

$\S 3.3 \Rightarrow \forall A \Rightarrow \exists$ 初等方阵 P_1, P_2, \dots, P_s s.t.

$$P_s \cdots P_2 P_1 A = J$$

为阶梯形矩阵.

定理: $\forall A = (a_{ij})_{m \times n}$, \exists m 所初等方阵 P_1, P_2, \dots, P_s 和 n 所初等方阵 $Q_1 \cdots Q_t$

s.t.

$$P_s \cdots P_2 P_1 \cdot A \cdot Q_1 Q_2 \cdots Q_t = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

其中 r 为非负整数.

证: $B = (b_{ij})_{m \times n} = D_1 (a_{pq}^{-1}) S_{1p} A S_{1q}$

$$\begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix} = T_{m1}(-b_{m1}) \cdots T_{21}(-b_{21}) B T_{12}(-b_{12}) \cdots T_{1n}(-b_{1n})$$

重复

□

推论: $\forall A$, \exists 可逆方阵 P (m 阶) 和 Q (n 阶), 使得

$$PAQ = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

注: r 不依赖于 P, Q 的选取, 称为 A 的秩.

推论: 若 A 为 n 阶方阵, 则 A 可逆当且仅当 A 可以分解为一系列初等方阵的乘积.

证: $P_s \cdots P_1 A Q_1 \cdots Q_t = I$

$$\Rightarrow A = P_1^{-1} \cdots P_s^{-1} Q_t^{-1} \cdots Q_1^{-1}$$

□

推论: 若 A 为可逆矩阵, 则

(1) 可对 A 作一系列初等 行 变换 变为 最简形式 I .

(2) 也可以 $\cdots \cdots$ 列 $\cdots \cdots$

初等变换法 (求逆):

- $AX = I$ (i.e. $X = A^{-1}$)
- 设 $P_s \cdots P_1 A = I$, 其中 P_i 为初等变换.

$$\Rightarrow X = P_s \cdots P_1$$

算法: $(A, I) \xrightarrow{\text{行初等变换}} P_s \cdots P_1 (A, I) = (I, A^{-1}).$

类似的解 $AX = B.$

例: $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} = ?$

解: $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & 1 & -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{4}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & 1 \end{pmatrix}$$
$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} & -\frac{2}{4} & \frac{3}{4} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} & -\frac{2}{4} & \frac{3}{4} \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} & -\frac{1}{2} & \frac{3}{4} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{2} & \frac{3}{4} \end{pmatrix} \quad \square$$

分块矩阵的初等行(列)变换:

例: A 可逆, 则可验证:

$$\begin{pmatrix} I & 0 \\ -CA^{-1} & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D - CA^{-1}B \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & -A^{-1}B \\ 0 & I \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & 0 \\ C & D - CA^{-1}B \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} I & 0 \\ -CA^{-1} & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & -A^{-1}B \\ 0 & I \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & D - CA^{-1}B \end{pmatrix}$$

例(分块矩阵求逆): 设 A, B, I 为 n 阶方阵, $BA=0$. 则

$$\begin{pmatrix} I & A & I & 0 \\ B & I & 0 & I \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} I & A & I & 0 \\ 0 & I & -B & I \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} I & 0 & I+AB & A \\ 0 & I & -B & I \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} I & A \\ B & I \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} I+AB & A \\ -B & I \end{pmatrix}.$$