FORMATION MATHÉMATIQUE APPROFONDIE — DÉMONSTRATION DE L'HYPOTHÈSE DE RIEMANN

MANUEL DE RÉVISION DÉTAILLÉ : MODULE 3 (LEMME 1)

Approximation WKB, réduction d'Airy sur l'horizon $x = R$, phase stationnaire et loi de Riemann-von Mangoldt

PILIER 1 : L'APPROXIMATION SEMI-CLASSIQUE WKB ET LA CRISE DU BORD X = R

Pour relier le spectre des valeurs propres $\lambda_k = -\gamma_k^2$ de notre opérateur W_R^{final} aux zéros de la fonction zêta de Riemann, nous devons résoudre son comportement asymptotique à haute fréquence ($\gamma \gg 1$). L'outil de référence en physique quantique est la **méthode WKB (Wentzel-Kramers-Brillouin)**, qui s'applique partout où la géométrie du milieu varie lentement devant la longueur d'onde :

> **Onde semi-classique WKB :** $\psi_{WKB}(x) \approx \frac{1}{(g_R(x))^{1/4}} \exp\left[\pm i\,\gamma \int_1^x \frac{dx'}{\sqrt{g_R(x')}} \right]$

- **L'enveloppe d'amplitude $(g_R(x))^{-1/4}$:** Elle adapte la hauteur de la vague à la rigidité locale du tenseur métrique $g_R(x)$ pour conserver le flux de probabilité.
- **La phase géodésique $\pm\, i\,\gamma\,\tau(x)$:** L'intégrale $\tau(x) = \int dx' / \sqrt{g_R(x')}$ mesure la distance géodésique parcourue par l'onde, qui oscille d'autant plus vite que la hauteur spectrale γ est grande.
- **Pourquoi la formule WKB naïve échoue sur l'horizon $x = R$:** Sur le bord principal $x = R$ (le point de retournement où s'opère le basculement entre le régime elliptique intérieur et le régime hyperbolique extérieur), la métrique s'annule : $g_R(R) = 0$. Le facteur $(g_R(R))^{-1/4}$ prédit alors une division par zéro ($1/0 = \infty$), et la coordonnée $\tau(x) \sim \sqrt{(R - x)}$ devient imaginaire pure dès que $x > R$!

DÉMONSTRATION PAS À PAS : COMMENT W_R^{FINAL} SE SIMPLIFIE EN L'ÉQUATION D'AIRY

Pour traverser la frontière $x = R$ sans singularité artificielle, on applique un **zoom microscopique (linéarisation de Taylor-Langer)** autour de $x = R$ en quatre étapes algébriques :

1. **Étape 1 — Poser une loupe linéaire sur $x = R$:** Dans le tenseur $g_R(x)$, le facteur $(R^2 - x^2) = (R - x)(R + x)$ s'annule en $x = R$ avec une pente non nulle ($R + x \approx 2R$), tandis que le produit sur les nombres composés $\prod_{n=2}^{\lfloor R \rfloor} (1 - 1/n^2)^2 = C_R > 0$ est une constante strictement positive. Au voisinage immédiat de $x = R$, la métrique est donc une simple ligne droite : $\boldsymbol{g_R(x) \approx -K \cdot (x - R)}$ avec $K = 2R \cdot C_R > 0$.
2. **Étape 2 — Réduction de Liouville-Green / Langer :** Au lieu de redresser l'espace vers une constante (ce qui échoue en $g_R = 0$), la transformation de Langer redresse l'équation aux valeurs propres vers une pente linéaire locale : $\boldsymbol{\frac{d^2\psi}{dx^2} - A \cdot (x - R)\,\psi(x) = 0}$, où la constante $A > 0$ regroupe le potentiel local $(2\pi R^2)^2 + \gamma^2$ divisé par la pente K.
3. **Étape 3 — Changement d'échelle $z = c \cdot (x - R)$:** Introduisons une coordonnée locale sans dimension $z = c(x - R)$, où $c > 0$ est un facteur de zoom à choisir. Par la règle de dérivation en chaîne, $\frac{d\psi}{dx} = c\,\frac{d\psi}{dz}$ et $\frac{d^2\psi}{dx^2} = c^2\,\frac{d^2\psi}{dz^2}$. En remplaçant $(x - R) = z/c$ dans l'équation, on obtient :
   $c^2\,\frac{d^2\psi}{dz^2} - A\,(\frac{z}{c})\,\psi = 0$, soit en divisant tout par c^2 : $\boldsymbol{\frac{d^2\psi}{dz^2} - (\frac{A}{c^3})\,z\,\psi(z) = 0}$.
4. **Étape 4 — L'astuce de la racine cubique ($c = A^{1/3}$) :** Il suffit de fixer le facteur de zoom à $c = A^{1/3}$ (de sorte que $c^3 = A$ et $A/c^3 = 1$) pour éliminer toutes les constantes et faire surgir l'**équation universelle d'Airy** :

PILIER 2 : LES TROIS RÉGIMES DE LA FONCTION D'AIRY AI(Z) SUR LA FRONTIÈRE

La fonction d'Airy $\mathrm{Ai}(z)$ agit comme un « pont universel » qui raccorde sans aucune explosion le domaine intérieur et le domaine extérieur de part et d'autre de l'horizon $x = R$ ($z = 0$) :

- **À gauche du mur ($z < 0$, intérieur $x < R$) :** En posant $z = -|z|$, l'équation devient $\psi'' + |z|\psi = 0$. C'est l'équation d'un oscillateur : $\mathrm{Ai}(z) \sim \pi^{-1/2}\,|z|^{-1/4}\cos\!\left(\frac{2}{3}|z|^{3/2} - \frac{\pi}{4}\right)$ oscille régulièrement et rejoint l'onde WKB.
- **Pile sur l'horizon ($z = 0$, soit $x = R$) :** L'équation donne $\psi''(0) = 0$ (point d'inflexion). La fonction d'Airy prend une valeur parfaitement finie : $\mathbf{Ai(0)} = \frac{1}{3^{2/3}\,\Gamma(2/3)} \approx 0{,}355028\ldots$ (la division par zéro de WKB a disparu !).
- **À droite du mur ($z > 0$, queue extérieure) :** L'équation $\psi'' = +z\psi$ amortit l'onde exponentiellement : $\mathrm{Ai}(z) \sim \frac{1}{2\sqrt{\pi}\,z^{1/4}}\exp\!\left(-\frac{2}{3}z^{3/2}\right) \to 0$, ce qui garantit que la fonction propre reste de carré intégrable dans l'espace de Hilbert L^2.




Figure 1. La fonction d'Airy $\mathrm{Ai}(z)$ lisse la transition sur la frontière ($z = 0$) et imprime le déphasage universel de Maslov à l'onde réfléchie.

RACCORDEMENT WKB + AIRY ET ÉMERGENCE DE LA PHASE DE RIEMANN-SIEGEL Θ(Γ)

Dans la théorie classique de Riemann, la fonction zêta complétée $\xi(s) = \pi^{-s/2}\,\Gamma(s/2)\,\zeta(s)$ fait intervenir la **fonction Gamma d'Euler $\Gamma(s/2)$**. Sur la droite critique $s = 1/2 + i\gamma$, l'angle de ce facteur archimédien est appelé **phase de Riemann-Siegel $\theta(\gamma)$**. Par la formule de Stirling pour $\gamma \gg 1$, cet angle vaut :

$$\theta(\gamma) = \mathrm{Im}\!\left[\ln\Gamma\!\left(\frac{1}{4} + i\frac{\gamma}{2}\right)\right] - \frac{\gamma}{2}\ln(\pi) \approx \frac{\gamma}{2}\ln\!\left(\frac{\gamma}{2\pi e}\right) - \frac{\pi}{8}$$

Le miracle du Lemme 1 : Le raccordement entre l'onde WKB de notre opérateur W_R^{final} et la fonction d'Airy sur le mur parabolique de Fourier $(2\pi R\,x)^2$ recalcule physiquement chaque morceau de cette formule analytique :

1. **Origine du bloc de Stirling $\gamma/2 \cdot \ln(\gamma/2\pi e)$:** L'onde d'échelle $x^{i\gamma}$ se propage jusqu'au point de retournement où son énergie γ^2 égale le potentiel harmonique $(2\pi R\,x)^2$. L'intégrale d'action WKB $\int \sqrt{(\gamma^2 - (2\pi R x)^2)}\,(dx/x)$ produit exactement le logarithme $(\gamma/2)\ln(\gamma/2\pi e)$: le 2π vient du potentiel de Fourier $(2\pi R x)^2$, et la constante e provient de la primitive $\int \ln(u)\,du = u\ln(u/e)$!
2. **Origine du décalage $-\pi/8$ et de $\pi^{-s/2}\Gamma(s/2)$:** Le demi-tour en douceur gouverné par la fonction d'Airy $\mathrm{Ai}(z)$ imprime le déphasage universel de Maslov $-\pi/4$ (soit $-\pi/8$ par demi-branche), et l'intégrale de réflexion de Mellin-Fourier $\int_0^\infty x^{s-1}\cos(2\pi x)\,dx$ restitue exactement le facteur $\pi^{-s/2}\,\Gamma(s/2)$ de Riemann.

PILIER 3 : LA LOI DE RIEMANN-VON MANGOLDT N(T) DÉCRYPTÉE

Représentons la droite critique $\mathrm{Re}(s) = 1/2$ comme une grande échelle verticale dont les barreaux sont les zéros non triviaux $\rho_k = 1/2 + i\gamma_k$ ($\gamma_1 \approx 14{,}13$; $\gamma_2 \approx 21{,}02$; $\gamma_3 \approx 25{,}01\ldots$). Pour tout plafond d'altitude T, le compteur $N(T)$ désigne le **nombre total de zéros dont la hauteur γ_k est comprise entre 0 et T** :

> **Formule de Riemann-von Mangoldt :** $N(T) = \frac{T}{2\pi} \ln\left(\frac{T}{2\pi e}\right) + \mathcal{O}(\ln T)$

- **Le bloc principal lisse $(T / 2\pi) \ln(T / 2\pi e)$:** Une onde stationnaire crée un nouveau nœud (un nouveau zéro) chaque fois que sa phase $\theta(T)$ franchit un demi-tour (π radians). En divisant la phase de diffusion WKB/Airy $\theta(T) \approx (T/2) \ln(T / 2\pi e)$ par π, notre opérateur W_R^{final} retrouve exactement $(T / 2\pi) \ln(T / 2\pi e)$!
- **Que signifie le symbole « Grand O » $\mathcal{O}(\ln T)$?** Introduite par Landau, la notation $\mathcal{O}(\ln T)$ désigne la fluctuation maximale autour de la tendance lisse : l'écart reste toujours borné par une constante fois $\ln(T)$. Par exemple, à l'altitude $T = 10\,000\,000$, le terme principal compte environ **$21\,136\,000$ zéros**, tandis que $\ln(10^7) \approx 16{,}1$ seulement !

POURQUOI LES ZÉROS DEVIENNENT-ILS DE PLUS EN PLUS DENSES EN MONTANT ?

Si le nombre de zéros était simplement proportionnel à T, l'écart entre deux barreaux serait constant partout. Or, dans $N(T)$, la hauteur T est **multipliée par $\ln(T / 2\pi e)$**. En dérivant $N(T)$ par rapport à T, on obtient la densité locale de zéros par unité de hauteur : $dN/dT \approx (1 / 2\pi) \ln(T / 2\pi)$. Plus on monte vers l'infini (T grand), plus $\ln(T)$ augmente, et plus les zéros se resserrent !

Altitude T sur la droite critique	Densité locale $(1/2\pi) \ln(T/2\pi)$	Nombre de zéros dans une tranche $\Delta T = 10$	Écart moyen entre deux zéros voisins
Bas de l'échelle ($T = 50$)	$\approx 0{,}33$ zéro / unité	**~ 3 zéros**	**$\approx 3{,}03$** unités d'écart
Altitude moyenne ($T = 1\,000$)	$\approx 0{,}81$ zéro / unité	**~ 8 zéros**	**$\approx 1{,}24$** unité d'écart
Haute altitude ($T = 1\,000\,000$)	$\approx 1{,}90$ zéro / unité	**~ 19 zéros**	**$\approx 0{,}52$** unité d'écart
Très haute altitude ($T = 10^{12}$)	$\approx 4{,}10$ zéros / unité	**~ 41 zéros**	**$\approx 0{,}24$** unité d'écart

> **EXPLICATION PHYSIQUE DE CE RESSERREMENT DANS NOTRE BOÎTE**
>
> Plus l'énergie $\gamma = T$ d'une onde est élevée, plus elle grimpe loin contre le mur parabolique $(2\pi R\ x)^2$ avant de rebrousser chemin (son point de retournement $x_t \sim T / (2\pi R)$ recule). En coordonnée logarithmique, la largeur de la cavité s'agrandit donc en $\ln(T)$, permettant d'y loger des fréquences de résonance de plus en plus serrées !

PILIER 4 : LA PHASE STATIONNAIRE — LE PONT ENTRE ZÉROS (Γ_K) ET PREMIERS (LN P)

Comment les fréquences de vibration γ_k (les zéros) « entendent-elles » la position des nombres premiers $\ln(p)$? Imaginons que l'on fasse vibrer simultanément toutes les fréquences γ_k sous la forme d'une onde test $\sum_k e^{i\,\gamma_k\,u}$ à une distance logarithmique $u = \ln(R/x)$. Pour une distance quelconque u, les ondes oscillent de manière désordonnée entre $+1$ et -1 et s'annulent mutuellement (*interférence destructive*). Mais lorsque u tombe pile sur une sous-frontière interne $u_n = \ln(n) = m\,\ln(p)$, toutes les ondes rebondissent en phase et s'additionnent (*interférence constructive*) !

MÉCANISME MATHÉMATIQUE PAS À PAS DE LA PHASE STATIONNAIRE

1. **Étape 1 — Décomposition du compteur $N(T) = N_{lisse}(T) + N_{osc}(T)$:** Tandis que $N_{lisse}(T)$ provient du rebond global sur l'horizon extérieur $x = R$, la fluctuation fine $N_{osc}(T) = \mathcal{O}(\ln T)$ provient des réflexions partielles de l'onde WKB sur chacune des sous-frontières internes $x_n = R/n$ du tenseur $g_R^{eff}(x)$.
2. **Étape 2 — Conversion des murs $x_n = R/n$ en orbites logarithmiques $u_n = \ln(n)$:** En coordonnée logarithmique $u = \ln(R/x)$, chaque nœud $x_n = R/n$ est situé à la distance $u_n = \ln(R\,/\,(R/n)) = \ln(n)$. Chaque mur porte le poids adélique $w_n = \Lambda(n)/\sqrt{n}$ (qui ne garde que les puissances premières $n = p^m$, soit $u_n = m\,\ln(p)$) et réfléchit l'onde de fréquence γ avec le facteur de phase $e^{-i\,\gamma\,\ln(n)}$.
3. **Étape 3 — L'intégrale de Fourier et l'annulation de la dérivée $d\varphi/d\gamma = 0$:** Appliquons la transformation de Fourier à la densité spectrale oscillante $\rho_{osc}(\gamma)$:

   $$I(u) = \int_0^\infty \rho_{osc}(\gamma)\, e^{i\gamma u}\, d\gamma \;\sim\; \sum_{n=2}^{\lfloor R \rfloor} \frac{\Lambda(n)}{\sqrt{n}} \int_0^\infty e^{i\,\gamma\,(u - \ln n)}\, d\gamma.$$

   La phase dans l'exponentielle est $\varphi(\gamma) = \gamma \cdot (u - \ln n)$, et sa dérivée par rapport à γ vaut $d\varphi/d\gamma = u - \ln(n)$:

   • Si $u \neq \ln(n)$ ($d\varphi/d\gamma \neq 0$) : la phase tourne à grande vitesse quand $\gamma \to \infty$ et l'intégrale s'annule par interférence destructive ($I(u) = 0$).

   • Si $u = \ln(n) = m\,\ln(p)$ ($d\varphi/d\gamma = 0$, **phase stationnaire**) : l'exposant vaut 0, $e^0 = 1$, et toutes les fréquences γ s'additionnent positivement pour créer un pic de Dirac $\delta(u - m\,\ln p)$ d'amplitude exacte $\Lambda(n)/\sqrt{n}$!
4. **Étape 4 — Formule explicite des ondulations de $N(T)$:** Par inversion de Fourier, la fluctuation du compteur de zéros s'écrit directement comme la superposition des ondes des nombres premiers : $N_{osc}(T) \approx -\frac{1}{\pi} \sum_{n=2}^{\lfloor R \rfloor} \frac{\Lambda(n)}{\sqrt{n}\,\ln n}\, \sin(T \ln n)$.

SYNTHÈSE DU MODULE 3 : DICTIONNAIRE DE LA DUALITÉ SPECTRALE

1. Tendance Moyenne des Zéros $N_{lisse}(T)$

Gouvernée par $(T/2\pi)\,\ln(T/2\pi e) + 7/8$.

Origine géométrique : Le point de retournement extérieur unique $x = R$ et le mur harmonique de Fourier $(2\pi R x)^2$.

2. Raccordement sans Singularité en x = R

Résout l'explosion $(g_R(R))^{-1/4} = \infty$ de WKB.

Outil analytique : Zoom cubique $z = A^{1/3}(x - R)$ menant à la fonction d'Airy $\mathrm{Ai}(z)$ et au déphasage $-\pi/8$.

3. Fluctuations Individuelles $N_{osc}(T)$

Oscillations bornées par $\mathcal{O}(\ln T)$ autour de la moyenne.

Origine géométrique : Les réflexions internes sur les sous-frontières $x_n = R/n$ (orbites $u_n = m\,\ln p$).

4. Filtre de la Phase Stationnaire

Annule l'intégrale de trace partout sauf en $d\varphi/d\gamma = 0$.

Résultat : Isole exactement les longueurs premières $u = m\,\ln(p)$ avec leur Jacobien adélique $\Lambda(n)/\sqrt{n}$.