

Lista de Exercícios – Análise de Desempenho
Prof. Flavio Barbieri Gonzaga

1 – Sempre que um experimento é realizado, a ocorrência de um particular evento A é igual a 0,3. O experimento é repetido independentemente, até que A ocorra. Calcule a probabilidade de que seja necessário repetir o experimento até a quarta vez. Qual o tipo de variável aleatória caracteriza tal experimento? Calcule o valor esperado e a variância desse experimento.

2 – Considere uma prova de múltipla escolha contendo 5 questões, sendo cada questão com 5 alternativas (a, b, c, d, e). Assuma ainda que em cada questão apenas uma alternativa seja correta.

Considere agora um aluno fazendo essa prova, onde ele pode ou não ter estudado o conteúdo cobrado nas questões. Se o aluno tiver estudado o conteúdo da questão, ele a acertará com certeza. Caso o aluno não tenha estudado o conteúdo da questão, ele “chutará” uma dentre as 5 alternativas possíveis (a, b, c, d, e).

Para cada questão da prova, a chance de que o aluno tenha estudado o conteúdo relacionado é de 60%.

Considerando as informações acima, responda:

a) Suponha que uma questão seja escolhida aleatoriamente, qual a chance de que o aluno a acerte? Observe que a pergunta faz menção a apenas uma questão, não se preocupando em como será o desempenho do aluno nas demais questões da prova.

b) Ao fazer toda a prova, qual a chance de que o aluno acerte exatamente 3 questões (e portanto, erre as outras 2)?

3 – Considerando que a quantidade de mensagens que entram em um canal de comunicação siga uma distribuição de Poisson com taxa média igual a 0,8 por segundo. Compute as probabilidades dos seguintes eventos:

a) Exatamente 2 mensagens chegarem em um intervalo de 3 segundos;

b) 3 ou mais mensagens chegarem em um intervalo de 4 segundos.

4 – Sejam A e B dois eventos associados a um experimento. Suponha que $P(A) = 0,4$, enquanto que $P(A \cup B) = 0,7$. Seja $P(B) = p$.

a) Para que valor de p, A e B serão mutuamente exclusivos?

b) Para que valor de p, A e B serão independentes?

5 – Duas válvulas defeituosas se misturam com duas válvulas que funcionam corretamente. As válvulas são testadas, uma a uma, até que ambas as defeituosas sejam encontradas.

a) Qual é a probabilidade de que a última válvula defeituosa seja encontrada no segundo teste?

b) Qual é a probabilidade de que a última válvula defeituosa seja encontrada no terceiro teste?

c) Qual é a probabilidade de que a última válvula defeituosa seja encontrada no quarto teste?

d) Some os números obtidos nas letras (a), (b) e (c) e comente o resultado encontrado.

6 – Em uma fábrica de conectores RJ-45, as máquinas A, B e C produzem 30, 45 e 25 por cento do total produzido respectivamente. Da produção de cada máquina, 5, 4 e 2 por cento, respectivamente, são conectores defeituosos. Escolhe-se um conector ao acaso, e verifica-se ser defeituoso. Qual a probabilidade que ele tenha vindo da máquina A? E da máquina B? E da máquina C?

Bons estudos! =)