MVP(Minimum Viable Product)





COVID-19

Sintomas

Os principais sintomas da COVID-19 incluem febre, tosse, fadiga, dificuldade respiratória, dor no corpo, perda de paladar e olfato, dor de garganta, congestão nasal, náusea, vômito e diarreia

Transmissão

A COVID-19 é transmitida principalmente por gotículas respiratórias expelidas ao tossir, espirrar ou falar. O contato próximo com pessoas infectadas e o toque em superfícies contaminadas também são meios de transmissão. Medidas como distanciamento social, uso de máscaras e higiene das mãos ajudam a reduzir o risco de propagação.

Prevenção

Para prevenir a COVID-19, vacine-se, use máscaras, lave as mãos, mantenha distância, evite contatos próximos, escolha ambientes ventilados, monitore sintomas, isole-se se infectado e desinfete superfícies tocadas frequentemente medidas reduzem o risco de infepropagação do vírus.

DENGUE

Sintomas

A dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Os sintomas incluem febre alta, dores no corpo, dor de cabeça, fraqueza, dor atrás dos olhos, erupção cutânea e coceira. A infecção pode ser assintomática, leve ou grave, podendo levar à morte. Náuseas, vômitos e perda de peso também podem ocorrer.

Transmissão

A dengue é principalmente transmitida pela picada dos mosquitos Aedes aegypti. Além disso, há registros de transmissão vertical (de gestante para bebê) e por transfusão de sangue. Existem quatro tipos de vírus do dengue: DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4.

Prevenção

Prevenir a dengue envolve eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti, mantendo o domicílio limpo. O uso de repelentes e inseticidas, conforme as instruções do rótulo, é recomendado. Mosquiteiros são eficazes para p quem dorme durante o dia, como pessoas acamadas e trabalhadores noturnos.

HIV

Sintomas

O HIV pode não apresentar sintomas imediatos, mas à medida que progride para AIDS, podem ocorrer febre, fadiga, suores noturnos, perda de peso, gânglios inchados, diarreia, infecções oportunistas, lesões na pele e tosse persistente. Diagnóstico precoce é crucial para tratamento eficaz. Em caso de preocupações com o HIV, procure orientação médica e teste.

Transmissão

O HIV é transmitido principalmente por relações sexuais desprotegidas, compartilhamento de agulhas, transmissão vertical de mãe para filho, transfusão de sangue não testado (raro atualmente), contato com instrumentos médicos não esterilizados e contato direto com sangue ou fluidos corporais contaminados. A prevenção envolve o uso de preservativos, não compartilhamento de agulhas, testes regulares e acesso ao tratamento aptirretroviral

Prevenção

A prevenção do HIV envolve prantochave. Utilizar preservativos em todas as
relações sexuais é essencial, assim como
evitar o compartilhamento de agulhas. A
realização de testes regulares é
fundamental para detecção precoce,
permitindo o acesso a tratamento
antirretroviral, se necessário. Mulheres
grávidas devem receber cuidados médicos
adequados para evitar a transmissão
vertical. Essas medidas são cruciais para
prevenir a propagação do HIV e promover
uma vida saudável.



ATENDIMENTO



Hospital Universitário Av. Robert Koch, 60 Operária Londrina - PR

Aberto 24 Horas



UPA Sabará Av. Arthur Thomas, 2390 Jardim Novo Sabara Londrina - PR

Aberto 24 Horas

