

## Sistemas ortogonales: factores de escala, métrica y vectores base unitarios

En un sistema ortogonal  $q^1, q^2, q^3$  con radio-vector  $\mathbf{r} = \mathbf{r}(q^1, q^2, q^3)$ :

$$h_i = \|\partial_i \mathbf{r}\|, \quad \hat{e}_i = \frac{1}{h_i} \partial_i \mathbf{r}, \quad g_{ij} = \partial_i \mathbf{r} \cdot \partial_j \mathbf{r}, \quad ds^2 = \sum_i h_i^2 (dq^i)^2 \quad (\text{si es ortogonal}).$$

### (a) Coordenadas cilíndricas parabólicas $(u, v, \varphi)$

Definición del cambio:

$$x = uv \cos \varphi, \quad y = uv \sin \varphi, \quad z = \frac{u^2 - v^2}{2}.$$

Es decir,

$$\mathbf{r}(u, v, \varphi) = (uv \cos \varphi, uv \sin \varphi, \frac{u^2 - v^2}{2}).$$

**Explicación (cálculo de  $h_i$ ).** Primero derivamos:

$$\partial_u \mathbf{r} = (v \cos \varphi, v \sin \varphi, u), \quad \partial_v \mathbf{r} = (u \cos \varphi, u \sin \varphi, -v), \quad \partial_\varphi \mathbf{r} = (-uv \sin \varphi, uv \cos \varphi, 0).$$

Luego tomamos sus normas:

$$\begin{aligned} \|\partial_u \mathbf{r}\|^2 &= v^2(\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) + u^2 = u^2 + v^2, & \|\partial_v \mathbf{r}\|^2 &= u^2 + v^2, \\ \|\partial_\varphi \mathbf{r}\|^2 &= (uv)^2(\sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi) = (uv)^2. \end{aligned}$$

Por tanto

$$\boxed{h_u = \sqrt{u^2 + v^2}, \quad h_v = \sqrt{u^2 + v^2}, \quad h_\varphi = |uv|}.$$

(En la práctica se suele escribir  $h_\varphi = uv$  asumiendo  $uv \geq 0$ ; por definición, los factores son positivos.)

**Explicación (por qué los cruzados son cero).** Verificamos los productos punto cruzados:

$$\partial_u \mathbf{r} \cdot \partial_v \mathbf{r} = uv(\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) - uv = 0,$$

$$\partial_u \mathbf{r} \cdot \partial_\varphi \mathbf{r} = -uv^2 \cos \varphi \sin \varphi + uv^2 \sin \varphi \cos \varphi = 0,$$

$$\partial_v \mathbf{r} \cdot \partial_\varphi \mathbf{r} = -u^2 v \sin \varphi \cos \varphi + u^2 v \cos \varphi \sin \varphi = 0.$$

Al ser todos cero, el sistema es ortogonal y la métrica es diagonal.

**Métrica (elemento de línea).**

$$\boxed{ds^2 = (u^2 + v^2) du^2 + (u^2 + v^2) dv^2 + (uv)^2 d\varphi^2}.$$

Equivalente a:

$$\boxed{g_{uu} = u^2 + v^2, \quad g_{vv} = u^2 + v^2, \quad g_{\varphi\varphi} = (uv)^2, \quad g_{uv} = g_{u\varphi} = g_{v\varphi} = 0}.$$

**Vectores base unitarios.**

$$\hat{e}_u = \frac{(v \cos \varphi, v \sin \varphi, u)}{\sqrt{u^2 + v^2}}, \quad \hat{e}_v = \frac{(u \cos \varphi, u \sin \varphi, -v)}{\sqrt{u^2 + v^2}}, \quad \hat{e}_\varphi = \frac{(-uv \sin \varphi, uv \cos \varphi, 0)}{|uv|}.$$

**(b) Coordenadas hiperbólicas  $(u, v, \varphi)$**

Definición del cambio:

$$x = \cosh u \cos v \cos \varphi, \quad y = \cosh u \cos v \sin \varphi, \quad z = \sinh u \sin v.$$

Es decir,

$$\mathbf{r}(u, v, \varphi) = (\cosh u \cos v \cos \varphi, \cosh u \cos v \sin \varphi, \sinh u \sin v).$$

**Explicación (cálculo de  $h_i$ ).** Derivadas:

$$\partial_u \mathbf{r} = (\sinh u \cos v \cos \varphi, \sinh u \cos v \sin \varphi, \cosh u \sin v),$$

$$\partial_v \mathbf{r} = (-\cosh u \sin v \cos \varphi, -\cosh u \sin v \sin \varphi, \sinh u \cos v),$$

$$\partial_\varphi \mathbf{r} = (-\cosh u \cos v \sin \varphi, \cosh u \cos v \cos \varphi, 0).$$

Normas:

$$\|\partial_u \mathbf{r}\|^2 = \sinh^2 u \cos^2 v + \cosh^2 u \sin^2 v, \quad \|\partial_v \mathbf{r}\|^2 = \cosh^2 u \sin^2 v + \sinh^2 u \cos^2 v,$$

$$\|\partial_\varphi \mathbf{r}\|^2 = (\cosh u \cos v)^2.$$

Luego,

$$h_u = h_v = \sqrt{\sinh^2 u \cos^2 v + \cosh^2 u \sin^2 v}, \quad h_\varphi = \cosh u \cos v.$$

**Explicación (por qué los cruzados son cero).** Productos cruzados representativos:

$$\partial_u \mathbf{r} \cdot \partial_v \mathbf{r} = -\sinh u \cosh u \cos v \sin v (\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) + \cosh u \sinh u \sin v \cos v = 0,$$

$$\partial_u \mathbf{r} \cdot \partial_\varphi \mathbf{r} = -\sinh u \cosh u \cos^2 v (\cos \varphi \sin \varphi - \sin \varphi \cos \varphi) = 0,$$

$$\partial_v \mathbf{r} \cdot \partial_\varphi \mathbf{r} = \cosh^2 u \sin v \cos v (\cos \varphi \sin \varphi - \sin \varphi \cos \varphi) = 0.$$

Por lo tanto la métrica es diagonal.

**Métrica (elemento de línea).**

$$ds^2 = (\sinh^2 u \cos^2 v + \cosh^2 u \sin^2 v) (du^2 + dv^2) + (\cosh u \cos v)^2 d\varphi^2.$$

Equivalente a:

$$g_{uu} = g_{vv} = \sinh^2 u \cos^2 v + \cosh^2 u \sin^2 v, \quad g_{\varphi\varphi} = (\cosh u \cos v)^2, \quad g_{uv} = g_{u\varphi} = g_{v\varphi} = 0.$$

**Vectores base unitarios.**

$$\hat{e}_u = \frac{\partial_u \mathbf{r}}{h_u}, \quad \hat{e}_v = \frac{\partial_v \mathbf{r}}{h_v}, \quad \hat{e}_\varphi = \frac{\partial_\varphi \mathbf{r}}{\cosh u \cos v}.$$