DOSSIER TECHNIQUE COMMUN (CTD) - MODULE 1 & 2 SYNTHÈSE

Bronchoclar (Roflumilast micronisé) - Comprimé pelliculé (500 µg)

N° Enregistrement :	FR/H/0890/001	**Procédure :**	Autorisé (Procédure Reconnaissance Mutuelle FR/H/0890/001)
Titulaire AMM :	PharmaNova SA	**Date d'octroi :**	2021-04-12
ATC Code :	R03DX07	**Aire :**	Pneumologie / Respiratoire
Site Maître Qualité :	Chalon-sur-Saône (FR)	**Pharmacien QP :**	M. François Mercier

1. MODULE 1 - INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET DE PRESCRIPTION

1.1 Résumé des Caractéristiques du Produit (SmPC/RCP) : Le produit Bronchoclar est indiqué dans : Traitement d'entretien de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) sévère associée à une bronchite chronique chez l'adulte avec exacerbations fréquentes, en complément des bronchodilatateurs.. La posologie recommandée est de 1 comprimé de 500 µg une fois par jour avec un verre d'eau, débuté éventuellement par une dose d'initiation à 250 µg pendant 28 jours..

1.2 Contre-indications majeures : Insuffisance hépatique modérée à sévère (Child-Pugh B ou C), antécédents d'épisodes dépressifs sévères avec comportement suicidaire.

1.3 Plan de Gestion des Risques (PGR / RMP) : Version en vigueur 3.2 validée par l'EMA/PRAC. Surveillance spécifique sur : Idées et comportements suicidaires, amaigrissement morbide, troubles psychiatriques sévères..

2. MODULE 2 - VUE D'ENSEMBLE GLOBALE ET RAPPORTS D'EXPERTS

2.3 Résumé Global de la Qualité (QOS) : La substance active répond rigoureusement aux monographies de la Pharmacopée Européenne. Le procédé de fabrication garantit une teneur en principe actif entre 95.0% et 105.0% et un profil de substances apparentées conforme aux seuils ICH Q3A.

2.4 Vue d'Ensemble Non-Clinique : Les études de toxicité à doses répétées (6 mois chez le rongeur et 9 mois chez le non-rongeur) n'ont mis en évidence aucun signal de génotoxicité ni de potentiel carcinogène aux marges d'exposition thérapeutique.

2.5 Vue d'Ensemble Clinique : L'efficacité a été démontrée dans des essais de phase III pivotaux randomisés en double aveugle. Le profil de tolérance montre comme événements les plus fréquents : Perte de poids involontaire (8.2%), diarrhée motrice transitoire (7.5%), diminution de l'appétit, insomnie.. Le rapport bénéfice/risque global demeure très favorable dans l'indication revendiquée.

ÉTABLI PAR	VÉRIFIÉ PAR	APPROUVÉ PAR (QP / Directoire)
Nom : Mme Christine Baudry **Titre :** Directrice Globale des Affaires Réglementaires (VP RA) **Date :** 10/01/2024	**Nom :** M. Julien Tavernier **Titre :** Manager Affaires Réglementaires Europe (Procédures Centralisées) **Date :** 10/01/2024	**Nom :** M. François Mercier **Titre :** Directeur Qualité Groupe & Pharmacien Responsable (VP QA / QP) **Date :** 10/01/2024
Signature : *[Signé électroniquement via DocuSign GxP 21 CFR Part 11]*	**Signature :** *[Signé électroniquement via DocuSign GxP 21 CFR Part 11]*	**Signature :** *[Signé électroniquement via DocuSign GxP 21 CFR Part 11]*

CONFIDENTIEL - Ce document est la propriété exclusive de PharmaNova SA. Reproduction et diffusion interdites sans accord écrit.