DOSSIER TECHNIQUE COMMUN (CTD) - MODULE 1 & 2 SYNTHÈSE

Immunolin (Secukirumab) - Solution injectable en seringue préremplie avec protège-aiguille (150 mg / 1.0 mL)

N° Enregistrement :	EU/1/19/1402/001	**Procédure :**	Autorisé (AMM Centralisée - Biomédicament)
Titulaire AMM :	PharmaNova SA	**Date d'octroi :**	2019-11-20
ATC Code :	L04AC16	**Aire :**	Immunologie
Site Maître Qualité :	Chalon-sur-Saône (FR)	**Pharmacien QP :**	M. François Mercier

1. MODULE 1 - INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET DE PRESCRIPTION

1.1 Résumé des Caractéristiques du Produit (SmPC/RCP) : Le produit Immunolin est indiqué dans : Psoriasis en plaques modéré à sévère chez l'adulte éligible à un traitement systémique ; Rhumatisme psoriasique actif.. La posologie recommandée est de 300 mg en injection sous-cutanée (2 injections de 150 mg) aux semaines 0, 1, 2, 3 et 4, puis dose d'entretien mensuelle..

1.2 Contre-indications majeures : Infections actives graves (tuberculose évolutive, sepsis fongique, herpès disséminé), hypersensibilité au latex du capuchon de seringue.

1.3 Plan de Gestion des Risques (PGR / RMP) : Version en vigueur 3.2 validée par l'EMA/PRAC. Surveillance spécifique sur : Exacerbation sévère de maladie inflammatoire chronique de l'intestin (Crohn/RCH), choc anaphylactique systémique..

2. MODULE 2 - VUE D'ENSEMBLE GLOBALE ET RAPPORTS D'EXPERTS

2.3 Résumé Global de la Qualité (QOS) : La substance active répond rigoureusement aux monographies de la Pharmacopée Européenne. Le procédé de fabrication garantit une teneur en principe actif entre 95.0% et 105.0% et un profil de substances apparentées conforme aux seuils ICH Q3A.

2.4 Vue d'Ensemble Non-Clinique : Les études de toxicité à doses répétées (6 mois chez le rongeur et 9 mois chez le non-rongeur) n'ont mis en évidence aucun signal de génotoxicité ni de potentiel carcinogène aux marges d'exposition thérapeutique.

2.5 Vue d'Ensemble Clinique : L'efficacité a été démontrée dans des essais de phase III pivotaux randomisés en double aveugle. Le profil de tolérance montre comme événements les plus fréquents : Rhinopharyngite (12.3%), candidose cutanéo-muqueuse (4.5%), céphalées, prurit au site d'injection.. Le rapport bénéfice/risque global demeure très favorable dans l'indication revendiquée.

ÉTABLI PAR	VÉRIFIÉ PAR	APPROUVÉ PAR (QP / Directoire)
Nom : Mme Christine Baudry **Titre :** Directrice Globale des Affaires Réglementaires (VP RA) **Date :** 10/01/2024	**Nom :** M. Julien Tavernier **Titre :** Manager Affaires Réglementaires Europe (Procédures Centralisées) **Date :** 10/01/2024	**Nom :** M. François Mercier **Titre :** Directeur Qualité Groupe & Pharmacien Responsable (VP QA / QP) **Date :** 10/01/2024
Signature : *[Signé électroniquement via DocuSign GxP 21 CFR Part 11]*	**Signature :** *[Signé électroniquement via DocuSign GxP 21 CFR Part 11]*	**Signature :** *[Signé électroniquement via DocuSign GxP 21 CFR Part 11]*

CONFIDENTIEL - Ce document est la propriété exclusive de PharmaNova SA. Reproduction et diffusion interdites sans accord écrit.