DOSSIER TECHNIQUE COMMUN (CTD) - MODULE 1 & 2 SYNTHÈSE

Tremopan (Safinamide mésylate / Lévodopa retard) - Gélule à libération prolongée (100 mg / 200 mg)

N° Enregistrement :	EU/1/20/1445/001	**Procédure :**	Autorisé (AMM Centralisée)
Titulaire AMM :	PharmaNova SA	**Date d'octroi :**	2020-11-19
ATC Code :	N04BA05	**Aire :**	Neurologie
Site Maître Qualité :	Chalon-sur-Saône (FR)	**Pharmacien QP :**	M. François Mercier

1. MODULE 1 - INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET DE PRESCRIPTION

1.1 Résumé des Caractéristiques du Produit (SmPC/RCP) : Le produit Tremopan est indiqué dans : Traitement de la maladie de Parkinson idiopathique chez les patients fluctuants sous lévodopa seule ou associée.. La posologie recommandée est de 1 gélule une fois par jour le matin, avalée entière sans être croquée..

1.2 Contre-indications majeures : Traitement concomitant par IMAO non sélectifs ou péthidine, rétinopathie pigmentaire ou antécédents de décollement de rétine, insuffisance hépatique sévère.

1.3 Plan de Gestion des Risques (PGR / RMP) : Version en vigueur 3.2 validée par l'EMA/PRAC. Surveillance spécifique sur : Syndrome de dysrégulation dopaminergique (troubles du contrôle des impulsions : jeu pathologique, hypersexualité), syndrome sérotoninergique..

2. MODULE 2 - VUE D'ENSEMBLE GLOBALE ET RAPPORTS D'EXPERTS

2.3 Résumé Global de la Qualité (QOS) : La substance active répond rigoureusement aux monographies de la Pharmacopée Européenne. Le procédé de fabrication garantit une teneur en principe actif entre 95.0% et 105.0% et un profil de substances apparentées conforme aux seuils ICH Q3A.

2.4 Vue d'Ensemble Non-Clinique : Les études de toxicité à doses répétées (6 mois chez le rongeur et 9 mois chez le non-rongeur) n'ont mis en évidence aucun signal de génotoxicité ni de potentiel carcinogène aux marges d'exposition thérapeutique.

2.5 Vue d'Ensemble Clinique : L'efficacité a été démontrée dans des essais de phase III pivotaux randomisés en double aveugle. Le profil de tolérance montre comme événements les plus fréquents : Dyskinésies (12.5%), somnolence diurne brutale, nausées, hypotension orthostatique, insomnie.. Le rapport bénéfice/risque global demeure très favorable dans l'indication revendiquée.

ÉTABLI PAR	VÉRIFIÉ PAR	APPROUVÉ PAR (QP / Directoire)
Nom : Mme Christine Baudry **Titre :** Directrice Globale des Affaires Réglementaires (VP RA) **Date :** 10/01/2024	**Nom :** M. Julien Tavernier **Titre :** Manager Affaires Réglementaires Europe (Procédures Centralisées) **Date :** 10/01/2024	**Nom :** M. François Mercier **Titre :** Directeur Qualité Groupe & Pharmacien Responsable (VP QA / QP) **Date :** 10/01/2024
Signature : *[Signé électroniquement via DocuSign GxP 21 CFR Part 11]*	**Signature :** *[Signé électroniquement via DocuSign GxP 21 CFR Part 11]*	**Signature :** *[Signé électroniquement via DocuSign GxP 21 CFR Part 11]*

CONFIDENTIEL - Ce document est la propriété exclusive de PharmaNova SA. Reproduction et diffusion interdites sans accord écrit.