Universidad de Costa Rica
Curso: Herramientas de Datos I

Cosecha de cafe

Predicción de la Cosecha de Café en Costa Rica mediante Modelos Estadísticos en R

Estudiante a cargo
Jerald Valverde Mora
23 de noviembre de 2026

Introduccion

El cafe es uno de los productos agricolas mas importantes en la historia de Costa Rica, no solo por su impacto como producto, sino como componente primorial de la historia y uno de los motores economicos del pais a traves de los anos. Al ser un producto agricola, la cantidad que se produce de este esta sujeto a distintas variables que pueden cambiar a lo largo del tiempo; algunos de ellos son los factores climaticos, de mercado y la bienalidad de la planta. La produccion total ha seguido una tendencia a que las cosechas que se producen en cada temporada sean fluctuantes y tiendan a tener valores cada vez mas bajos, estando en 2.5 millones en 1994 y bajando a 1.38 millones de sacos de 60kg en 2025 (ICAFE, pag. 88, 2025).

La intencion de este proyecto es anticipar el volumen de cada cosecha para productores, exportadores y beneficiadores; asi como, interpretar el ejercicio habitual que realiza la OIC (Organizacion Internacional del Cafe), que estima la produccion de cafe. La propuesta es estimar la cosecha nacional 2026-2027 con tres modelos estadísticos en R, a partir de la producción y el precio del ICAFE, el clima de NASA POWER y un indicador del fenómeno ENOS de la NOAA.

Objetivo General

Desarrollar y comparar tres modelos en R (regresión lineal , regresión Ridge y árbol de regresión) que permitan estimar el volumen de la cosecha nacional de café de Costa Rica para el periodo 2026-2027, a partir de variables climáticas, de mercado y del comportamiento histórico de la producción.

Metodologia

Obtencion y tratamiento de los datos

La producción nacional de café y el precio de exportación provienen del Informe sobre la Actividad Cafetalera de Costa Rica del Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE, 2025), entidad reguladora del sector según la Ley N.º 2762 de 1961, que reporta estas series por cosecha desde 1994-1995. El ICAFE expresa la producción en sacos de 46 kg, por lo que se convirtió a sacos de 60 kg, estándar internacional. Las tablas se extrajeron directamente del informe en PDF.

Los datos climáticos (precipitación (mm/dia) y temperatura medias (°C) de abril a octubre, ventana de floración y llenado del fruto según el ICAFE) se obtuvieron de NASA POWER (NASA, s. f.), que ofrece series satelitales con cobertura global desde 1981. Se utilizó un único punto en Pérez Zeledón, segunda región productora del país (aproximadamente 13 % de la producción nacional; ICAFE, 2025) y zona de origen del autor, por lo que el clima resultante es una aproximación

regional y no un promedio nacional. Como indicador del fenómeno de El Niño–Oscilación del Sur (ENOS) se utilizó el Índice Oceánico Relativo (RONI) de la NOAA (2026), con registros mensuales desde 1950, promediado en la misma ventana.

Construcción de variables

Cada cosecha se asocia a su ano de inicio: la cosecha 2023-2024 se asocia al año 2023, de esta manera; el clima y el RONI se usan del periodo de abril a octubre del ano respectivo a la recoleccion. Como variable respuesta se da la produccion nacional en sacos de 60kg, que se obtiene al multiplicar el cafe oro dado en sacos de 46kg por 46/60. Se descartan las exportaciones, el consumo nacional y el rendimiento como predictores ya que se calculan a partir de la misma cosecha que se pretende estimar. los datos climaticos (precipitacion y temperatura) se promedian sobre los meses mencionados de cada ano, asi como el RONI. Para tomar la bienalidad se incluye la produccion de la cosecha anterior como variable rezagada, igual manera el precio, ya que este se conoce una vez terminada la cosecha. Al tomar este rezago se pierde la primera cosecha, por lo que se contemplan $n = 31$ observaciones completas. los datos predictores se estandarizaron antes de ajustar la regresion de Ridge ya que es sensible a la escala. La cosecha 2026-2027 se proyecta con el clima y el RONI de 2026 y la producción y el precio de la cosecha 2025-2026.

Modelos

regresion lineal

modela la relación de dependencia entre una variable dependiente (lo que se desea predecir, Y) y una o más variables independientes (las predictoras, X) mediante una línea recta o superficie. Es el modelo base, interpretable y parsimonioso.

regresion ridge

Es una técnica de regresión estadística que se utiliza para corregir el sobreajuste y lidiar con la multicolinealidad (cuando las variables independientes están muy correlacionadas entre sí) (IBM, 2026). Se utiliza porque el rendimiento agricola depende de muchas variables que estan fuertemente conectadas entre si (multicolinealidad).

$$\mathrm{RSS}_{\mathrm{Ridge}} = \sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2 + \lambda \sum_{j=1}^{p} \beta_j^2$$

Donde λ controla el nivel de penalizacion, se toma por validacion cruzada, y_i es la cosecha real observada, $\hat{y}_i$ es la cosecha predicha por el modelo. y p la cantidad de variables predictoras.

arbol de regresion

Divide las cosechas en grupos mediante reglas sucesivas sobre las variables y predice con el promedio de cada grupo (James et al., 2021)". Este se utiliza porque no asume la linealidad de las variables y las reglas que utiliza son faciles de interpretar. Es un poco inestable con pocos datos.

referencia ingenua

Como referencia se usa el método ingenuo (Hyndman y Athanasopoulos, 2021), que pronostica cada cosecha con el valor observado en la cosecha del periodo anterior: $\hat{y}_{t+1} = y_t$

Validación

El desempeño de los modelos se evalua mediante la tecnica del backtesting con ventana creciente, que utiliza los datos del pasado para medir su comportamiento. Se ajusta cada modelo con las cosechas hasta el año t y se predice la cosecha $t+1$, repitiendo el proceso desde las primeras 15 observaciones hasta la última cosecha disponible. Con las n predicciones resultantes se calculan la raíz del error cuadrático medio (RMSE), el error absoluto medio (MAE) y el coeficiente de determinación fuera de muestra (R^2):

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2}, \quad MAE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|y_i - \hat{y}_i|, \quad R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2}$$

donde $\bar{y}$ es la media de lo observado. El RMSE penaliza los errores grandes, el MAE indica el error promedio, ambos se expresan en sacos de 60 kg. El R^2 fuera de muestra puede tomar valores negativos cuando el modelo predice peor que la media. Como referencia se incluye el método ingenuo, que pronostica cada cosecha con la anterior (Hyndman y Athanasopoulos, 2021). Para proyectar la cosecha 2026-2027 se selecciona el modelo con menor RMSE.


Alcance y limitaciones

- La cosecha 2026-2027 no puede validarse contra un valor real, ya que aún no ha concluido.
- El clima proviene de un único punto en Pérez Zeledón, que representa cerca del 13 % de la producción nacional, por lo que es una aproximación regional y no un promedio del país.
- La precipitación, la temperatura y el RONI están correlacionados, porque el ENOS influye en el clima, lo que puede volver inestables los coeficientes de la regresión lineal.
- Se cuenta con unas 30 observaciones frente a cinco variables predictoras, lo que incrementa el riesgo de sobreajuste, especialmente en el árbol de regresión.

Resultados


Análisis exploratorio

Figura 1: Producción nacional de café por cosecha. Fuente: elaboración propia con datos del ICAFE (2025) y La República (2026).



En la (Figura 1) se observa como la produccion nacional pasa de 2 498 409 sacos de 60 kg en la cosecha 1994-1995 a 1 170 000 en 2025-2026. Por otra parte, en la (Figura 2) se logra evidenciar como hay una relacion contraria con la produccion de las variables predictores de la lluvia y el precio, es decir, si la produccion de cafe baja se ve reflejado en que hubo tendencia al aumento de las lluvias y por ende, un aumento en el precio. Esto se evidencia con el precio rezagado (r = -0.75) y con la lluvia (r = -0.69)

Figura 2: Evolución de los predictores. Fuente: elaboración propia con datos de NASA POWER, NOAA y el ICAFE (2025).




Resultados de los modelos

Tabla 1 se observa un resumen del backtesting utilizado para comprobar el rendimiento de los modelos. El método ingenuo obtuvo el menor error (RMSE de 183 150 sacos), seguido del árbol (187 465), Ridge (214 832) y el modelo lineal (239 313), y los cuatro tuvieron un R^2 fuera de muestra negativo. el metodo ingenuo tiene un desempeño que se explica porque la produccion de una cosecha depende de lo que haya pasado con la cosecha anterior, ambas tienen una correlación de 0.92. En el modelo lineal de todas las variables predictoras la produccion anterior es a unica significativa. Sabiendo que paso con la cosecha anterior, los demas modelos las reducen obteniendo asi un error con poca mejora de la prediccion. Como el metodo ingenuo se ajusta de inmediato, no tiene el costo de saber que paso con las cosechas antiguas, mientras que los entrenados tienden a sobrepredecir cuando la produccion baja Figura 3.

Tabla 1: Error de predicción en el backtesting (sacos de 60 kg). Fuente: elaboración propia.


Modelo	RMSE	MAE	R^2 fuera de muestra
Ingenuo	183 150	172 750	-0.13
Árbol	187 465	160 763	-0.18
Ridge	214 832	179 751	-0.55
Lineal	239 313	200 116	-0.93

Figura 3: Producción observada y predicha en el backtesting (sacos de 60 kg). Fuente: elaboración propia con datos del ICAFE (2025).



Para la cosecha en turno (2026-2027) los modelos proyectan entre 1 170 000 y 1 359 560 sacos de 60 kg (Figura 4). El árbol, el de menor error entre los tres modelos, proyecta 1 359 560 sacos, un 16.2 % más que la cosecha 2025-2026. Se utilizan rangos amplios dado a lo visto en el error del backtesting es grande respecto a las diferencias entre modelos.

Figura 4: Proyección de la cosecha 2026-2027 por modelo, con rango aproximado de ±1.96 RMSE. Fuente: elaboración propia.



Conclusiones

- Con los datos utilizados, los modelos no logran una mejora clara al metodo ingenuo, ya que con la cosecha anterior ya contiene casi toda la informacion predictiva. Aunque, los datos de los modelos se pueden usar para respaldar aun mas el metodo ingenuo.
- la proyeccion de la cosecha 2026-2027 está entre 1 170 000 y 1 359 560 sacos de 60 kg, con un margen de error amplio.
- Las 31 cosechas utilizadas no logran separar el efecto del clima, el RONI y el precio respecto a los predictores.

Bibliografia

Brenes, L. (12 de agosto, 2025). Cosecha 2025/26: Menos café, a mejor precio, pero menos rentabilidad por tipo de cambio y aranceles. La República. https://www.larepublica.net/noticia/cosecha-2025-26-menos-cafe-a-mejor-precio-pero-menos-rentabilidad-por-tipo-de-cambio-y-aranceles

Hyndman, R. J., y Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and practice (3.ª ed.). OTexts. https://otexts.com/fpp3/ IBM. (16 de agosto, 2026). ¿Qué es regression?. https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/ridge-regression

Instituto del Café de Costa Rica. (2025). Informe de la actividad cafetalera de Costa Rica 2025. https://www.icafe.cr/wp-content/uploads/informacion_mercado/informes_actividad/actual/Informe%20Actividad%20Cafetalera.pdf

James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2021). An Introduction to Statistical Learning: with Applications in R (2.ª ed.). Springer

National Aeronautics and Space Administration, Langley Research Center. (s. f.). Monthly and annual API documentation. NASA POWER. Recuperado el 10 de noviembre de 2026, de https://power.larc.nasa.gov/docs/services/api/temporal/monthly/

National Oceanic and Atmospheric Administration, Climate Prediction Center. (s. f.). Relative Oceanic Niño Index (RONI). Recuperado el 10 de noviembre de 2026, de https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso/roni/

Ramírez. (s. f.). Actualización del área cafetalera nacional. Caficultura desde Costa Rica. https://ramirezcaficulturadesdecostarica.com/ct-191

Anexos

Tabla 2: Matriz de correlaciones entre predictores. Fuente: elaboración propia.

	Lluvia	Temperatura	RONI	Prod. anterior	Precio anterior
Lluvia	1.00	0.44	-0.20	-0.69	0.63
Temperatura	0.44	1.00	0.39	-0.53	0.43
RONI	-0.20	0.39	1.00	0.08	-0.20
Prod. anterior	-0.69	-0.53	0.08	1.00	-0.75
Precio anterior	0.63	0.43	-0.20	-0.75	1.00

Tabla 3: Coeficientes del modelo lineal y de Ridge. Fuente: elaboración propia.

Variable	Lineal	Valor p	Ridge
Intercepto	2740351.54	0.390	3653315.05
Lluvia (mm/día)	12258.17	0.519	-107.33
Temperatura (°C)	-131760.63	0.370	-147738.17
RONI	78788.93	0.295	62260.94
Producción anterior	0.94	0.000	0.75
Precio anterior	575.25	0.639	-395.19

Figura 5: Árbol de regresión ajustado con todas las cosechas. Fuente: elaboración propia. Valores expresados en millones de sacos




Tabla 4: Error del backtesting por cosecha y modelo (observado menos predicho, sacos de 60 kg). Fuente: elaboración propia.

anio	Lineal	Ridge	Árbol	Ingenuo
2010	287 310	162 241	67 348	133 838
2011	-30 162	9 704	240 053	195 154
2012	-351 340	-288 886	61 538	-118 501
2013	-193 650	-236 991	-92 504	-214 056
2014	-159 358	-190 926	-105 384	-36 005
2015	-5 330	21 247	-83 677	225 634
2016	-313 020	-322 679	-136 794	-278 121
2017	12 096	9 294	57 752	171 747
2018	-494 780	-461 082	-201 670	-251 172
2019	184 331	149 072	13 923	190 384
2020	-77 681	-81 953	-309 071	-86 123
2021	-158 689	-178 250	-218 112	-151 739
2022	127 223	124 107	-291 258	169 552
2023	-327 666	-261 571	-337 553	-239 995
2024	238 412	225 853	-148 772	157 026
2025	-240 807	-152 165	-206 793	-144 945

Repositorio del proyecto: https://github.com/Jerald-vm/proyecto-individual