

JEREMIAS DOURADO

# Consequências da Hiperbolicidade na Dinâmica das Funções

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA  
FACULDADE DE MATEMÁTICA

2020

**JEREMIAS DOURADO**

# **Consequências da Hiperbolicidade na Dinâmica das Funções**

**Dissertação** apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Matemática da Universidade Federal de Uberlândia, como parte dos requisitos para obtenção do título de **MESTRE EM MATEMÁTICA**.

**Área de Concentração:** Matemática.

**Linha de Pesquisa:** Sistemas Dinâmicos.

**Orientador:** Prof. Dr. Thiago Aparecido Catalan.

**UBERLÂNDIA - MG**

**2020**

Ficha Catalográfica Online do Sistema de Bibliotecas da UFU  
com dados informados pelo(a) próprio(a) autor(a).

D739  
2020

Dourado, Jeremias, 1990-  
Consequências da hiperbolicidade na dinâmica das funções  
[recurso eletrônico] / Jeremias Dourado. - 2020.

Orientador: Thiago Catalan.  
Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Uberlândia,  
Pós-graduação em Matemática.  
Modo de acesso: Internet.  
Disponível em: <http://doi.org/10.14393/ufu.di.2020.170>  
Inclui bibliografia.  
Inclui ilustrações.

1. Matemática. I. Catalan, Thiago, 1984-, (Orient.). II.  
Universidade Federal de Uberlândia. Pós-graduação em  
Matemática. III. Título.

CDU: 51

Bibliotecários responsáveis pela estrutura de acordo com o AACR2:  
Gizele Cristine Nunes do Couto - CRB6/2091  
Nelson Marcos Ferreira - CRB6/3074

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA**  
**FACULDADE DE MATEMÁTICA**  
**PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA**

Av. João Naves de Ávila, 2121, Bloco 1F, Sala 1F 152  
Campus Santa Mônica, Uberlândia - MG, CEP 38400-902

**ALUNO(A):** Jeremias Dourado.

**NÚMERO DE MATRÍCULA:** 11812MAT004.

**ÁREA DE CONCENTRAÇÃO:** Matemática.

**LINHA DE PESQUISA:** Sistemas Dinâmicos.

**PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA:** Nível Mestrado.

**TÍTULO DA DISSERTAÇÃO:** Consequências da Hiperbolicidade na Dinâmica das Funções.

**ORIENTADOR:** Prof. Dr. Thiago Aparecido Catalan.

Esta dissertação foi **APROVADA** em reunião pública realizada na Sala Multiuso da Faculdade de Matemática, Bloco 1F, Campus Santa Mônica, em 17 de fevereiro de 2020, às 14h, pela seguinte Banca Examinadora:

**NOME**

**ASSINATURA**

Prof. Dr. Thiago Aparecido Catalan  
UFU - Universidade Federal de Uberlândia

\_\_\_\_\_

Prof. Dr. Vanderlei Minori Horita  
UNESPE - Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"

\_\_\_\_\_

Prof. Dr. Jean Venato Santos UFU  
UFU - Universidade Federal de Uberlândia

\_\_\_\_\_

Uberlândia-MG, 17 de fevereiro de 2020.

Dedico este trabalho a minha namorada Letícia Martins.  
Eu te amo.

# Agradecimentos

Agradeço aos meus pais, Maria da Silva Dourado e Valmir José Dourado, por terem enfrentado as piores dificuldades financeiras nesse país injusto e desigual pra me criar, educar e com sua nobreza de caráter me inspirar a lutar por um mundo melhor.

Agradeço às minhas irmãs e irmãos que me apoiaram e foram ombros amigos nas adversidades, dividindo o pouco que tínhamos.

Agradeço aos colegas mestrandos com os quais construí amizades e compartilhei alegrias e tristezas.

Agradeço ao meu orientador Thiago Catalan pela paciente orientação construtivista e dialética, pelos conselhos e apoio emocional, transcendendo a relação aluno professor em direção a uma amizade.

Agradeço a Faculdade de Matemática da Universidade Federal de Uberlândia, em especial o Programa de Pós-graduação em Matemática, pelo suporte dado aos mestrandos e pela contribuição na minha formação acadêmica.

Agradeço aos professores Jean Venato Santos e Vanderlei Minori Horita por terem aceito o convite para fazer parte da banca de avaliação da minha dissertação.

Agradeço, finalmente, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais pelo auxílio financeiro que apesar dos atrasos permitiu que eu me dedicasse exclusivamente aos estudos.

DOURADO, J. *Consequências da Hiperbolicidade na Dinâmica das Funções*. 2020. (44 págs) p. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia-MG.

## Resumo

O objeto de estudo deste trabalho é a hiperbolicidade e suas consequências na dinâmica dos difeomorfismos definidos sobre variedades diferenciáveis compactas. Apresentamos os difeomorfismos de Anosov e os Parcialmente Hiperbólicos e a partir do nível de hiperbolicidade de cada um tiramos consequências e relações entre propriedades topológicas e ergódicas como: transitividade, topologicamente mixing, densidade das variedades estáveis e instáveis fortes e ergodicidade fraca. Os resultados principais desta dissertação tomam como base o artigo de Arbieto, Catalan e Nobili [1].

*Palavras-chave:* Difeomorfismos de Anosov, Difeomorfismos Parcialmente Hiperbólicos, Ergodicidade, Hiperbolicidade, Topologicamente mixing, Transitividade,  $s$ -minimal,  $ms$ -minimal.

DOURADO, J. *Consequences of Hyperbolicity on Function Dynamics*. 2020. (44 pages) p. M. Sc. Dissertation, Federal University of Uberlândia, Uberlândia-MG.

## **Abstract**

In this work we concern about hyperbolicity and your consequences in the dynamics of diffeomorphisms acting on compact manifolds. We introduce Anosov and Partially hyperbolic diffeomorphisms, and from hyperbolicity we get some topological and ergodic properties as transitivity, mixing, density of stable and unstable manifolds, and weak ergodicity. The main results in this dissertation are from the article of Arbieto, Catalan and Nobili [1].

*Keywords:* Anosov Diffeomorphisms, Differentiable dynamics, Ergodicity, Hyperbolicity, Topologicamente mixing, Transitivity,  $s$ –minimal,  $ms$ –minimal.



# Sumário

<b>Resumo</b>	<b>vii</b>
<b>Abstract</b>	<b>viii</b>
<b>Introdução</b>	<b>1</b>
<b>1 Conceitos Básicos da Teoria de Sistemas Dinâmicos</b>	<b>3</b>
1.1 Dinâmica Topológica . . . . .	3
1.1.1 Hiperbolicidade . . . . .	11
1.2 Dinâmica Ergódica . . . . .	16
1.2.1 Ergodicidade . . . . .	26
<b>2 Densidade das Variedades Estáveis e Instáveis dos Difeomorfismos de Anosov</b>	<b>29</b>
<b>3 Densidade das Variedades Estáveis e Instáveis dos Difeomorfismos Parcialmente Hiperbólicos</b>	<b>35</b>
3.1 $m$ -minimalidade . . . . .	37
3.1.1 Propriedades Ergódicas . . . . .	41
<b>Referências Bibliográficas</b>	<b>44</b>

# Introdução

A teoria de Sistemas Dinâmicos, apresentada no final do século XIX pelo matemático francês Henri Poincaré e posteriormente aprofundada por George Birkhoff no livro *Dynamical Systems* (1927), introduziu um estudo qualitativo para as equações diferenciais que permitiam analisar comportamentos assintóticos em relação ao tempo, como estabilidade e periodicidade, sem precisar resolvê-las explicitamente.

Uma dinâmica em síntese é uma função de um espaço nele mesmo, e as propriedades mais interessantes são extraídas da análise das órbitas, que é o conjunto dos pontos gerados quando a função é aplicada iteradamente dado um ponto inicial. As dinâmicas aqui estudadas são caóticas, ou seja, possuem uma sensibilidade à condição inicial, o que leva a necessidade de estudar a dinâmica num sentido mais geral.

As propriedades dinâmicas estudadas neste texto, em linhas gerais são:

- Transitividade: em que a dinâmica leva qualquer aberto a intersectar outro aberto pelo menos uma vez no futuro ou no passado.
- Topologicamente mixing: em que a dinâmica "mistura" o espaço, levando cada aberto a interceptar qualquer outro aberto e manter a intersecção infinitamente depois de um certo tempo.
- Ergodicidade fraca; em que o conjunto dos pontos cujas órbitas são densas, é um conjunto de medida total na variedade.

Alguns difeomorfismos definidos em variedades diferenciáveis compactas desfrutam de estruturas dinâmicas especiais. Os apresentados aqui possuem uma decomposição em soma direta no espaço tangente gerada pelos autoespaços do operador derivada, chamados de espaços estáveis, centrais e instáveis. Os quais possuem uma relação com os conjuntos estáveis e instáveis, que são formados por pontos que se aproximam no futuro e por pontos que se aproximam no passado, respectivamente.

Quando o espaço central é trivial chamamos o difeomorfismo de hiperbólico ou difeomorfismo de Anosov. Neste caso, os conjuntos estáveis e instáveis são subvariedades diferenciáveis,

consequência do famoso Teorema da Variedade Estável. Quando o subespaço central é não-trivial chamamos o difeomorfismo de Parcialmente Hiperbólico. Neste caso, será possível definir subvariedades estáveis e instáveis fortes que integram os subespaços estáveis e instáveis.

Chamamos de  $s$ —minimal os difeomorfismos de Anosov que possui todas as variedades estáveis densas e  $ss$ —minimal os difeomorfismos parcialmente hiperbólicos que possui todas variedades estáveis densas. Analogamente, definimos  $u$ —minimal e  $uu$ —minimal usando as variedades instáveis no lugar das variedades estáveis. Definimos também os difeomorfismos  $ms$ —minimal cujo conjunto dos pontos que possuem variedades estáveis densas, é um conjunto de medida de Lebesgue total. Definição esta que faz sentido para os difeomorfismos que preservam a medida de Lebesgue. Analogamente definimos  $mu$ —minimal usando as variedades instáveis ao invés das variedades estáveis.

Os três principais resultados do trabalho são os seguintes:

**Teorema 0.1.** *Seja  $f : M \rightarrow M$  um difeomorfismo de Anosov. Então,  $f$  é  $s$ —minimal e  $u$ —minimal se, e somente se,  $f$  é topologicamente mixing.*

Este é o Teorema 2.7.

**Teorema 0.2.** *Seja  $f : M \rightarrow M$  um difeomorfismo parcialmente hiperbólico preservando a medida de Lebesgue  $m$ . Se  $f$  for  $ms$ —minimal ou  $mu$ —minimal, então  $f$  é topologicamente mixing.*

Este é o Teorema 3.8.

**Teorema 0.3.** *Seja  $f : M \rightarrow M$  um difeomorfismo de classe  $C^{1+\alpha}$  parcialmente hiperbólico. Se  $f$  é  $ms$ —minimal ou  $mu$ —minimal, então  $f$  é fracamente ergódico.*

Este é o Teorema 3.16.

Esta dissertação está dividida da seguinte forma: no Capítulo 1 apresentamos conceitos básicos da teoria, no Capítulo 2 estudamos os difeomorfismos de Anosov e no Capítulo 3 os difeomorfismos Parcialmente Hiperbólicos.

Jeremias Dourado

Uberlândia-MG, 17 de fevereiro de 2020.

# Capítulo 1

## Conceitos Básicos da Teoria de Sistemas Dinâmicos

Neste capítulo apresentaremos as noções básicas de Sistemas Dinâmicos. Usaremos sempre o conjunto dos naturais incluindo o 0, então  $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$  e nos casos em que precisarmos excluir o 0, usaremos  $\mathbb{N}_* = \{1, 2, \dots\}$ . Um espaço métrico  $M$  é um conjunto com uma métrica  $d$  que possibilita calcular a distância entre dois pontos quaisquer. Definimos em  $M$  a topologia  $\zeta$  gerada pela métrica  $d$ , isto é,  $\zeta$  é a família de abertos de  $M$ , pela métrica  $d$ . Definimos também em  $M$  a  $\sigma$ -álgebra de Borel  $\mathcal{B}(M)$ , que é gerada pela topologia  $\zeta$ , ou seja, a menor  $\sigma$ -álgebra que contém todos os subconjuntos abertos de  $M$ .

O conjunto  $M$  será sempre um espaço topológico mensurável compacto, e quando ele tiver uma outra estrutura ou propriedade, como por exemplo ser uma variedade diferenciável ou um espaço de probabilidade, será devidamente caracterizado. A função  $f : M \rightarrow M$  será sempre uma função contínua, e portanto mensurável. Na sequência vamos definir uma série de termos básicos da teoria.

### 1.1 Dinâmica Topológica

Vamos definir e mostrar alguns resultados de uma dinâmica sob um olhar topológico. Dado uma aplicação  $f : M \rightarrow M$  qualquer, dizemos que  $f$  é um **Sistema Dinâmico** que associa um ponto  $x \in M$  a um outro ponto  $f(x) \in M$  que é a dinâmica de  $x$  uma unidade de tempo depois, e portanto  $f$  é uma dinâmica com tempo discreto. Definimos  $f^0(x) = x$ ,  $f^1(x) = f(x)$  e  $f^n(x) = f(f^{n-1}(x))$ , que são os iterados futuros de  $x$ , e então chamamos de **órbita futura** de  $x$  o conjunto  $\mathcal{O}^+(x) = \{f^n(x); n \in \mathbb{N}\}$ . Se  $f$  for bijetora, definimos também a **órbita**

**passada** de  $x$ , o conjunto  $\mathcal{O}^-(x) = \{f^{-n}(x); n \in \mathbb{N}\}$ , em que  $f^{-1}(x)$  é a pré imagem de  $x$  e  $f^{-n}(x) = f^{-1}(f^{-(n-1)}(x))$ , que são os iterados passados de  $x$ , e nesse caso podemos definir de maneira generalizada o conjunto  $\mathcal{O}(x) = \mathcal{O}^+(x) \cup \mathcal{O}^-(x) = \{f^n(x); n \in \mathbb{Z}\}$ , que chamamos de **órbita** de  $x$ . Caso precisemos deixar claro a qual função estamos nos referindo, denotaremos tais órbitas por  $\mathcal{O}^+(x, f)$ ,  $\mathcal{O}^-(x, f)$  e  $\mathcal{O}(x, f)$ , respectivamente.

Dizemos que um ponto  $p \in M$  é um **ponto periódico** de  $f$  de período  $\tau(p)$  se  $f^{\tau(p)}(p) = p$  e chamamos o conjunto finito  $\mathcal{O}(p) = \{p, f(p), \dots, f^{\tau(p)-1}(p)\}$  de **órbita periódica** de  $p$ . Denotamos por  $Per_n(f)$  o conjunto dos pontos periódicos de  $f$  de período  $n$  e  $Per(f) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} Per_n(f)$  o conjunto de todos os pontos periódicos de  $f$ . Particularmente quando  $\tau(p) = 1$ , ou seja,  $f(p) = p$ , chamamos  $p$  de **ponto fixo** de  $f$  e definimos  $Fix(f)$  o conjunto dos pontos fixos de  $f$ .

Um conjunto  $A \subseteq M$  é chamado **positivamente  $f$ -invariante** se  $f(A) \subseteq A$  e dizemos que o conjunto  $A$  é **negativamente  $f$ -invariante** se  $f^{-1}(A) \subseteq A$ . Se  $f(A) = A$  dizemos que  $A$  é um conjunto  **$f$ -invariante**. Observemos que o conjunto  $Per(f)$  é um conjunto  $f$ -invariante. De fato, se  $p \in Per(f)$  então  $f^{\tau(p)}(p) = p$ , isso implica que  $f^{\tau(p)}(f(p)) = f^{\tau(p)+1}(x) = f^{1+\tau(p)}(x) = f(f^{\tau(p)}(p)) = f(p)$ , logo  $f(p) \in Per(f)$ , ou seja,  $f(Per(f)) \subseteq Per(f)$ . Reciprocamente, se  $p \in f^{-1}(Per(f))$  significa que  $f(p) \in Per(f)$  e com raciocínio análogo ao caso anterior concluímos que  $p \in Per(f)$ , ou seja,  $f^{-1}(Per(f)) \subseteq Per(f)$ . Portanto  $f(Per(f)) = Per(f)$ .

Um ponto  $x \in M$  é um **ponto recorrente no futuro** (respectivamente **ponto recorrente no passado**, caso  $f$  seja bijetora) se para cada vizinhança  $V_x$  de  $x$  dada, existe  $n \in \mathbb{N}$  tal que  $f^n(x) \in V_x$  (respectivamente existe  $m \in \mathbb{N}$  tal que  $f^{-m}(x) \in V_x$ ). Se  $x$  é recorrente no passado e no futuro, isto é, para cada vizinhança  $V_x$  de  $x$  dada, existem  $m, n \in \mathbb{N}$  tal que  $f^{-m}(x), f^n(x) \in V_x$ , dizemos que  $x$  é **recorrente**. Denotamos por  $\mathcal{R}(f)$  o conjunto dos pontos recorrentes de  $f$ . Dizemos que um ponto  $x \in M$  é um **ponto não errante** de  $f$  se para cada vizinhança  $V_x$  de  $x$  dada, existe  $n \in \mathbb{N}$  tal que  $f^n(V_x) \cap V_x \neq \emptyset$ , ou seja, para cada vizinhança  $V_x$  de  $x$  dada, existem  $n \in \mathbb{N}$  e  $y \in V_x$  tais que  $f^n(y) \in V_x$ . Denotamos por  $\Omega(f)$  o conjunto dos pontos não errantes de  $f$ .

Seja  $\{x_n\}_{n \in \mathbb{Z}} \subseteq M$  uma sequência de pontos de  $M$ . Dizemos que  $\{x_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$  é uma  $\varepsilon$ -**pseudo-órbita** para  $f$  se  $d(f(x_n), x_{n+1}) \leq \varepsilon$ . Se  $x \in \{x_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$  e existe um  $n_0 \in \mathbb{N}$  tal que  $d(f(x_{n_0-1}), x) \leq \varepsilon$  e  $x_{n_0} = x_1$ , dizemos que  $\{x_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$  é uma  $\varepsilon$ -**pseudo-órbita periódica contendo  $x$** . Um ponto  $y \in M$   $\delta$ -**sombreia** a sequência  $\{x_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$  se  $d(f^n(y), x_n) \leq \delta$  para todo  $n \in \mathbb{Z}$ . Dizemos que um ponto  $x \in M$  é **recorrente por cadeia** se para cada  $\varepsilon > 0$  dado, existe uma  $\varepsilon$ -pseudo-órbita periódica contendo  $x$  e denotamos por  $\mathcal{RC}(f)$  o conjunto de todos os pontos recorrentes

por cadeia.

Esses conjuntos definidos acima possuem uma relação entre si, que podemos ver na seguinte proposição.

**Proposição 1.1.** *Seja  $f : M \rightarrow M$  uma aplicação qualquer, então temos a seguinte sequência de inclusões:*

$$Per(f) \subseteq \mathcal{R}(f) \subseteq \Omega(f) \subseteq \mathcal{RC}(f).$$

*Demonstração.* Vamos provar separadamente cada inclusão.

$Per(f) \subseteq \mathcal{R}(f)$  : Seja  $p \in Per(f)$ , então para toda vizinhança  $V_p$  de  $p$ , temos  $f^{\tau(p)}(p) = p \in V_x$  e portanto  $Per(f) \subseteq \mathcal{R}(f)$ .

$\mathcal{R}(f) \subseteq \Omega(f)$  : Seja  $x \in \mathcal{R}(f)$ , então para cada vizinhança  $V_x$  de  $x$  dada, existe  $n \in \mathbb{N}$  tal que  $f^n(x) \in V_x$ , em particular  $f^n(V_x) \cap V_x \neq \emptyset$ , como  $\varepsilon > 0$  é um qualquer, temos que  $x \in \Omega(f)$  e portanto  $\mathcal{R}(f) \subseteq \Omega(f)$ .

$\Omega(f) \subseteq \mathcal{RC}(f)$  : Seja  $x \in \Omega(f)$ , tomemos  $\varepsilon > 0$  tal que  $V_x \subseteq B(x, \varepsilon)$ , em que  $V_x$  é uma vizinhança de  $x$ . Então, existem  $n_0 \in \mathbb{N}$  e  $y \in V_x$  tais que  $f^{n_0}(y) \in V_x$ . Definamos a sequência  $\{y_n\}_{n \in \mathbb{Z}} \subseteq M$  tal que  $y_n = f^n(y)$ , logo  $d(f(y_{n_0-1}), x) < \varepsilon$ . Como  $\varepsilon > 0$  é um qualquer, então  $x \in \mathcal{RC}(f)$  e portanto  $\Omega(f) \subseteq \mathcal{RC}(f)$ .

□

**Corolário 1.2.** *Se  $\overline{Per(f)} = M$ , então  $\Omega(f) = M$ .*

*Demonstração.* Aplicando  $\overline{Per(f)} = M$  na Proposição 1.1 temos  $\overline{\Omega(f)} = M$ , então basta provar que  $\Omega(f)$  é um conjunto fechado e concluimos a demonstração. De fato, se  $(x_k)_{k=1}^{+\infty} \subseteq \Omega(f)$  é uma sequência que converge para  $x$ , então dada uma vizinhança  $V_x$  de  $x$ , existe um  $k_0 \in \mathbb{N}$  tal que para todo  $k > k_0$  temos  $x_k \in V_x$ . Fixemos um  $k > k_0$  e tomemos  $\delta > 0$  tal que  $B(x_k, \delta) \subseteq V_x$ . Daí, como  $x_k$  é não errante, existe  $n \in \mathbb{N}$  tal que  $f^n(B(x_k, \delta)) \cap B(x_k, \delta) \neq \emptyset$ , em particular  $f^n(V_x) \cap V_x \neq \emptyset$ . Como  $V_x$  é uma vizinhança qualquer de  $x$ , então  $x \in \Omega(f)$  e portanto  $\Omega(f)$  é um conjunto fechado, concluindo a demonstração. □

Existem dinâmicas cuja órbita de qualquer aberto percorre todo o espaço, e para algum iterado futuro intersecta qualquer outro aberto.

**Definição 1.3.** *Seja  $f : M \rightarrow M$  uma aplicação qualquer. Dizemos que  $f$  é **topologicamente transitiva**, ou apenas **transitiva**, se para quaisquer abertos  $U, V \subseteq M$  dados, existe  $n \in \mathbb{N}$  tal que  $f^n(U) \cap V \neq \emptyset$ .*

A transitividade de uma função pode ser definida, de forma equivalente, através da órbita de um ponto.

**Proposição 1.4.** *Sejam  $f : M \rightarrow M$  uma aplicação contínua qualquer e  $M$  um espaço métrico compacto, então  $f$  é transitiva se, e somente se, existe  $x_0 \in M$  tal que  $\overline{\mathcal{O}(x_0)} = M$ .*

*Demonstração.* Se  $f$  é transitiva, então dados  $U, V \subseteq M$  existe  $n \in \mathbb{N}$  tal que  $f^n(U) \cap V \neq \emptyset$  o que implica  $f^{-n}(V) \cap U \neq \emptyset$ , em que  $f^{-n}(V)$  também é aberto, pois  $f$  é contínua. Como  $M$  é compacto, então admite uma base enumerável de abertos  $B = \{B_1, B_2, \dots\}$ .

Construamos a seguinte sequência de compactos encaixados. Por hipótese, existe  $n_1 \in \mathbb{N}$  tal que o aberto  $U_1 = B_1 \cap f^{-n_1}(B_2) \neq \emptyset$ , então tomemos um compacto  $K_1 \subseteq U_1$ . Por hipótese, existe  $n_2 \in \mathbb{N}$  tal que o aberto  $U_2 = U_1 \cap f^{-n_2}(B_3) \neq \emptyset$ , então tomemos um compacto  $K_2 \subseteq U_2$ . Repetindo esse processo indefinidamente, obtemos uma sequência de compactos encaixados

$$K_1 \supseteq K_2 \supseteq K_3 \supseteq \dots$$

em que a órbita futura dos pontos de  $K_n$  começam em  $B_1$  e intercecta  $B_i$  após  $n_i$  iterações, para  $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ .

O conjunto  $K = \bigcap_{i=1}^{+\infty} K_i$  é compacto não vazio, pois é uma intersecção enumerável de compactos não vazios encaixados. Portanto, dado  $x_0 \in K$  temos que  $f^{n_i}(x_0) \in B_1$  para todo  $i \in \mathbb{N}$ , e como  $B$  é uma base de  $M$ , ou seja, para todo aberto  $A \subseteq M$  existe um  $B_i \in B$  tal que  $B_i \subseteq A$ , então  $\mathcal{O}^+(x_0) \cap A \neq \emptyset$ , isto é,  $\overline{\mathcal{O}(x_0)} = M$ .

Reciprocamente, dado dois abertos  $U, V \subseteq M$ . Se  $\overline{\mathcal{O}(x_0)} = M$ , então existe  $n_1, n_2 \in \mathbb{N}$  tais que  $f^{n_1}(x_0) \in U$  e  $f^{n_2}(x_0) \in V$ ; sem perda de generalidade podemos supor  $n_1 < n_2$ , pois a órbita de  $x_0$  retorna a  $U$  e  $V$  infinitas vezes. Daí,  $f^{n_1}(x_0) \in U$  e  $f^{n_2-n_1}(f^{n_1}(x_0)) = f^{n_2}(x_0) \in V$ . Portanto tomando  $n = n_2 - n_1$  temos  $f^n(U) \cap V \neq \emptyset$ , ou seja,  $f$  é transitiva.  $\square$

Se  $\overline{\mathcal{O}(x)} = M$ , para todo  $x \in M$ , isto é, a órbita de todo ponto é densa em  $M$  dizemos que  $f$  é **minimal**; essa definição equivale a dizer que  $M$  não tem conjuntos próprios  $f$ -invariantes e fechados. De fato, observemos que dado  $x \in M$ , o conjunto  $\mathcal{O}(x)$  é o menor conjunto  $f$ -invariante contendo  $x$ , pois dado qualquer conjunto  $A \subseteq M$ ,  $f$ -invariante e contendo  $x$ , então  $f^n(x) \in A$  para todo  $n \in \mathbb{Z}$ , logo  $\mathcal{O}(x) \subseteq A$ . Daí, se  $A$  for  $f$ -invariante e fechado, então  $M = \overline{\mathcal{O}(x)} \subseteq A$  e portanto  $A$  não é próprio.

**Corolário 1.5.** *Seja  $f : M \rightarrow M$  uma aplicação qualquer. Se  $f$  for minimal, então  $f$  é transitiva.*

*Demonstração.* Como  $f$  é minimal, então  $\overline{\mathcal{O}(x)} = M$  para todo  $x \in M$ . Em particular existe um  $x_0 \in M$  tal que  $\overline{\mathcal{O}(x_0)} = M$ , e portanto pela Proposição 1.4,  $f$  é transitiva.  $\square$

Algumas dinâmicas possuem uma propriedade mais forte ainda do que a transitividade, em que além da órbita de um aberto percorrer todo o espaço, ela expande esse aberto de tal forma que a partir de um certo iterado, essa órbita continua intersectando consecutivamente qualquer outro aberto.

**Definição 1.6.** *Seja  $f : M \rightarrow M$  uma aplicação qualquer. Dizemos que  $f$  é **topologicamente mixing**, se para quaisquer abertos  $U, V \subseteq M$  dados, existe  $n_0 \in \mathbb{N}$  tal que  $f^n(U) \cap V \neq \emptyset$ , para todo  $n > n_0$ .*

**Proposição 1.7.** *Seja  $f : M \rightarrow M$  uma aplicação qualquer, se  $f$  for topologicamente mixing, então  $f$  é transitiva.*

*Demonstração.* Sejam  $U, V \subseteq M$  dois abertos quaisquer, como  $f$  é topologicamente *mixing* então existe um  $n_0 \in \mathbb{N}$  tal que para todo  $n > n_0$  temos que  $f^n(U) \cap V \neq \emptyset$ . Em particular existe um  $n \in \mathbb{N}$  tal que  $f^n(U) \cap V \neq \emptyset$ , ou seja,  $f$  é transitiva.  $\square$

Esses comportamentos podem ser verificados em várias dinâmicas sobre um mesmo espaço ou em dinâmicas semelhantes sobre espaços diferentes. Algumas, apesar de possuírem leis de formação diferentes, possuem as mesmas propriedades que podem ser relacionadas através de conjugações.

**Definição 1.8.** *Sejam  $f : M_1 \rightarrow M_1$  e  $g : M_2 \rightarrow M_2$ , aplicações quaisquer, em que  $M_1$  e  $M_2$  são espaços métricos. Dizemos que  $h : M_1 \rightarrow M_2$  é uma **conjugação** de  $f$  e  $g$ , se  $h$  for um homeomorfismo tal que o seguinte diagrama seja comutativo:*

$$\begin{array}{ccc} M_1 & \xrightarrow{f} & M_1 \\ h \downarrow & & \downarrow h \\ M_2 & \xrightarrow{g} & M_2 \end{array}$$

*Ou seja,  $h \circ f = g \circ h$ . Dizemos que  $f$  e  $g$  são **topologicamente conjugadas** quando existe uma conjugação  $h$  entre elas. Lembrando que um homeomorfismo é uma função bijetora contínua com inversa contínua.*

Veremos agora um resultado que mostra como duas dinâmicas topologicamente conjugadas possuem o mesmo comportamento assintótico.

**Teorema 1.9.** *Sejam  $M_1$  e  $M_2$  espaços métricos,  $f : M_1 \rightarrow M_1$  e  $g : M_2 \rightarrow M_2$  aplicações, e  $h : M_1 \rightarrow M_2$  uma conjugação de  $f$  e  $g$ , então as seguintes afirmações são verdadeiras:*

i)  $h \circ f^n = g^n \circ h$ ;



$$ii) \ h(Per(f)) = Per(g);$$

$$iii) \ h(\mathcal{R}(f)) = \mathcal{R}(g);$$

$$iv) \ h(\Omega(f)) = \Omega(g);$$

$$v) \ f \text{ é transitiva se, e somente se, } g \text{ é transitiva};$$

$$vi) \ f \text{ é topologicamente mixing se, e somente se, } g \text{ é topologicamente mixing}.$$

*Demonstração.* i) Temos que  $f = h^{-1} \circ g \circ h$ , pois  $h^{-1}$  existe porque  $h$  é um homeomorfismo.

Então

$$\begin{aligned} f^n &= (h^{-1} \circ g \circ h)^n \\ &= (h^{-1} \circ g \circ h) \circ (h^{-1} \circ g \circ h) \circ \dots \circ (h^{-1} \circ g \circ h) \\ &= h^{-1} \circ g \circ (h \circ h^{-1}) \circ g \circ h \circ \dots \circ h^{-1} \circ g \circ h \\ &= h^{-1} \circ g \circ g \circ \dots \circ g \circ h \\ &= h^{-1} \circ g^n \circ h \end{aligned}$$

Portanto  $h \circ f^n = g^n \circ h$ .

ii) Se  $h(p) \in h(Per(f))$  então  $f^{\tau(p)}(p) = p$  e pelo item anterior temos  $g^{\tau(p)}(h(p)) = h(f^{\tau(p)}(p)) = h(p)$ . Logo  $h(p) \in Per(g)$ , o que significa que  $h(Per(f)) \subseteq Per(g)$ . Reciprocamente, se  $q \in Per(g)$  então  $g^{\tau(q)}(q) = q$  e como  $h$  é um homeomorfismo podemos escrever  $p = h^{-1}(q) \in M_1$  e pelo item anterior temos  $f^{\tau(q)}(p) = f^{\tau(q)}(h^{-1}(q)) = h^{-1}(g^{\tau(q)}(q)) = h^{-1}(q) = p$ . Logo  $p = h^{-1}(q) \in Per(f)$  e então  $q = h(p) \in h(Per(f))$ , o que significa que  $Per(g) \subseteq h(Per(f))$ . Portanto  $h(Per(f)) = Per(g)$ .

iii) Se  $h(x) \in h(\mathcal{R}(f))$  então dado uma vizinhança  $U_{h(x)}$  de  $h(x)$ , temos que  $V_x = h^{-1}(U_{h(x)})$  é uma vizinhança de  $x$  e existe  $n \in \mathbb{N}$  tal que  $f^n(x) \in V_x$  e pelo primeiro item temos  $g^n(h(x)) = h(f^n(x)) \in h(V_x) = U_{h(x)}$ , logo  $h(x) \in \Omega(g)$ , o que significa que  $h(\Omega(f)) \subseteq \Omega(g)$ . Reciprocamente, se  $y \in \Omega(g)$  então dada uma vizinhança  $V_x$  de  $x = h^{-1}(y)$ , temos que  $h(V_x)$  é uma vizinhança de  $y$  e existe  $n \in \mathbb{N}$  tal que  $g^n(y) \in h(V_x)$  e pelo primeiro item  $g^n(y) = g^n(h(x)) = h(f^n(x)) \in h(V_x)$  o que significa que  $y = h(x) \in h(\Omega(f))$ . Portanto  $h(\Omega(f)) = \Omega(g)$ .

iv) Se  $h(x) \in h(\Omega(f))$ , então dado uma vizinhança  $U_{h(x)}$  de  $h(x)$ , temos que  $V_x = h^{-1}(U_{h(x)})$  é uma vizinhança de  $x$  e existe  $n \in \mathbb{N}$  tal que  $f^n(V_x) \cap V_x \neq \emptyset$ , e pelo primeiro item temos  $h(f^n(V_x)) = g^n(h(V_x)) = g^n(U_{h(x)})$ , logo  $g^n(U_{h(x)}) \cap U_{h(x)} \neq \emptyset$  e  $h(x) \in \Omega(g)$ ,

o que significa que  $h(\Omega(f)) \subseteq \Omega(g)$ . Reciprocamente, se  $y \in \Omega(g)$  então dada uma vizinhança  $V_x$  de  $x = h^{-1}(y)$ , temos que  $h(V_x)$  é uma vizinhança de  $y$  e existe  $n \in \mathbb{N}$  tal que  $g^n(h(V_x)) \cap h(V_x) \neq \emptyset$  e pelo primeiro item  $g^n(h(V_x)) = h(f^n(V_x))$ , logo  $h(f^n(V_x)) \cap h(V_x) \neq \emptyset$  e  $y = h(x) \in h(\Omega(f))$ , o que significa que  $\Omega(g) \subseteq h(\Omega(f))$ . Portanto  $h(\Omega(f)) = \Omega(g)$ .

vi) Se  $f$  é transitiva então dado dois abertos  $U_2, V_2 \subseteq M_2$  quaisquer, temos  $U_1 = h^{-1}(U_2)$  e  $V_1 = h^{-1}(V_2)$  são abertos em  $M_1$ , logo existe  $n \in \mathbb{N}$  tal que  $f^n(U_1) \cap V_1 \neq \emptyset$  e pelo primeiro item  $g^n(U_2) = g^n(h(U_1)) = h(f^n(U_1))$ , portanto  $g^n(U_2) \cap V_2 \neq \emptyset$ , o que significa que  $g$  é transitiva. Reciprocamente, se  $g$  é transitiva então dado dois abertos  $U_1, V_1 \subseteq M_1$  quaisquer, temos  $U_2 = h(U_1)$  e  $V_2 = h(V_1)$  são abertos em  $M_2$ , pois a inversa de  $h$  é contínua, logo existe  $n \in \mathbb{N}$  tal que  $g^n(U_2) \cap V_2 \neq \emptyset$  e como  $h^{-1}$  também é uma conjugação, pelo primeiro item  $f^n(U_1) = f^n(h^{-1}(U_2)) = h^{-1}(g^n(U_2))$ , portanto  $f^n(U_1) \cap V_1 \neq \emptyset$ , o que significa que  $f$  é transitiva.

vii) Se  $f$  topologicamente mixing então dado dois abertos  $U_2, V_2 \subseteq M_2$  quaisquer, temos  $U_1 = h^{-1}(U_2)$  e  $V_1 = h^{-1}(V_2)$  são abertos em  $M_1$ , logo existe  $n_0 \in \mathbb{N}$  tal que para todo  $n > n_0$  temos que  $f^n(U_1) \cap V_1 \neq \emptyset$  e pelo primeiro item  $g^n(U_2) = g^n(h(U_1)) = h(f^n(U_1))$ , portanto  $g^n(U_2) \cap V_2 \neq \emptyset$ , o que significa que  $g$  é topologicamente mixing. Reciprocamente, se  $g$  é topologicamente mixing então dado dois abertos  $U_1, V_1 \subseteq M_1$  quaisquer, temos  $U_2 = h(U_1)$  e  $V_2 = h(V_1)$  são abertos em  $M_2$ , pois a inversa de  $h$  é contínua, logo existe  $n_0 \in \mathbb{N}$  tal que para todo  $n > n_0$  temos que  $g^n(U_2) \cap V_2 \neq \emptyset$  e como  $h^{-1}$  também é uma conjugação, pelo primeiro item  $f^n(U_1) = f^n(h^{-1}(U_2)) = h^{-1}(g^n(U_2))$ , portanto  $f^n(U_1) \cap V_1 \neq \emptyset$ , o que significa que  $f$  é topologicamente mixing.

□

**Corolário 1.10.** *Nas condições do Teorema 1.9,  $f$  é minimal se, e somente se,  $g$  é minimal.*

*Demonstração.* Dado  $x \in M_1$ , pelo primeiro item do Teorema 1.9, temos  $h(\mathcal{O}(x, f)) = \mathcal{O}(h(x), g)$ . Como  $f$  é minimal então  $\overline{\mathcal{O}(x, f)} = M_1$  e portanto  $\overline{\mathcal{O}(h(x), g)} = h(\overline{\mathcal{O}(x, f)}) = h(M_1) = M_2$ , e como  $x$  é um ponto qualquer e  $h$  é bijetora, concluímos que  $g$  é minimal. Analogamente, aplicando o mesmo raciocínio para  $h^{-1}$ , concluímos que  $g$  ser minimal implica em  $f$  ser minimal.

□

Um exemplo interessante de dinâmica, é a rotação irracional na esfera unitária  $S^1 = \{z \in \mathbb{C}; |z| = 1\} = \{e^{2\pi ix}; x \in [0, 2\pi)\}$  em  $\mathbb{C}$ . Definamos o conjunto  $\mathbb{R}/\mathbb{Z} = \{[x] \in [0, 1); x \sim x' \Leftrightarrow x - x' \in \mathbb{Z}\}$ , em que  $[x]$  é a classe de equivalência pela relação  $\sim$ . Para facilitar a

notação, ao invés de escrevermos  $[x] \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ , escreveremos apenas  $x \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}$  onde o  $x$  estará representando sua classe de equivalência  $x \pmod{1}$ . Dado um  $\alpha \in \mathbb{R}$ , definamos também sobre esses conjuntos as seguintes dinâmicas

$$\begin{array}{ccc} R_\alpha : S^1 & \rightarrow & S^1 \\ e^{2\pi i x} & \mapsto & e^{2\pi i(x+\alpha)} \end{array} \quad \text{e} \quad \begin{array}{ccc} T_\alpha : \mathbb{R}/\mathbb{Z} & \rightarrow & \mathbb{R}/\mathbb{Z} \\ x & \mapsto & x + \alpha \end{array}.$$

Note que  $R_\alpha(x)$  é uma rotação do ponto  $e^{2\pi i x} \in S^1$  pelo ângulo  $\alpha$  e  $T_\alpha(x)$  é a parte decimal do ponto  $x \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}$  transladado por  $\alpha$ . Vamos mostrar que  $R_\alpha$  é minimal quando  $\alpha \in (\mathbb{R} - \mathbb{Q})$ , e pra isso vejamos que  $R_\alpha$  e  $T_\alpha$  são topologicamente conjugadas. Seja  $h : \mathbb{R}/\mathbb{Z} \rightarrow S^1$  tal que  $h(x) = e^{2\pi i x}$ , então  $h$  é uma conjugação de  $T_\alpha$  e  $R_\alpha$ .

- i)  $h$  é injetora: De fato, seja  $x, y \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}$  tal que  $h(x) = h(y)$ , então  $e^{2\pi i x} = e^{2\pi i y} \Rightarrow e^{2\pi i(x-y)} = 1 \Rightarrow 2\pi i(x-y) = \ln(1) \Rightarrow 2\pi i(x-y) = 0 \Rightarrow x-y = 0 \Rightarrow x = y$ .
- ii)  $h$  é sobrejetora: De fato, seja  $z \in S^1$ , então  $z = e^{2\pi i x}$  para algum  $x \in [0, 2\pi)$ , logo existe  $x \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}$  tal que  $h(x) = e^{2\pi i x} = z$ .
- iii)  $h$  é contínua com inversa contínua: De fato, a função exponencial é contínua, e sua inversa  $h^{-1}$  definida por  $h^{-1}(z) = x$ , em que  $z = e^{2\pi i x}$ , é a função logarítmica e também é contínua.
- iv)  $h \circ T_\alpha = R_\alpha \circ h$ : De fato,  $(h \circ T_\alpha)(x) = h(T_\alpha(x)) = h(x + \alpha) = e^{2\pi i(x+\alpha)} = R_\alpha(e^{2\pi i x}) = R_\alpha(h(x)) = (R_\alpha \circ h)(x)$ .

Então podemos trabalhar apenas com  $T_\alpha$  e as propriedades do Teorema 1.9 se aplicam a  $R_\alpha$ . Vamos ver abaixo dois resultados que caracterizam a dinâmica  $R_\alpha$  em função do  $\alpha$ .

**Proposição 1.11.** *Se  $\alpha$  for um número racional, então  $\text{Per}(R_\alpha) = S^1$ .*

*Demonstração.* Temos que  $T_\alpha = x + \alpha$ ,  $T_\alpha^2 = (x + \alpha) + \alpha = x + 2\alpha$  e  $T_\alpha^n = (x + (n-1)\alpha) + \alpha = x + n\alpha$ . Daí, dado  $x \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}$  e tomando  $\alpha = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$  temos

$$T_\alpha^q(x) = x + q\alpha = x + q\frac{p}{q} = x + p = x.$$

Essa última igualdade é verdade porque  $q$  é um número inteiro e então  $x + q$  tem a mesma parte decimal que  $x$ . Portanto  $x$  é periódico, isto é,  $\text{Per}(T_\alpha) = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$  e pelo Teorema 1.9 item ii), concluímos que  $\text{Per}(R_\alpha) = h(\text{Per}(T_\alpha)) = h(\mathbb{R}/\mathbb{Z}) = S^1$ .  $\square$

**Proposição 1.12.** *Se  $\alpha$  for um número irracional, então  $R_\alpha$  é minimal.*

*Demonstração.* Dado  $x \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ , suponhamos que  $\overline{\mathcal{O}(x)} \neq \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ , então  $B = \mathbb{R}/\mathbb{Z} - \overline{\mathcal{O}(x)} \neq \emptyset$  é um conjunto  $f$ -invariante aberto e por isso pode ser escrito como a união de intervalos abertos e disjuntos. Tomemos  $I \subseteq B$  o maior desses intervalos, e caso tenha mais de um sendo maior que os outros, tomemos  $I$  um dos maiores. Seja  $m(I) > 0$  a medida desse intervalo, isto é, se  $I = (a, b)$  então  $m(I) = b - a$ .

*Afirmção 1:*  $T_\alpha(I)$  continua sendo o maior desses intervalos. De fato, se  $I = (a, b)$  então  $m(T_\alpha(I)) = m((a + \alpha, b + \alpha)) = b + \alpha - (a + \alpha) = b - a = m(I)$ .

*Afirmção 2:*  $T_\alpha^n(I) \neq I$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ . De fato, suponhamos que  $T_\alpha^n(I) = I$  para algum  $n \in \mathbb{N}$ , então pelo Teorema do Valor Intermediário, existe um  $c \in I$  tal que  $T_\alpha^n(c) = c$ , logo  $c + n\alpha = c \pmod{1}$  o que significa que  $d = n\alpha \in \mathbb{Z}$  e daí  $\alpha = \frac{d}{n}$ , o que é absurdo.

*Afirmção 3:*  $T_\alpha^n(I)$  são dois a dois disjuntos, para todo  $n \in \mathbb{N}$ . De fato, suponhamos que exista  $m, n \in \mathbb{N}$  tal que  $T_\alpha^m(I) \cap T_\alpha^n(I) \neq \emptyset$ , como  $B$  é  $f$ -invariante e pela Afirmção 2  $T_\alpha^m(I) \neq T_\alpha^n(I)$ , então  $T_\alpha^m(I) \cup T_\alpha^n(I) \subseteq B$  seria o maior intervalo de  $B$ , o que é absurdo.

Portanto, podemos concluir que

$$m\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} T_\alpha^n(I)\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} m(T_\alpha^n(I)) = \sum_{n=0}^{+\infty} m(I) = +\infty.$$

Absurdo, pois  $m\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} T_\alpha^n(I)\right) \leq m(\mathbb{R}/\mathbb{Z}) = m([0, 1)) = 1$ . Logo  $\overline{\mathcal{O}(x)} = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$  e como  $x$  é um ponto qualquer, concluímos que  $T_\alpha$  é minimal. Daí, pelo Corolário 1.10  $R_\alpha$  é minimal.  $\square$

### 1.1.1 Hiperbolicidade

Quando o espaço  $M$  possui certas propriedades, podemos mapear melhor a sua dinâmica. Então, sejam  $M$  uma variedade diferenciável,  $f : M \rightarrow M$  um difeomorfismo de classe  $C^r$  e  $p \in M$  um ponto periódico de período  $\tau(p)$ . Podemos decompor  $T_p M$  através dos autoespaços do operador derivada  $Df_p^{\tau(p)} : T_p M \rightarrow T_p M$ . Chamamos de **subespaço estável** de  $T_p M$  o subespaço  $E_p^s$  gerado pelos autovalores  $|\lambda| < 1$ , **subespaço instável**  $E_p^u$  o gerado pelos autovalores  $|\lambda| > 1$ , e **subespaço central**  $E_p^c$  o gerado pelos autovalores  $|\lambda| = 1$ . Temos portanto uma decomposição do espaço  $T_p M$  em soma direta

$$T_p M = E_p^s \oplus E_p^c \oplus E_p^u.$$

Dizemos que  $p$  é um ponto **periódico hiperbólico** se  $E^c = \{0\}$ , ou seja,  $Df_p^{\tau(p)}$  não possui autovalor  $\lambda$  com  $|\lambda| = 1$  e portanto

$$T_p M = E_p^s \oplus E_p^u.$$

Essa definição pode ser estendida para os pontos que não são periódicos. Existem conjuntos  $\Lambda \subseteq M$  que também admitem uma boa decomposição do fibrado tangente, que chamaremos de conjuntos hiperbólicos. Mais precisamente:

**Definição 1.13.** *Seja  $f : M \rightarrow M$  um difeomorfismo de classe  $C^r$  definido em uma variedade diferenciável  $M$ . Dizemos que um conjunto  $\Lambda \subseteq M$  é um **conjunto hiperbólico** se  $\Lambda$  é  $f$ -invariante e existem  $0 < \lambda < 1$  e  $C \in \mathbb{R}$ , tais que para cada  $x \in \Lambda$ :*

- i) *Existe a decomposição  $T_x M = E_x^s \oplus E_x^u$ ;*
- ii) *Essa decomposição é  $Df$ -invariante, ou seja,  $Df(E_x^s) = E_{f(x)}^s$  e  $Df(E_x^u) = E_{f(x)}^u$ ;*
- iii)  *$E_x^s$  e  $E_x^u$  variam continuamente com  $x$ ;*
- iv)  *$\|Df^n(x)|_{E_x^s}(v)\| \leq C\lambda^n\|v\|$  para todo  $v \in E_x^s$  e para todo  $n \in \mathbb{N}$ ;*
- v)  *$\|Df^{-n}(x)|_{E_x^u}(v)\| \leq C\lambda^n\|v\|$  para todo  $v \in E_x^u$  e para todo  $n \in \mathbb{N}$ .*

Quando  $M$  é um conjunto hiperbólico, chamamos  $f : M \rightarrow M$  de **difeomorfismo de Anosov**. Dizemos que um conjunto hiperbólico  $\Lambda$  é **isolado** ou **maximal** se existir uma vizinhança  $U$  de  $\Lambda$  tal que

$$\Lambda = \bigcap_{n \in \mathbb{Z}} f^n(U).$$

Definimos o **conjunto estável local**  $W_\varepsilon^s(x) \subseteq M$  de  $x$  e o **conjunto instável local**  $W_\varepsilon^u(x) \subseteq M$  de  $x$ , respectivamente, por

$$\begin{aligned} W_\varepsilon^s(x) &= \left\{ y \in M; \lim_{n \rightarrow +\infty} d(f^n(x), f^n(y)) = 0 \text{ e } d(f^n(x), f^n(y)) < \varepsilon, \forall n \in \mathbb{N} \right\}, \\ W_\varepsilon^u(x) &= \left\{ y \in M; \lim_{n \rightarrow +\infty} d(f^{-n}(x), f^{-n}(y)) = 0 \text{ e } d(f^{-n}(x), f^{-n}(y)) < \varepsilon, \forall n \in \mathbb{N} \right\}. \end{aligned}$$

De modo geral, definimos o **conjunto estável**  $W^s(x) \subseteq M$  de  $x$  e o **conjunto instável**  $W^u(x) \subseteq M$  de  $x$ , respectivamente, por

$$\begin{aligned} W^s(x) &= \left\{ y \in M; \lim_{n \rightarrow +\infty} d(f^n(x), f^n(y)) = 0 \right\}, \\ W^u(x) &= \left\{ y \in M; \lim_{n \rightarrow +\infty} d(f^{-n}(x), f^{-n}(y)) = 0 \right\}. \end{aligned}$$

É claro que  $W_\varepsilon^s(x) \subseteq W^s(x)$  e  $W_\varepsilon^u(x) \subseteq W^u(x)$ . Caso precisemos deixar claro qual a função estamos nos referindo, denotaremos tais conjuntos por  $W_\varepsilon^s(x, f)$ ,  $W_\varepsilon^u(x, f)$ ,  $W^s(x, f)$  e  $W^u(x, f)$ , respectivamente. O próximo resultado relaciona melhor esses conjuntos, e mais, mostra que localmente esse conjuntos tem um comportamento parecido com  $E_x^s$  e  $E_x^u$ .

**Teorema 1.14. (Teorema da Variedade Estável)** *Sejam  $f : M \rightarrow M$  um difeomorfismo de classe  $C^r$  definido em uma variedade diferenciável  $M$ ,  $\Lambda \subseteq M$  um conjunto hiperbólico e  $x \in \Lambda$  um ponto qualquer, então  $W_\varepsilon^s(x)$  e  $W_\varepsilon^u(x)$  são subvariedades de  $M$  tangentes a  $E_x^s$  e  $E_x^u$ , respectivamente. Além disso,*

$$W^s(x) = \bigcup_{n=0}^{+\infty} f^{-n}\left(W_\varepsilon^s(f^n(x))\right) \quad e \quad W^u(x) = \bigcup_{n=0}^{+\infty} f^n\left(W_\varepsilon^u(f^{-n}(x))\right)$$

*também são subvariedades de  $M$  de mesma dimensão que  $E_x^s$  e  $E_x^u$ , respectivamente, e variam continuamente com o  $x$ .*

*Demonstração.* Pode ser encontrada em [2], na Seção 8.1.3, Teorema 1.2. □

Um exemplo de dinâmica hiperbólica é o automorfismo hiperbólico no toro  $\mathbb{T}^d = \mathbb{R}^d/\mathbb{Z}^d$ , a fim de simplificar os cálculos usaremos o toro de dimensão 2,  $\mathbb{T}^2 = \mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$ , mas o raciocínio para dimensão  $d > 2$  é inteiramente análogo. Seja  $A$  uma matriz de ordem 2 cujos elementos são números inteiros,  $|\det(A)| = 1$  e se  $\lambda$  for um autovalor de  $A$  então  $|\lambda| \neq 1$ . Definamos um operador linear  $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  em que  $F(z) = Az$ ; e seja  $\pi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{T}^2$  a projeção natural de  $\mathbb{R}^2$  sobre o toro  $\mathbb{T}^2$ , isto é,  $\pi(x, y) = [x, y]$  em que  $[x, y]$  é a classe de equivalência de  $(x, y)$  (mod 1). Então  $A$  induz uma função  $F_A$  em  $\mathbb{T}^2$  definida pelo seguinte diagrama

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \xrightarrow{F} & \mathbb{R}^2 \\ \pi \downarrow & & \downarrow \pi \\ \mathbb{T}^2 & \xrightarrow{F_A} & \mathbb{T}^2 \end{array}$$

Temos que  $F_A$  é um difeomorfismo. De fato, a matriz Jacobiana de  $F_A$  em todo ponto  $x \in \mathbb{T}^2$  é  $A$ , e como  $|\det(A)| = 1$  então  $F_A$  admite inversa e a Jacobiana da inversa é  $A^{-1}$ . Chamamos  $F_A$  de **automorfismo hiperbólico no toro**. Apesar do método de construção da função  $F_A$ , a proposição seguinte mostra que ela possui um comportamento bem diferente de sua equivalente linear.

**Proposição 1.15.** *O conjunto  $Per(F_A)$  é denso em  $\mathbb{T}^2$ .*

*Demonstração.* Seja  $p \in \mathbb{T}^2$  um ponto qualquer com coordenadas racionais. Encontrando um denominador comum se necessário, podemos assumir que  $p = \left(\frac{\alpha}{k}, \frac{\beta}{k}\right)$ , com  $\alpha, \beta, k \in \mathbb{Z}$ . Sabemos que os pontos com coordenadas racionais são densos em  $\mathbb{T}^2$ , então basta mostrarmos que eles são periódicos.

*Afirmção:*  $p$  é periódico, com período menor ou igual a  $k^2$ . De fato, assumindo  $0 \leq \alpha < k$  e  $0 \leq \beta < k$ , sabemos que existem  $k^2$  pontos da forma  $p = \left(\frac{\alpha}{k}, \frac{\beta}{k}\right)$ . Como a matriz  $A$  é inteira,

podemos supor  $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$  com  $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ , então

$$F_A \left( \frac{\alpha}{k}, \frac{\beta}{k} \right) = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\alpha}{k} \\ \frac{\beta}{k} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{a\alpha}{k} + \frac{b\beta}{k} \\ \frac{c\alpha}{k} + \frac{d\beta}{k} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{a\alpha + b\beta}{k} \\ \frac{c\alpha + d\beta}{k} \end{bmatrix}.$$

Ou seja,  $F_A$  permuta os pontos da forma  $p = \left( \frac{\alpha}{k}, \frac{\beta}{k} \right)$ . Logo, existem  $m, n \in \mathbb{N}$  tais que  $F_A^m(p) = F_A^n(p)$  com  $|m - n| \leq k^2$ . Supondo, sem perda de generalidade, que  $m < n$  e fazendo  $\tau(p) = n - m$  temos  $F_A^{\tau(p)}(p) = F_A^{n-m}(p) = p$ . Assim,  $p$  é periódico de período  $\tau(p) \leq k^2$ .  $\square$

Os autovalores  $\lambda_1$  e  $\lambda_2$  de  $A$  são números reais. De fato, o polinômio característico de  $A$  é  $p(\lambda) = \lambda^2 - \lambda(a + d) + \det(A)$ , sendo as raízes  $\lambda_j = \frac{(a + d) + (-1)^j \sqrt{\Delta}}{2}$ ,  $j = 1, 2$ , em que  $\Delta = (a + d)^2 - 4\det(A)$ , então temos dois casos:

Caso 1:  $\det(A) = -1$ , então  $\Delta = (a + d)^2 - 4\det(A) = (a + d)^2 + 4 > 0$  logo  $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$

Caso 2:  $\det(A) = ad - bc = 1$ , suponhamos  $\Delta = (a + d)^2 - 4 < 0$ , então  $\lambda_1 \in \mathbb{C}$  e  $\lambda_1 = \frac{(a + d)}{2} - \frac{i\sqrt{|\Delta|}}{2}$ , daí temos

$$|\lambda_1|^2 = \frac{(a + d)^2}{4} + \frac{\Delta}{4} = \frac{(a + d)^2}{4} + \frac{-(a + d)^2 + 4}{4} = 1.$$

Absurdo, pois  $|\lambda_1| \neq 1$ . Portanto  $\Delta > 0$  e  $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ .

Como  $|\det(A)| = |\lambda_1 \lambda_2| = 1$  e  $|\lambda_j| \neq 1$  para  $j = 1, 2$  então um dos autovalores deve satisfazer  $|\lambda_i| < 1$  e  $|\lambda_j| > 1$  para  $i \neq j$ . Vamos denotar por  $\lambda_s$  o primeiro caso, e  $\lambda_u$  o segundo. Desta forma podemos concluir que os subespaços estáveis e instáveis,  $E_z^s$  e  $E_z^u$ , para todo  $z \in \mathbb{T}^2$ , devem ser retas passando pela origem em  $\mathbb{R}^2$  e com inclinação  $\lambda_s$  e  $\lambda_u$ , respectivamente, e então  $T_z \mathbb{T}^2 = E_z^s \oplus E_z^u$ . É clado que essa decomposição é  $DF_{Az}$ -invariante, pois  $DF_{Az} = A$  para todo  $z \in \mathbb{T}^2$  e portando  $DF_{Az}(E_z^s) = AE_z^s = E_{F_A(z)}^s$ , o mesmo vale para  $E_z^u$ . Como  $F$  é uma transformação linear, então  $E_z^s$  e  $E_z^u$  variam continuamente com  $z$ . O que nos leva a concluir que  $T^2$  é um conjunto hiperbólico para  $F_A$ .

Dado  $z \in \mathbb{T}^2$ , então pelo Teorema da Variedade Estável 1.14, temos que  $W^s(z)$  e  $W^u(z)$  são subvariedades de  $\mathbb{T}^2$  de dimensão 1 tangentes a  $E_z^s$  e  $E_z^u$ , respectivamente, e variam continuamente com o  $z$ . O que nos leva ao seguinte resultado.

**Proposição 1.16.** *Para todo ponto  $z \in \mathbb{T}^2$ , temos*

$$i) \ W^s(z) = \pi(E_z^s);$$

$$ii) \ W^u(z) = \pi(E_z^u).$$

*Demonstração.* *i)* Se  $z' \in W^s(z)$ , tomemos  $l$  como sendo o segmento de reta que liga  $z$  e  $z'$ . Suponhamos que  $l \not\subseteq E_z^s$ , logo  $l$  possui uma componente na direção que expande  $E_z^u$ . Absurdo,

pois  $\lim_{n \rightarrow +\infty} d(F_A^n(z'), F_A^n(z)) = 0$ . Portanto  $l \subseteq E_z^s$ , e então  $z' \in E_z^s$ , ou seja,  $W^s(z) \subseteq \pi(E_z^s)$ . Reciprocamente, se  $z' \in E_z^s$  tal que  $z' \neq z$ , tomemos  $l$  como sendo o segmento de reta que liga  $z$  e  $z'$ . Pela linearidade de  $F$ , temos que  $F_A^n(l)$  é um segmento de reta paralelo a  $W^s$  e como  $|\lambda_s| < 1$  então  $\lim_{n \rightarrow +\infty} F_A^n(l) = \lambda_s^n l = 0$ , isto é, o tamanho desse segmento tende a zero. Portanto  $l \subseteq W^s(z)$ , e então  $x' \in W^s(z)$ , ou seja,  $\pi(E_z^s) \subseteq W^s(z)$ .

ii) Essa demonstração é inteiramente análoga ao item anterior, usando a inversa da função  $F_A$ . □

E o resultado mais interessante desse exemplo, é que para todo  $z \in \mathbb{T}^2$ , as suas variedades estáveis e instáveis são densas em  $\mathbb{T}^2$ , o que chamaremos no próximo capítulo de  $s$ -minimalidade e  $u$ -minimalidade, respectivamente.

**Proposição 1.17.** *Dado  $z \in \mathbb{T}^2$  um ponto qualquer, então as variedades estável  $W^s(z)$  e instável  $W^u(z)$  de  $z$  são densas em  $\mathbb{T}^2$ .*

*Demonstração.* Começemos por verificar que  $E_z^s$  é uma reta com inclinação irracional em  $\mathbb{R}^2$ , ou seja, se  $z = (x_0, y_0)$  e  $E_z^s = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; (y - y_0) = \alpha(x - x_0)\}$ , então  $\alpha \in (\mathbb{R} - \mathbb{Q})$ . De fato, suponhamos que  $\alpha \in \mathbb{Q}$ , então existe um ponto  $k = (k_1, k_2) \in E_z^s$  tal que  $k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$ . E como  $A$  é uma matriz de elementos inteiros, então  $F_A^n(k) \in \mathbb{Z}^2$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ . Absurdo, pois  $\lim_{n \rightarrow +\infty} d(F_A^n(k), F_A^n(z)) = 0$ .

Agora, tomando os pontos da forma  $(k_j, j) \in E_x^s$  que são a intersecção das retas da forma  $y = n$ , paralelas ao eixo  $x$  em  $\mathbb{R}^2$  com  $E_z^s$ , como a inclinação de  $E_z^s$  é irracional, então  $k_j \in (\mathbb{R} - \mathbb{Q})$  para todo  $j \in \mathbb{Z}$ , e portando  $\pi(k_j, j) = (\alpha_j, 0)$  para algum irracional  $0 < \alpha < 1$ . Os pontos da forma  $(x, 0) \in \mathbb{T}^2$  define um círculo no toro e suas imagens por  $F_A$  são uma rotação por um ângulo irracional, então pela Proposição 1.12 temos que a intersecção de  $W^s(z) = \pi(E_z^s)$  com esse círculo é denso nele, ou seja,  $W^s(z)$  é densa verticalmente no toro. Basta verificarmos então para a segunda coordenada.

Tomando os pontos de  $W^s(z)$  que interceptam as retas da forma  $y = n + \beta$ , em que  $\beta \in \mathbb{Q} \cap (0, 1)$ , temos que para cada  $\beta$  a variedade estável  $W^s(z)$  é densa no círculo formados pelos pontos da forma  $(x, \beta)$ , e como os racionais são densos em  $[0, 1)$ , os círculos também são densos no toro. Portanto  $W^s(z)$  é denso em  $\mathbb{T}^2$ .

Para  $W^u(z)$  a demonstração é análoga. □



## 1.2 Dinâmica Ergódica

Nessa seção vamos estudar uma dinâmica sob o olhar da teoria ergódica, cujo foco são as dinâmicas que preservam uma medida. Começaremos vendo as condições necessárias pra garantir a existência de pontos recorrentes e de medidas invariantes, para podermos definir ergodicidade e provar seus resultados.

O resultado que garante que quase todo ponto é recorrente, relativamente a uma medida finita  $f$ -invariante, é o Teorema da Recorrência de Poincaré. Usaremos com frequência, para estudarmos medida de um conjunto, a **função característica**  $\mathcal{X}_E : M \rightarrow \mathbb{R}$  do conjunto  $E$ , isto é,  $\mathcal{X}_E(x) = 1$  se  $x \in E$ , e  $\mathcal{X}_E(x) = 0$  se  $x \notin E$ . Definimos  $\mu : \mathcal{B}(M) \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  uma **medida** em  $M$ , onde  $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$  é a reta estendida. Denotaremos essa medida apenas por  $\mu$ ; dizemos que  $\mu$  é uma **medida finita** se  $\mu(M) < +\infty$  e  $\mu$  é uma **probabilidade** se  $\mu(M) = 1$ . Dizemos que  $\mu$  é  **$f$ -invariante** se para todo conjunto  $E \subseteq M$  mensurável vale  $\mu(f^{-1}(E)) = \mu(E)$ .

Dizemos que uma propriedade  $P$  vale para  $\mu$ -**quase todo ponto**  $x \in E$ , quando existe um conjunto  $N \subseteq E$  com  $\mu(N) = 0$ , tal que  $P$  vale para todo ponto  $x \in (E - N)$ . Finalmente podemos enunciar o primeiro resultado.

**Teorema 1.18. (Teorema de Recorrência de Poincaré - versão mensurável)** *Sejam  $f : M \rightarrow M$  uma aplicação mensurável e  $\mu$  uma medida  $f$ -invariante finita. Se  $E \subseteq M$  é um conjunto mensurável qualquer com  $\mu(E) > 0$ , então para  $\mu$ -quase todo ponto  $x \in E$ , existe  $n \in \mathbb{N}$  tal que  $f^n(x) \in E$ .*

*Demonstração.* Chamemos  $E^0 \subseteq E$  o conjunto dos pontos  $x \in E$  que não retornam a  $E$ , ou seja,  $x \in E^0$  implica que para todo  $n \in \mathbb{N}_*$  temos que  $f^n(x) \notin E$ . Basta provarmos que  $E^0$  tem medida nula, e concluímos a demonstração.

*Afirmção:* As suas pré-imagens  $f^{-n}(E^0)$  são duas a duas disjuntas. De fato, suponhamos que existam  $m, n \in \mathbb{N}_*$  com  $m > n$  tais que  $f^{-m}(E^0) \cap f^{-n}(E^0) \neq \emptyset$ , tomemos  $x$  um ponto dessa intersecção e seja  $y = f^n(x)$ . Então  $y \in E^0$  e  $f^{m-n}(y) = f^{m-n} \circ f^n(x) = f^m(x) \in E^0 \subseteq E$ , isso significa que  $y$  retorna a  $E$ , o que é absurdo pois  $y \in E^0$ . Logo as pré-imagens de  $E^0$  por  $f$  são duas a duas disjuntas. Então, pela  $\sigma$ -aditividade de  $\mu$ , temos

$$\mu\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} f^{-n}(E^0)\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} \mu(f^{-n}(E^0)) = \sum_{n=0}^{+\infty} \mu(E^0).$$

Na última igualdade usamos a hipótese de que  $\mu$  é  $f$ -invariante, ou seja,  $\mu(f^{-n}(E^0)) = \mu(E^0)$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ . Como  $\mu$  é finita, temos que  $\mu\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} f^{-n}(E^0)\right) < +\infty$ , por outro lado,

à direita temos que  $\sum_{n=0}^{+\infty} \mu(E^n)$  é uma soma infinita de termos constantes. A única forma dessa soma ser finita, é se todas as suas parcelas forem nulas. Portanto concluímos que  $\mu(E^0) = 0$ , como queríamos provar.  $\square$

Esse resultado têm uma consequência direta mais forte, em que além de  $\mu$ -quase todo ponto voltar a  $E$ , eles continuam voltando uma infinidade de vezes.

**Corolário 1.19.** *Nas condições do Teorema 1.18, para  $\mu$ -quase todo ponto  $x \in E$ , existem infinitos valores  $n \in \mathbb{N}$ , tais que  $f^n(x) \in E$ .*

*Demonstração.* Chamemos  $E_k \subseteq E$  o conjunto dos pontos  $x \in E$  que retornam a  $E$  exatamente  $k$  vezes, ou seja,  $x \in E_k$  implica que existem exatamente  $n_1, n_2, \dots, n_k \in \mathbb{N}$ , tais que  $f^{n_i}(x) \in E$ , onde  $i \in \{1, 2, \dots, k\}$ . Logo o conjunto dos pontos que retornam a  $E$  um número finito de vezes é  $\bigcup_{k=1}^{+\infty} E_k$  e então

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{+\infty} E_k\right) \leq \sum_{k=1}^{+\infty} \mu(E_k).$$

Basta provarmos que  $E_k$  tem medida nula, para todo  $k \in \mathbb{N}$ , e concluímos a demonstração do corolário. Suponhamos que  $\mu(E_k) > 0$ , então pelo Teorema 1.18 temos que para  $\mu$ -quase todo ponto  $x \in E_k$  existe  $n \in \mathbb{N}$  tal que  $f^n(x) \in E_k$ . Fixemos um desses  $x$  e denotemos  $y = f^n(x) \in E_k$ . Pela definição de  $E_k$ , temos que  $y$  tem exatamente  $k$  iterados em  $E_k$ , mas como  $y$  é um iterado de  $x$ , então  $x$  tem pelo menos  $k+1$  iterados em  $E_k$  o que é absurdo. Logo  $\mu(E_k) = 0$ , como queríamos provar.  $\square$

Na sequência vamos mostrar uma versão topológica desse resultado, que é útil para relacionarmos com os resultados da seção de dinâmica topológica.

**Teorema 1.20. (Teorema de Recorrência de Poincaré - versão topológica)** *Sejam  $f : M \rightarrow M$  uma aplicação mensurável e  $\mu$  uma medida  $f$ -invariante finita. Se  $M$  admite uma base enumerável de abertos, então  $\mu$ -quase todo ponto  $x \in M$  é recorrente.*

*Demonstração.* Seja  $B = \{U_k; k \in \mathbb{N}\}$  uma base enumerável de abertos de  $M$ . Para cada  $k \in \mathbb{N}$ , representaremos por  $U_k^0$  o conjunto dos pontos  $x \in U_k$  que nunca regressam a  $U_k$ , ou seja,  $x \in U_k^0$  implica que para todo  $n \in \mathbb{N}$  temos que  $f^n(x) \notin U_k$ . Então, pelo Teorema 1.18,  $U_k^0$  tem medida nula pra todo  $k$ , e portanto se  $\tilde{U} = \bigcup_{k=1}^{+\infty} U_k^0$ , temos que

$$0 \leq \mu(\tilde{U}) = \mu\left(\bigcup_{k=1}^{+\infty} U_k^0\right) \leq \sum_{k=1}^{+\infty} \mu(U_k^0) = 0.$$

Logo  $\mu(\tilde{U}) = 0$ . Então basta provarmos que para todo  $x \in M$  tal que  $x \notin \tilde{U}$ , temos que  $x$  é recorrente, e assim concluimos a demonstração. Sejam  $x \in (M - \tilde{U})$  e  $V_x$  uma vizinhança aberta qualquer de  $x$ , como  $B$  é uma base de  $M$  então existe  $U_k \in B$  tal que  $x \in U_k \subseteq V_x$ . Como  $x \notin \tilde{U}$ , então  $x \notin U_k^0$ , ou seja, existe um  $n \in \mathbb{N}$ , tal que  $f^n(x) \in U_k \subseteq V_x$ . Como  $V_x$  é uma vizinhança arbitrária, então  $x$  é um ponto recorrente, como queríamos mostrar.  $\square$

Esses resultados acima dependem fortemente da medida ser  $f$ -invariantes, o que será garantido pelo próximo teorema.

**Teorema 1.21.** (*Teorema da Existência de Medidas  $f$ -invariantes*) *Seja  $M$  um espaço métrico compacto. Se  $f : M \rightarrow M$  é uma aplicação contínua, então existe pelo menos uma probabilidade  $f$ -invariante.*

*Demonstração.* Pode ser encontrada em [5], no Capítulo 2, Teorema 2.1.  $\square$

Podemos então concluir que com hipóteses relativamente fracas, conseguimos sempre encontrar pontos recorrentes em uma dinâmica.

**Corolário 1.22.** (*Teorema da Recorrência de Birkhoff*) *Seja  $M$  um espaço métrico compacto. Se  $f : M \rightarrow M$  é uma aplicação contínua, então  $f$  tem algum ponto recorrente.*

*Demonstração.* Pelo Teorema 1.21, existe uma probabilidade  $f$ -invariante  $\mu$ . Como  $M$  é compacto, então admite uma base enumerável de abertos, logo pelo Teorema 1.20  $\mu$ -quase todo ponto  $x \in M$  é recorrente. Em particular o conjunto dos pontos recorrentes é não vazio, concluindo a demonstração.  $\square$

O próximo resultado é o Teorema Ergódico de Birkhoff que nos permitirá um bom entendimento das dinâmicas em termos da densidade de suas órbitas em relação a uma medida. Sejam  $f : M \rightarrow M$  uma aplicação mensurável,  $x \in M$  um ponto qualquer e  $E \subseteq M$  um conjunto mensurável, vamos fixar  $n \in \mathbb{N}$  e definir  $I_n = \{0, 1, \dots, n-1\} \subseteq \mathbb{N}$ , o conjunto dos  $n$  primeiros números naturais, e então vamos considerar  $\tau_n(E, x)$  como sendo a fração dos  $j \in I_n$  tal que  $f^j(x) \in E$ , ou seja,  $\tau_n(E, x) = \frac{1}{n} \# \{f^j(x) \in E; j \in I_n\}$ , onde  $\# \{f^j(x) \in E; j \in I_n\}$  é a cardinalidade do conjunto. Observe que podemos rescrever  $\tau_n(E, x)$  da seguinte forma

$$\tau_n(E, x) = \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \chi_E(f^j(x)). \quad (1.1)$$

**Definição 1.23.** *Sejam  $f : M \rightarrow M$  uma aplicação mensurável e  $x \in M$  um ponto qualquer. Definimos  $\tau(E, x)$ , o **tempo médio de permanência** da órbita de  $x$  em  $E$ , como sendo o limite de  $\tau_n(E, x)$  quando  $n$  tende ao infinito, ou seja,*

$$\tau(E, x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \tau_n(E, x).$$

Em geral, esse limite pode não existir. Mas quando existe, podemos garantir que ele não varia na órbita do ponto.

**Lema 1.24.** *Sejam  $f : M \rightarrow M$  uma aplicação mensurável e  $x \in M$  um ponto qualquer. Se o tempo médio de permanência  $\tau(E, x)$  existe, então*

$$\tau(E, f(x)) = \tau(E, x).$$

*Demonstração.* Por definição temos

$$\begin{aligned} \tau(E, f(x)) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \tau_n(E, f(x)) \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \chi_E(f^j(f(x))) \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \chi_E(f^j(x)) \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \left( \sum_{j=0}^{n-1} \chi_E(f^j(x)) - \frac{1}{n} [\chi_E(x) - \chi_E(f^n(x))] \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \chi_E(f^j(x)) - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} [\chi_E(x) - \chi_E(f^n(x))] \\ &= \tau(E, x) - \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} [\chi_E(x) - \chi_E(f^n(x))]. \end{aligned}$$

Como a função característica é limitada, esse ultimo limite é igual a zero, e o lema está demonstrado.  $\square$

Com esses resultados, podemos provar o próximo teorema, que garante a existência desse limite e dá um método para calcular sua integral.

**Teorema 1.25.** *Sejam  $f : M \rightarrow M$  uma aplicação mensurável e  $\mu$  uma probabilidade  $f$ -invariante. Dado qualquer conjunto mensurável  $E \subseteq M$ , o tempo médio de permanência  $\tau(E, x)$  existe para  $\mu$ -quase todo ponto  $x \in M$ . Além disso,*

$$\int_M \tau(E, x) d\mu(x) = \mu(E). \quad (1.2)$$

*Demonstração.* Seja  $E \subseteq M$  um conjunto mensurável qualquer. Para cada  $x \in M$ , definamos

$$\begin{aligned} \bar{\tau}(E, x) &= \limsup_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \chi_E(f^j(x)) \text{ e} \\ \underline{\tau}(E, x) &= \liminf_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \chi_E(f^j(x)). \end{aligned}$$

Para todo  $x \in M$  temos que

$$\bar{\tau}(E, f(x)) = \bar{\tau}(E, x) \quad \text{e} \quad \underline{\tau}(E, f(x)) = \underline{\tau}(E, x). \quad (1.3)$$

A demonstração das equações em (1.3) é análoga a do Lema 1.24.

Para demonstrar a existência do tempo médio  $\tau(E, x)$ , basta mostrar que para  $\mu$ -quase todo ponto  $x \in M$ , temos

$$\bar{\tau}(E, x) = \underline{\tau}(E, x). \quad (1.4)$$

Como  $0 \leq \underline{\tau}(E, x) \leq \bar{\tau}(E, x)$  para todo  $x \in M$ , então  $\int_M \underline{\tau}(E, x) d\mu(x) \leq \int_M \bar{\tau}(E, x) d\mu(x)$ . E caso  $\tau(E, x)$  exista, pela definição de lim inf e lim sup teremos  $0 \leq \underline{\tau}(E, x) \leq \tau(E, x) \leq \bar{\tau}(E, x)$  para todo  $x \in M$ , e então  $\int_M \underline{\tau}(E, x) d\mu(x) \leq \int_M \tau(E, x) d\mu(x) \leq \int_M \bar{\tau}(E, x) d\mu(x)$ . Logo, pra demonstrarmos a igualdade dada no teorema, basta provarmos a seguinte desigualdade (1.5), e concluímos a demonstração.

$$\int_M \underline{\tau}(E, x) d\mu(x) \geq \mu(E) \geq \int_M \bar{\tau}(E, x) d\mu(x). \quad (1.5)$$

Vamos provar a segunda desigualdade em (1.5). Seja  $\varepsilon > 0$  dado, por definição de lim sup existem  $t \in \mathbb{N}$ , tais que para todo  $x \in M$ , temos

$$\tau_t(E, x) \geq \bar{\tau}(E, x) - \varepsilon. \quad (1.6)$$

Definamos  $t : M \rightarrow \mathbb{N}$  uma função que leva o ponto  $x \in M$  ao primeiro  $t$  que satisfaça (1.6). Agora dividiremos a demonstração em dois casos.

**Caso Particular:** Suponhamos que a função  $t$  seja limitada, ou seja, existe um  $K \in \mathbb{N}$  tal que  $t(x) \leq K$  para todo  $x \in M$ . Fixando um  $n \in \mathbb{N}$  e dado  $x \in M$ , definamos uma sequência  $x_0, x_1, \dots, x_s$  de pontos de  $M$  e uma sequência  $t_0, t_1, \dots, t_s$  de números naturais, do seguinte modo:

1. Tomemos  $x_0 = x$ .
2. Depois fazemos  $t_i = t(x_i)$  e  $x_{i+1} = f^{t_i}(x_i)$ .
3. Terminamos quando encontrarmos  $x_s$  tal que  $t_0 + t_1 + \dots + t_s \geq n$ .

Pela definição de  $\tau_t(E, x)$  em (1.1), temos

$$\tau_{t_i}(E, x) = \frac{1}{t_i} \sum_{j=0}^{t_i-1} \mathcal{X}_E(f^j(x)) \implies \sum_{j=0}^{t_i-1} \mathcal{X}_E(f^j(x)) = t_i \tau_{t_i}(E, x).$$

Como essa equação vale para todo  $x \in M$  em particular vale para todo  $x_i$ , e aplicando em (1.6), temos

$$\begin{aligned} \sum_{j=0}^{t_i-1} \mathcal{X}_E(f^j(x_i)) &= t_i \tau_{t_i}(E, x_i) \\ &\geq t_i (\bar{\tau}(E, x_i) - \varepsilon). \end{aligned} \quad (1.7)$$

Pela definição da sequência  $x_i$  temos que

$$\begin{aligned} x_0 &= x \\ x_1 &= f^{t_0}(x_0) = f^{t_0}(x) \\ x_2 &= f^{t_1}(x_1) = f^{t_1}(f^{t_0}(x)) = f^{t_0+t_1}(x) \\ x_3 &= f^{t_2}(x_2) = f^{t_2}(f^{t_0+t_1}(x)) = f^{t_0+t_1+t_2}(x) \\ &\vdots \\ x_s &= f^{t_0+t_1+\dots+t_{s-1}}(x). \end{aligned}$$

E pelo item 3 da definição das sequências, temos que  $t_0 + t_1 + \dots + t_s \geq n$ , então  $t_0 + t_1 + \dots + t_{s-1} \geq n - t_s$ , e como todo  $t_i = t(x_i) \leq K$  temos que  $t_0 + t_1 + \dots + t_{s-1} \geq n - K$ . Note que aplicando  $x_i = f^{t_0+t_1+\dots+t_i}(x)$  em (1.3), temos  $\bar{\tau}(E, x_i) = \bar{\tau}(E, x)$  para todo  $x_i$  da sequência. Como  $t_s$  é o menor número tal que  $t_0 + t_1 + \dots + t_s \geq n$ , se tirarmos ele dessa soma teremos,  $t_0 + t_1 + \dots + t_{s-1} < n$  o que implica na seguinte desigualdade  $t_0 + t_1 + \dots + t_{s-1} - 1 < n - 1$ . Então podemos reescrever (1.7), colocando  $x_i$  em função de  $x$  para todo  $x_i$  da sequência, e somar todos eles, em que

$$\begin{aligned} \sum_{j=0}^{n-1} \mathcal{X}_E(f^j(x)) &\geq \sum_{j=0}^{t_0+\dots+t_{s-1}-1} \mathcal{X}_E(f^j(x)) \\ &\geq (t_0 + t_1 + \dots + t_{s-1}) (\bar{\tau}(E, x) - \varepsilon) \\ &\geq (n - K) (\bar{\tau}(E, x) - \varepsilon). \end{aligned} \quad (1.8)$$

Como o  $x \in M$  é um qualquer, então essa desigualdade vale para todo  $x \in M$ , e como as funções características são integráveis e não negativas, a integral preserva a desigualdade e

temos

$$\begin{aligned}
\int_M \sum_{j=0}^{n-1} \mathcal{X}_E(f^j(x)) d\mu(x) &\geq \int_M (n-K)(\bar{\tau}(E, x) - \varepsilon) d\mu(x) \\
\sum_{j=0}^{n-1} \int_M \mathcal{X}_E(f^j(x)) d\mu(x) &\geq (n-K) \left( \int_M \bar{\tau}(E, x) d\mu(x) - \varepsilon \int_M d\mu(x) \right) \quad (1.9) \\
\sum_{j=0}^{n-1} \mu(E) &\geq (n-K) \left( \int_M \bar{\tau}(E, x) d\mu(x) - \varepsilon \mu(M) \right) \\
n\mu(E) &\geq (n-K) \left( \int_M \bar{\tau}(E, x) d\mu(x) - \varepsilon \right) \\
\mu(E) &\geq \frac{(n-K)}{n} \left( \int_M \bar{\tau}(E, x) d\mu(x) - \varepsilon \right).
\end{aligned}$$

No membro da esquerda em (1.9), todas as parcelas da soma é igual a  $\mu(E)$  pois  $\mu$  é  $f$ -invariante. Esse resultado vale para todo  $n \in \mathbb{N}$ , então passando ao limite quando  $n \rightarrow +\infty$ , temos

$$\begin{aligned}
\mu(E) &\geq \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[ \frac{(n-K)}{n} \left( \int_M \bar{\tau}(E, x) d\mu(x) - \varepsilon \right) \right] \\
&= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[ \frac{(n-K)}{n} \right] \left( \int_M \bar{\tau}(E, x) d\mu(x) - \varepsilon \right) \\
&= \int_M \bar{\tau}(E, x) d\mu(x) - \varepsilon.
\end{aligned}$$

Esse resultado vale para todo  $\varepsilon > 0$ , então podemos passar ao limite quando  $\varepsilon \rightarrow 0$ , e temos

$$\mu(E) \geq \int_M \bar{\tau}(E, x) d\mu(x).$$

Terminando assim a demonstração para esse caso, onde a função  $t$  é limitada.

**Caso Geral:** Quando  $t$  for ilimitada, partindo do  $\varepsilon > 0$  dado em (1.6), fixemos  $K \in \mathbb{N}$ , suficientemente grande, de modo que o conjunto  $B = \{y \in M; t(y) > K\}$  seja tal que  $\mu(B) < \varepsilon$ .

Vamos mostrar que esse  $K$  de fato existe. Definamos, para todo  $m \in \mathbb{N}$ ,  $A_m = \{y \in M; t(y) \leq m\}$ . Temos que  $A_m \subseteq A_{m+1}$  e  $\bigcup_{m=0}^{+\infty} A_m = M$ , então  $\lim_{m \rightarrow +\infty} \mu(A_m) = \mu\left(\bigcup_{m=0}^{+\infty} A_m\right) = \mu(M) = 1$ , ou seja, para todo  $\delta > 0$  dado, existe  $m_0 \in \mathbb{N}$ , tal que  $m > m_0$  implica  $\mu(A_m) > 1 - \delta$ . Tomemos então  $K > m_0$  e  $\delta = \varepsilon$ , então  $\mu(A_K) > 1 - \varepsilon$ , isso implica  $\mu(M - A_K) < \varepsilon$ . Agora observe que  $(M - A_K) = \{y \in M; t(y) > K\} = B$ .

De maneira similar ao caso particular, fixando um  $n \in \mathbb{N}$  e dado  $x \in M$ , definamos uma sequência  $x_0, x_1, \dots, x_s$  de pontos de  $M$  e uma sequência  $t_0, t_1, \dots, t_s$  de número naturais, do seguinte modo:

1. Tomemos  $x_0 = x$ .

2. Se  $t(x_i) \leq K$ , fazemos  $t_i = t(x_i)$  e  $x_{i+1} = f^{t_i}(x_i)$ .
3. Se  $t(x_i) > K$ , fazemos  $t_i = 1$  e  $x_{i+1} = f(x_i)$ .
4. Terminamos quando encontrarmos  $x_s$  tal que  $t_0 + t_1 + \cdots + t_s \geq n$ .

Do caso particular, temos que para todo  $i \in \mathbb{N}$ , tal que  $t(x_i) \leq K$ , a desigualdade (1.7) continua valendo

$$\sum_{j=0}^{t_i-1} \mathcal{X}_E(f^j(x_i)) \geq t_i(\bar{\tau}(E, x) - \varepsilon). \quad (1.10)$$

A partir da desigualdade acima podemos escrever a seguinte

$$\sum_{j=0}^{t_i-1} \mathcal{X}_E(f^j(x_i)) \geq t_i(\bar{\tau}(E, x) - \varepsilon) - \sum_{j=0}^{t_i-1} \mathcal{X}_B(f^j(x_i)). \quad (1.11)$$

Essa desigualdade tem a vantagem de valer para todos os  $x_i$ . De fato, basta vermos que quando  $x_i$  for tal que  $t(x_i) \leq K$ , o ultimo somatório fica igual a zero, e decorre diretamente de (1.10), e quando  $t(x_i) > K$ , temos que  $t_i = 1$  e esses somatórios terão apenas um elemento, ficando

$$\begin{aligned} \sum_{j=0}^{t_i-1} \mathcal{X}_E(f^j(x_i)) &\geq t_i(\bar{\tau}(E, x_i) - \varepsilon) - \sum_{j=0}^{t_i-1} \mathcal{X}_B(f^j(x_i)) \\ \mathcal{X}_E(f(x_i)) &\geq (\bar{\tau}(E, x_i) - \varepsilon) - \mathcal{X}_B(f(x_i)). \end{aligned}$$

E temos que  $(\bar{\tau}(E, x_i) - \varepsilon) < 1$  pois  $\bar{\tau}(E, x_i) \leq 1$  e  $\varepsilon > 0$ , e como  $\mathcal{X}_B(f(x_i)) = 1$  pela definição de  $B$  e pela escolha do  $x_i$ , então podemos concluir que a desigualdade é verdadeira, pois o membro da esquerda é maior do que ou igual a zero, pela definição de função característica, e o da direita é menor que zero.

Agora usando o mesmo método que usamos pra concluir (1.8), fazendo novamente  $x_i = f^{t_0+t_1+\cdots+t_{i-1}}(x)$  para todo  $x_i$  da sequência. Temos que  $t_0 + t_1 + \cdots + t_{s-1} \geq n - t_s \geq n - K$ , pois pelo o item 4 da definição da sequência,  $t_i \leq K$  para todo  $t_i$ . Aplicando novamente  $x_i = f^{t_0+t_1+\cdots+t_i}(x)$  em (1.3), temos  $\bar{\tau}(E, x_i) = \bar{\tau}(E, x)$  para todo  $x_i$  da sequência. E temos também que vale a desigualdade  $t_0 + t_1 + \cdots + t_{s-1} - 1 < n - 1$ , então podemos generalizar,

$$\begin{aligned} \sum_{j=0}^{n-1} \mathcal{X}_E(f^j(x)) &\geq \sum_{j=0}^{t_0+\cdots+t_{s-1}-1} \mathcal{X}_E(f^j(x)) \\ &\geq (t_0 + t_1 + \cdots + t_{s-1})(\bar{\tau}(E, x) - \varepsilon) - \sum_{j=0}^{t_0+\cdots+t_{s-1}-1} \mathcal{X}_B(f^j(x)) \\ &\geq (n - K)(\bar{\tau}(E, x) - \varepsilon) - \sum_{j=0}^{n-1} \mathcal{X}_B(f^j(x)). \end{aligned}$$



Como o  $x \in M$  é um qualquer, então essa desigualdade vale para todo  $x \in M$ , e como as funções características são integráveis e não negativas, a integral preserva a desigualdade e temos

$$\begin{aligned}
\int_M \sum_{j=0}^{n-1} \mathcal{X}_E(f^j(x)) d\mu(x) &\geq \int_M \left( (n-K)(\bar{\tau}(E, x) - \varepsilon) - \sum_{j=0}^{n-1} \mathcal{X}_B(f^j(x)) \right) d\mu(x) \\
\sum_{j=0}^{n-1} \int_M \mathcal{X}_E(f^j(x)) d\mu(x) &\geq (n-K) \int_M (\bar{\tau}(E, x) - \varepsilon) d\mu(x) - \sum_{j=0}^{n-1} \int_M \mathcal{X}_B(f^j(x)) d\mu(x) \\
\sum_{j=0}^{n-1} \mu(E) &\geq (n-K) \left( \int_M \bar{\tau}(E, x) d\mu(x) - \varepsilon \right) - \sum_{j=0}^{n-1} \mu(B) \\
n\mu(E) &\geq (n-K) \left( \int_M \bar{\tau}(E, x) d\mu(x) - \varepsilon \right) - n\mu(B) \\
\mu(E) &\geq \frac{(n-K)}{n} \left( \int_M \bar{\tau}(E, x) d\mu(x) - \varepsilon \right) - \mu(B).
\end{aligned}$$

Como esse resultado vale para todo  $n \in \mathbb{N}$ , então passando ao limite quando  $n \rightarrow +\infty$ , e lembrando que  $\mu(B) < \varepsilon$ , temos

$$\begin{aligned}
\mu(E) &\geq \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[ \frac{(n-K)}{n} \left( \int_M \bar{\tau}(E, x) d\mu(x) - \varepsilon \right) - \varepsilon \right] \\
&= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[ \frac{(n-K)}{n} \right] \left( \int_M \bar{\tau}(E, x) d\mu(x) - \varepsilon \right) - \varepsilon \\
&= \int_M \bar{\tau}(E, x) d\mu(x) - 2\varepsilon.
\end{aligned}$$

Esse resultado vale para todo  $\varepsilon > 0$ , então podemos passar ao limite quando  $\varepsilon \rightarrow 0$ , e temos

$$\mu(E) \geq \int_M \bar{\tau}(E, x) d\mu(x). \quad (1.12)$$

Isso completa a demonstração do caso geral, para a segunda desigualdade em (1.5). E para a primeira, basta notarmos que  $\underline{\tau}(E, x) = 1 - \bar{\tau}(M-E, x)$ . De fato, pois  $\mathcal{X}_{M-E} = 1 - \mathcal{X}_E$  o que implica  $\mathcal{X}_E = 1 - \mathcal{X}_{M-E}$ , logo

$$\begin{aligned}
\underline{\tau}(E, x) &= \liminf_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \mathcal{X}_E(f^j(x)) \\
\underline{\tau}(E, x) &= \liminf_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \left( 1 - \mathcal{X}_{M-E}(f^j(x)) \right) \\
\underline{\tau}(E, x) &= 1 - \limsup_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \mathcal{X}_{M-E}(f^j(x)) \\
\underline{\tau}(E, x) &= 1 - \bar{\tau}(M-E, x).
\end{aligned}$$

Então  $\bar{\tau}(M - E, x) = 1 - \underline{\tau}(E, x)$ , e aplicando o conjunto mensurável  $M - E$  na desigualdade (1.12) temos

$$\begin{aligned}\int_M \bar{\tau}(M - E, x) d\mu(x) &\leq \mu(M - E) \\ \int_M 1 - \underline{\tau}(E, x) d\mu(x) &\leq 1 - \mu(E) \\ 1 - \int_M \underline{\tau}(E, x) d\mu(x) &\leq 1 - \mu(E) \\ \int_M \underline{\tau}(E, x) d\mu(x) &\geq \mu(E).\end{aligned}$$

Portanto mostramos que  $\int_M \tau(E, x) d\mu(x) = \mu(E)$ , o que garante a existência do tempo médio para  $\tau(E, x)$  para  $\mu$ -quase todo ponto  $x \in M$ , provando assim o teorema.  $\square$

Para uma aplicação mensurável  $f : M \rightarrow M$ , uma função integrável  $\varphi : M \rightarrow \mathbb{R}$ , e um ponto qualquer  $x \in M$ . Definimos  $\tilde{\varphi}(x)$ , a **média temporal** da órbita de  $x$  pelo potencial  $\varphi$ , como sendo o seguinte limite

$$\tilde{\varphi}(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \varphi(f^j(x)).$$

Em geral esse limite pode não existir. Definimos também  $\bar{\varphi}$ , a **média espacial** da função  $\varphi$  em  $M$ , como sendo

$$\bar{\varphi} = \frac{1}{\mu(M)} \int_M \varphi d\mu.$$

Um caso mais geral do Teorema 1.25, conhecido como Teorema Ergódico de Birkhoff, é um dos resultados principais dessa seção, e será enunciado a seguir.

**Teorema 1.26. (Teorema Ergódico de Birkhoff)** *Sejam  $f : M \rightarrow M$  uma aplicação mensurável e  $\mu$  uma probabilidade  $f$ -invariante. Dada qualquer função integrável  $\varphi : M \rightarrow \mathbb{R}$ , a média temporal  $\tilde{\varphi}(x)$  existe em  $\mu$ -quase todo ponto  $x \in M$ . Além disso,*

$$\int_M \tilde{\varphi} d\mu = \int_M \varphi d\mu.$$

*Demonstração.* Este enunciado mais geral pode ser provado usando uma versão um pouco mais elaborada do argumento usado pra provar o Teorema 1.25, que pode ser encontrada em [5], no Capítulo 3, Teorema 3.2.3.  $\square$

O Teorema 1.25 é o caso particular do Teorema Ergódico de Birkhoff 1.26 quando  $\varphi = \mathcal{X}_E$ , a função característica do conjunto  $E$ .

### 1.2.1 Ergodicidade

Dizemos que uma aplicação  $f : M \rightarrow M$  é **ergódica** para uma probabilidade  $f$ -invariante  $\mu$  (também dizemos que a probabilidade  $\mu$  é ergódica pra  $f$ , ou que o sistema  $(f, \mu)$  é ergódico) se as médias temporais coincidirem  $\mu$ -quase todo ponto  $x \in M$  com as respectivas médias espaciais, ou seja,  $\tilde{\varphi}(x) = \bar{\varphi}$  para  $\mu$ -quase todo ponto  $x \in M$  e para toda função integrável  $\varphi : M \rightarrow \mathbb{R}$ . Uma função  $\psi : M \rightarrow \mathbb{R}$  é dita  $f$ -**invariante** se  $(\psi \circ f)(x) = \psi(x)$  para  $\mu$ -quase todo ponto  $x \in M$ .

**Proposição 1.27.** *Sejam  $f : M \rightarrow M$  uma aplicação mensurável e  $\varphi : M \rightarrow \mathbb{R}$  uma função integrável. Então a média temporal  $\tilde{\varphi}$  é  $f$ -invariante.*

*Demonstração.* Para demonstrarmos essa Proposição, precisaremos enunciar o seguinte Lema, cuja demonstração é encontrada em [5], no Capítulo 3, Lema 3.2.5.

**Lema 1.28.** *Sejam  $f : M \rightarrow M$  uma aplicação mensurável e  $\phi : M \rightarrow \mathbb{R}$  uma função integrável, então  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \phi(f^n(x)) = 0$  para  $\mu$ -quase todo ponto  $x \in M$ .*

Então, sejam  $\varphi : M \rightarrow \mathbb{R}$  um função integrável qualquer e a sua média temporal

$$\tilde{\varphi}(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \varphi(f^j(x)).$$

Fixemos um  $x \in M$ , e temos

$$\begin{aligned} (\tilde{\varphi} \circ f)(x) &= \tilde{\varphi}(f(x)) \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \varphi(f^j(f(x))) \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \varphi(f^{j+1}(x)) \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \varphi(f^j(x)) \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \left[ \sum_{j=0}^{n-1} \varphi(f^j(x)) + \varphi(f^n(x)) - \varphi(f^0(x)) \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \varphi(f^j(x)) + \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \varphi(f^n(x)) - \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \varphi(x) \\ &= \tilde{\varphi}(x) + \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \varphi(f^n(x)). \end{aligned}$$

E pelo Lema 1.28 temos  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \varphi(f^n(x)) = 0$  para  $\mu$ -quase todo ponto  $x \in M$ . Portanto  $\tilde{\varphi}$  é  $f$ -invariante. □

Existem várias maneiras equivalentes de definir a ergodicidade de uma aplicação, o próximo teorema relaciona alguma delas.

**Teorema 1.29.** *Sejam  $f : M \rightarrow M$  uma aplicação mensurável e  $\mu$  uma probabilidade  $f$ -invariante. São equivalentes:*

- i) O sistema  $(f, \mu)$  é ergódico.*
- ii) Se  $E \subseteq M$  é um conjunto mensurável  $f$ -invariante, então  $\mu(E) = 0$  ou  $\mu(E) = 1$ .*
- iii) Se  $\psi : M \rightarrow \mathbb{R}$  é uma função mensurável  $f$ -invariante, então  $\psi$  é constante para  $\mu$ -quase todo ponto  $x \in M$ .*

*Demonstração.* *i)  $\Rightarrow$  ii)* Seja  $E \subseteq M$  um conjunto mensurável, como  $f$  é ergódica, então  $\tilde{\varphi}(x) = \int_M \varphi d\mu$  para toda função  $\varphi$  integrável e para  $\mu$ -quase todo ponto  $x \in M$ . Tomemos  $\varphi = \mathcal{X}_E$ , a função característica do conjunto  $E$ , então

$$\tilde{\mathcal{X}}_E(x) = \int_M \mathcal{X}_E d\mu = \mu(E)$$

Temos também que  $f(E) = E$ , pois  $E$  é  $f$ -invariante, então

$$\begin{aligned} \mu(E) &= \tilde{\mathcal{X}}_E(x) \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \mathcal{X}_E(f^j(x)) \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \mathcal{X}_E(x) \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} (n \mathcal{X}_E(x)) \\ &= \mathcal{X}_E(x) \end{aligned}$$

E como  $\mathcal{X}_E(x)$  só assume valores em  $\{0, 1\}$ , então  $\mu(E) = 0$  ou  $\mu(E) = 1$ .

*ii)  $\Rightarrow$  iii)* Sejam  $\psi : M \rightarrow \mathbb{R}$  uma função mensurável  $f$ -invariante e  $c \in \mathbb{R}$  uma constante qualquer, então os conjuntos  $\psi^{-1}(c) \subseteq M$  são  $f$ -invariantes. De fato, se  $x \in \psi^{-1}(c)$  então  $\psi(x) = c$ , e como  $\psi$  é  $f$ -invariante temos que  $\psi(f(x)) = \psi(x) = c$ , logo  $f(x) \in \psi^{-1}(c)$ . O que implica que  $f(\psi^{-1}(c)) \subseteq \psi^{-1}(c)$ . Reciprocamente, se  $f(x) \in \psi^{-1}(c)$  então  $\psi(f(x)) = c$ , e como  $\psi$  é  $f$ -invariante temos que  $\psi(x) = \psi(f(x)) = c$ , logo  $x \in \psi^{-1}(c)$ . O que implica que  $\psi^{-1}(c) \subseteq f(\psi^{-1}(c))$ . Portando  $\psi^{-1}(c) = f(\psi^{-1}(c))$ .

Logo, por hipótese temos que  $\mu(\psi^{-1}(c)) = 0$  ou  $\mu(\psi^{-1}(c)) = 1$ , e como  $c$  é uma constante qualquer, então existe  $c \in \mathbb{R}$  tal que  $\mu(\psi^{-1}(c)) = 1$ . De fato, suponhamos que não exista  $c \in \mathbb{R}$

tal que  $\mu(\psi^{-1}(c)) = 1$ . Então  $\mu(\psi^{-1}(c)) = 0$  para todo  $c \in \mathbb{R}$ , logo

$$0 \leq \mu(M) = \mu(\psi^{-1}(\mathbb{R})) = \mu\left(\psi^{-1}\left(\bigcup_{c \in \mathbb{R}} \{c\}\right)\right) \leq \sum_{c \in \mathbb{R}} \mu(\psi^{-1}(c)) = 0,$$

o que é um absurdo pois  $\mu(M) = 1$ . Portanto existe uma constante  $c \in \mathbb{R}$  tal que  $\psi(x) = c$  para  $\mu$ -quase todo ponto  $x \in M$ .

*iii)  $\Rightarrow$  i)* Seja  $\varphi : M \rightarrow \mathbb{R}$  uma função integrável. Pela Proposição 1.27,  $\tilde{\varphi}$  é uma função  $f$ -invariante. Então, por hipótese,  $\tilde{\varphi}$  é constante para  $\mu$ -quase todo ponto  $x \in M$  e, pelo Teorema Ergódico de Birkhoff 1.26, temos

$$\bar{\varphi} = \int_M \varphi d\mu = \int_M \tilde{\varphi} d\mu = \tilde{\varphi} \int_M 1 d\mu = \tilde{\varphi} \mu(M) = \tilde{\varphi}.$$

Portanto  $(f, \mu)$  é ergódico. □

Dizemos que uma medida  $\nu$  é **absolutamente contínua** em relação a outra medida  $\mu$ , e denotamos por  $\nu \ll \mu$ , se para todo conjunto mensurável  $E \subseteq M$  tal que  $\mu(E) = 0$ , então  $\nu(E) = 0$ . O próximo resultado mostra que duas medidas absolutamente contínua e  $f$ -invariante, se forem ergódicas então são iguais.

**Proposição 1.30.** *Sejam  $f : M \rightarrow M$  uma aplicação mensurável e,  $\mu$  e  $\nu$  probabilidades invariantes. Se  $\mu$  é ergódica pra  $f$  e  $\nu$  é absolutamente contínua em relação a  $\mu$ , então  $\mu = \nu$ .*

*Demonstração.* Sejam  $E \subseteq M$  um conjunto mensurável qualquer e  $\mathcal{X}_E : M \rightarrow \mathbb{R}$  a sua função característica. Como  $\mu$  é ergódica pra  $f$ , então  $\tilde{\mathcal{X}}_E(x) = \overline{\mathcal{X}_E} = \int_M \mathcal{X}_E d\mu = \mu(E)$  para  $\mu$ -quase todo ponto  $x \in M$ , e como  $\nu \ll \mu$ , então  $\tilde{\mathcal{X}}_E(x) = \mu(E)$  para  $\nu$ -quase todo ponto  $x \in M$ . Logo,

$$\int_M \tilde{\mathcal{X}}_E(x) d\nu = \int_M \mu(E) d\nu = \mu(E) \int_M 1 d\nu = \mu(E).$$

E pelo Teorema Ergódico de Birkhoff 1.26, temos

$$\mu(E) = \int_M \tilde{\mathcal{X}}_E(x) d\nu = \int_M \mathcal{X}_E d\nu = \nu(E).$$

Como  $E \subseteq M$  é um conjunto mensurável qualquer, então  $\mu = \nu$ . □

## Capítulo 2

# Densidade das Variedades Estáveis e Instáveis dos Difeomorfismos de Anosov

Neste capítulo estudaremos o comportamento das variedades estáveis e instáveis para difeomorfismos de Anosov. Para tal precisaremos de algumas definições adicionais. Seja  $f : M \rightarrow M$  um difeomorfismo de Anosov. Considerando  $W^s(x) \subseteq M$  a variedade estável do ponto  $x \in M$ , chamamos de **disco estável** de  $x$  de tamanho  $k$ , a bola fechada  $D_k^s(x) \subseteq W^s(x)$  de raio  $k$ , pela métrica em  $W^s(x)$ , e centrada em  $x$ . Analogamente, definimos o **disco instável**  $D_k^u(x) \subseteq W^u(x)$  de  $x$  de tamanho  $k$ . Caso precisemos deixar claro qual a função estamos nos referindo, denotaremos tais discos  $D_k^s(x, f)$  e  $D_k^u(x, f)$ , respectivamente. Dizemos que um conjunto  $A \subseteq M$  é  $\delta$ -**denso** em  $M$  se para qualquer aberto  $U$  contendo uma bola de raio  $\delta$ , tem-se que  $U \cap A \neq \emptyset$ . É claro que  $A \subseteq M$  é denso em  $M$  se, e somente se,  $A$  é  $\delta$ -denso em  $M$ , para todo  $\delta > 0$ .

Nosso principal objetivo, nesse capítulo, é estudar a  $s$ -minimalidade e  $u$ -minimalidade dos difeomorfismos de Anosov, definidas a seguir.

**Definição 2.1.** *Seja  $f : M \rightarrow M$  um difeomorfismo de Anosov. Dizemos que  $f$  é  $s$ -**minimal** se para todo ponto  $x \in M$ , a variedade estável  $W^s(x)$  é densa em  $M$ . Analogamente, dizemos que  $f$  é  $u$ -**minimal** se para todo ponto  $x \in M$ , a variedade instável  $W^u(x)$  é densa em  $M$ .*

Decorre diretamente da definição acima, a seguinte proposição.

**Proposição 2.2.** *Seja  $f : M \rightarrow M$  um difeomorfismo de Anosov. Se  $f$  for  $s$ -minimal ou  $u$ -minimal, então dado  $\delta > 0$ , existe um  $K > 0$  suficientemente grande tal que  $D_K^{s(u)}(x)$  é  $\delta$ -denso em  $M$  para todo  $x \in M$ .*

*Demonstração.* Vamos demonstrar para o caso de  $f$  ser  $s$ -minimal. Para  $u$ -minimal a demonstração é a mesma trocando os papéis de  $f$  por  $f^{-1}$ .

Sejam  $\delta > 0$  e  $x \in M$  um ponto qualquer. Como  $\overline{W^s(x)} = M$ , pois  $f$  é  $s$ -minimal, então existe  $k_x \in \mathbb{N}$  tal que  $D_{k_x}^s(x)$  é  $\delta$ -denso em  $M$ . De fato, pois  $W^s(x) = \bigcup_{k_x \in \mathbb{N}} D_{k_x}^s(x)$ .

Pela continuidade das variedades estáveis e instáveis existe uma vizinhança aberta  $V_x$  de  $x$  tal que para todo  $y \in V_x$ , temos que  $D_{k_x}^s(y)$  também é  $\delta$ -denso em  $M$ . Como  $x$  é um ponto qualquer de  $M$ , então  $\bigcup_{x \in M} V_x$  é uma cobertura aberta de  $M$ . Pela compacidade de  $M$  existe  $n \in \mathbb{N}$  tal que  $M \subseteq \bigcup_{i=1}^n V_{x_i}$ . Seja  $k_i \in \mathbb{N}$  tal que  $D_{k_{x_i}}^s(x_i)$  seja  $\delta$ -denso em  $M$ , e tomemos  $K = \max\{k_{x_1}, k_{x_2}, \dots, k_{x_n}\}$ . Então, para qualquer  $x \in M$  temos que  $x \in V_{x_i}$  para algum  $i \in \mathbb{N}$ , logo  $D_K^s(x)$  contém  $D_{k_{x_i}}^s(x)$ , e portanto é  $\delta$ -denso em  $M$ .  $\square$

Os próximos resultados são fundamentais para demonstrarmos o teorema principal dessa seção. Dizemos que um difeomorfismo  $f : M \rightarrow M$  tem **acessibilidade**, ou é **acessível**, se para todo  $x, y \in M$ , podemos ligar  $x$  a  $y$  por finitos  $W^s$  e  $W^u$ , ou seja, para todo  $x, y \in M$  existem  $x_1, x_2, \dots, x_k \in M$  tais que podemos ligar o ponto  $x$  a  $y$  pelas variedades estáveis e instáveis desses pontos  $x_i$ , para  $i = 1, 2, \dots, k$ .

**Proposição 2.3.** *Se  $f : M \rightarrow M$  é um difeomorfismo de Anosov, então  $f$  tem acessibilidade.*

*Demonstração.* Dado  $x \in M$ , definamos o seguinte conjunto:

$$A_x = \{y \in M; y \text{ pode ser ligado a } x \text{ por finitos } W^s \text{ e } W^u\}.$$

*Afirmção 1.*  $A_x \neq \emptyset$ .

De fato, pela continuidade das variedades estáveis e instáveis, existe uma vizinhança de  $x$ , tal que todo ponto dessa vizinhança está em  $A_x$ .

*Afirmção 2.*  $A_x$  é um conjunto aberto.

De fato, seja  $y \in A_x$ . Consideremos  $x_1, x_2, \dots, x_k \in M$  os pontos que dão a acessibilidade de  $x$  a  $y$  e assim suponhamos que  $W^s(y)$  intercecta transversalmente  $W^u(x_1)$  (para o caso de  $W^u(y)$  interceptar transversalmente  $W^s(x_1)$ , o raciocínio é análogo). Logo, pela continuidade das variedades estáveis, existe  $\delta > 0$  tal que se  $z \in B(y, \delta)$ , então  $W^s(z)$  intercecta transversalmente  $W^u(x_1)$ , ou seja,  $z$  é acessível também a  $x$ , logo  $B(y, \delta) \subseteq A_x$  e portanto  $A_x$  é aberto.

*Afirmção 3.*  $A_x$  é um conjunto fechado.

De fato, seja  $(y_n)_{n=1}^{+\infty} \subseteq A_x$  uma sequência convergente, e  $y$  o seu limite. Pela continuidade das variedades instáveis,  $W^u(y_n)$  converge pra  $W^u(y)$ . Tomemos  $\delta > 0$  de modo que se  $z \in B(y, \delta)$ , então  $W^s(z)$  intercecta transversalmente  $W^u(y)$ . Logo, existe um  $n_0 \in \mathbb{N}$  tal que para todo  $n > n_0$ ,  $y_n \in B(y, \delta)$  e portanto  $W^u(y_n)$  intercecta  $W^s(y)$ . Assim, fixando um  $N > n_0$ ,  $W^u(y_N)$  intercecta  $W^s(y)$ , logo  $y$  pode ser ligado a  $x$  por finitos  $W^s$  e  $W^u$ , ou seja,  $y \in A_x$  e portanto  $A_x$  é fechado.

Como  $M$  é conexo, as Afirmações 1, 2 e 3 implicam que  $A_x = M$ .  $\square$

Vamos enunciar na sequência um famoso resultado da teoria clássica de sistemas dinâmicos.

**Teorema 2.4.** ( $\lambda$ -**Lemma**) *Sejam  $f : M \rightarrow M$  um difeomorfismo,  $p \in M$  um ponto fixo hiperbólico e  $D_k^u(p)$  o disco instável compacto de  $p$  de tamanho  $k$ . Se  $D$  é um disco qualquer de mesma dimensão que  $W^u(p)$  e intersecta transversalmente  $W^s(p)$ , então dado  $\varepsilon > 0$ , podemos fixar  $n_0 \in \mathbb{N}$  tal que para todo  $n > n_0$ , existe um disco  $D_n \subseteq D$  tal que  $f^n(D_n)$  está  $\varepsilon - C^1$  próximo de  $D_k^u(p)$ .*

*Demonstração.* Pode ser encontrada em [6], na Seção 2.7, Teorema 7.1.  $\square$

**Corolário 2.5.** *Sejam  $p, q \in \text{Per}(f)$  pontos periódicos hiperbólicos de  $f$ . Se  $W^s(p) \cap W^u(q) \neq \emptyset$ , então  $W^u(p) \subseteq \overline{W^u(q)}$  e  $W^s(q) \subseteq \overline{W^s(p)}$ .*

*Demonstração.* Definamos  $g : M \rightarrow M$  tal que  $g = f^{\tau(p)\tau(q)}$ , note que  $g$  também é um difeomorfismo e  $p, q \in \text{Fix}(g)$  são pontos fixos hiperbólicos de  $g$ , ou seja,  $g^n(W^u(q, g)) = W^u(q, g)$ , para todo  $n \in \mathbb{Z}$ . Seja  $x \in W^u(p, g)$ , então existe  $D_k^u(p, g) \subseteq W^u(p, g)$  um disco instável compacto que contém  $x$ . Tomemos um disco  $D \subseteq W^u(q, g)$ , em que  $W^s(p, g) \cap D \neq \emptyset$ , ou seja,  $D$  intersecta transversalmente  $W^s(p, g)$ . Então, pelo  $\lambda$ -Lemma (Teorema 2.4), dado  $\varepsilon > 0$  podemos fixar  $n_0 \in \mathbb{N}$  tal que para todo  $n > n_0$ , existe  $D_n \subseteq D$  tal que  $g^n(D_n) \subseteq g^n(W^u(q, g)) = W^u(q, g)$  está  $\varepsilon - C^1$  próximo de  $D_k^u(p, g) \subseteq W^u(p, g)$ .

Logo, como  $\varepsilon > 0$  é dado arbitrariamente,  $x \in \overline{W^u(q, g)}$ . E como  $x$  é um qualquer, então  $W^u(p, f) = W^u(p, g) \subseteq \overline{W^u(q, g)} = \overline{W^u(q, f)}$ , como queríamos demonstrar.

Para  $W^s(q) \subseteq \overline{W^s(p)}$  a demonstração é análoga, basta notar que nesse caso a aproximação acontece no passado.  $\square$

Lembremos que uma  $\delta$ -pseudo-órbita para  $f$  é uma sequência  $\{x_n\}_{n \in \mathbb{Z}} \subseteq M$ , em que  $d(f(x_n), x_{n+1}) \leq \delta$ . Dizemos que  $\{x_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$  é uma  $\delta$ -pseudo-órbita periódica, se existe um  $n_0 \in \mathbb{N}$  tal que  $x_{n_0} = x_1$ . E um ponto  $y \in M$   $\varepsilon$ -sombreia uma pseudo-órbita  $\{x_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$  se  $d(f^n(y), x_n) \leq \varepsilon$  para todo  $n \in \mathbb{Z}$ . Quando  $f$  é um difeomorfismo de Anosov, as pseudo-órbitas periódicas são sombreadas por um ponto periódico, mais precisamente:

**Lema 2.6.** (**Lema do Sombreamento**) *Sejam  $f : M \rightarrow M$  um difeomorfismo e  $\Lambda \subseteq M$  um conjunto hiperbólico compacto. Para todo  $\varepsilon > 0$  dado, existe um  $\delta > 0$  tal que toda  $\delta$ -pseudo-órbita periódica  $\{x_0, x_1, \dots, x_{n_0}\} \subseteq \Lambda$  é  $\varepsilon$ -sombreada por um ponto periódico.*

*Demonstração.* Pode ser encontrada em [2], na Seção 10.3, Teorema 3.1.  $\square$



Agora vamos enunciar e demonstrar o resultado principal desse capítulo.

**Teorema 2.7.** *Seja  $f : M \rightarrow M$  um difeomorfismo de Anosov. As seguintes afirmações são equivalentes:*

- i)  $\Omega(f) = M$ ;
- ii)  $\overline{Per(f)} = M$ ;
- iii)  $f$  é  $s$ -minimal;
- iv)  $f$  é  $u$ -minimal;
- v)  $f$  é topologicamente mixing;
- vi)  $f$  é topologicamente transitiva.

*Demonstração.*  $i) \Rightarrow ii)$  Seja  $U \subseteq M$  um aberto qualquer. Tomemos  $B \subseteq U$  e  $\varepsilon > 0$  pequeno o suficiente, tal que  $B(x, \varepsilon) \subseteq U$ , para todo  $x \in B$ . Pelo Lema do Sombreamento 2.6 existe um  $\delta > 0$  tal que toda  $\delta$ -pseudo órbita periódica é  $\varepsilon$ -sombreada por um ponto periódico. Fixemos um  $x \in B$ , e como todo ponto  $x \subseteq M$  é não errante, existe  $n \in \mathbb{N}$  tal que  $f^n(x) \in B(x, \delta)$ . Logo, a sequência  $\{x, f(x), \dots, f^{n-1}(x)\} \subseteq M$  é uma  $\delta$ -pseudo-órbita periódica contendo  $x$ . Assim, pela Lema do Sombreamento 2.6, existe  $p \in Per(f)$  que  $\varepsilon$ -sombreia esta  $\delta$ -pseudo-órbita periódica.

Portanto, existe um ponto periódico  $p \in B(x, \varepsilon) \subseteq U$ . Como  $U \subseteq M$  é um aberto qualquer, temos  $\overline{Per(f)} = M$ .

$ii) \Rightarrow iii)$  Vamos dividir a demonstração em dois casos, primeiro vamos provar que a variedade estável de um ponto periódico qualquer é densa, e depois provaremos para um ponto qualquer.

**Caso Particular:** Sejam  $p \in Per(f)$  e  $V \subseteq M$  um aberto qualquer. Como  $\overline{Per(f)} = M$ , então existe  $p_0 \in Per(f) \cap V$ . Pela Proposição 2.3, existem  $x_1, x_2, \dots, x_k \in M$ , pontos que ligam  $p_0$  a  $p$  pelas suas respectivas variáveis instáveis ou estáveis. Pela continuidade das variedades estáveis e instáveis podemos tomar um  $\varepsilon > 0$  pequeno o suficiente de forma que  $B(p_0, \varepsilon) \subseteq V$ , e se  $d(z, w) < \varepsilon$  então  $W_\gamma^{s(u)}(z) \cap W_\gamma^{u(s)}(w) \neq \emptyset$ , em que  $W_\gamma^{u(s)}(z)$  e  $W_\gamma^{u(s)}(w)$  são as variedades estáveis (e instáveis) locais de  $z$  e  $w$ , respectivamente, e  $\gamma > 0$ . Pela densidade dos pontos periódicos, existem  $p_1, p_2, \dots, p_k \in Per(f)$ , tais que  $p_i \in B(x_i, \varepsilon)$ , para todo  $i = 1, 2, \dots, k$ . Assim, por escolha de  $\varepsilon > 0$ ,  $p_0$  pode ser ligado a  $p$  pela variedades estáveis ou instáveis desses pontos periódicos.

Como  $W^s(p) \cap W^u(p_k) \neq \emptyset$ , então  $W^s(p_k) \subseteq \overline{W^s(p)}$ , pelo Corolário 2.5. E como  $W^s(p_k) \cap W^u(p_{k-1}) \neq \emptyset$ , então  $W^s(p_{k-1}) \subseteq \overline{W^s(p_k)}$ , pelo mesmo Corolário 2.5. O que implica  $W^s(p_{k-1}) \subseteq \overline{W^s(p_k)} \subseteq \overline{W^s(p)}$ . Aplicando esse raciocínio recursivamente, temos

$$W^s(p_0) \subseteq \overline{W^s(p_1)} \subseteq \cdots \subseteq \overline{W^s(p_{k-1})} \subseteq \overline{W^s(p_k)} \subseteq \overline{W^s(p)}.$$

Então,  $p_0 \in \overline{W^s(p)}$  e portanto  $W^s(p) \cap V \neq \emptyset$ . De modo análogo concluímos que  $W^u(p)$  também é densa em  $M$ , aplicando o Corolário 2.5 nas variedades instáveis dos pontos  $p_i$ , para  $i = 1, 2, \dots, k$ .

**Caso Geral:** Seja  $x \in M$  um ponto qualquer. Dado  $\varepsilon > 0$ , existe  $k \in \mathbb{N}$  e um conjunto  $P = \{p_i \in \text{Per}(f); 1 \leq i \leq k\}$   $\varepsilon$ -denso em  $M$ . De fato,  $\bigcup_{p \in \text{Per}(f)} B(p, \varepsilon)$  é uma cobertura aberta de  $M$ , e de sua compacidade, existe  $k \in \mathbb{N}$  tal que  $M \subseteq \bigcup_{i=1}^k B(p_i, \varepsilon)$ , em que  $p_i \in \text{Per}(f)$ .

Fixando um ponto  $z \in M$ , como  $\overline{W^u(p_i)} = M$ , então existe  $z_i \in W^s(z) \cap W^u(p_i)$ , para todo  $i = 1, 2, \dots, k$ . Logo, existe  $n_i \in \mathbb{N}$  tal que para todo  $n > n_i$  temos  $f^{-n}(z_i) \in W_\varepsilon^u(p_i)$ . Tomemos  $N_z = \max\{n_1, n_2, \dots, n_k\}$ , logo para todo  $n > N_z$  temos  $f^{-n}(z_i) \in W_\varepsilon^u(p_i)$ , ou seja, o conjunto  $\{f^{-n}(z_1), f^{-n}(z_2), \dots, f^{-n}(z_k)\}$  é também  $\varepsilon$ -denso em  $M$  para todo  $n > N_z$ ; o que implica que  $f^{-n}(W^s(z))$  é  $\varepsilon$ -denso em  $M$  para todo  $n > N_z$ .

Pela continuidade das variedades estáveis e instáveis, existe  $\delta_z$  tal que o argumento acima é verdadeiro para todo  $y \in B(z, \delta_z)$ , isto é,  $f^{-n}(W^s(y))$  também é  $\varepsilon$ -denso para todo  $n > N_z$ . Como  $\bigcup_{z \in M} B(z, \delta_z)$  é uma cobertura aberta de  $M$ , de sua compacidade, existe  $t \in \mathbb{N}$  tal que  $M \subseteq \bigcup_{i=1}^t B(z_i, \delta_{z_i})$ . Tomemos  $N = \max\{N_{z_1}, N_{z_2}, \dots, N_{z_t}\}$ , logo para todo  $y \in M$  temos que  $f^{-n}(W^s(y))$  é  $\varepsilon$ -denso em  $M$ , para todo  $n > N$ . Em particular,  $W^s(x) = f^{-n}(W^s(f^n(x)))$  é  $\varepsilon$ -denso em  $M$ .

Portanto, como  $\varepsilon$  é tomado arbitrário,  $\overline{W^s(x)} = M$ .

*iii)  $\Rightarrow$  iv)* Sejam  $U \subseteq M$  um aberto qualquer e  $x \in M$  um ponto qualquer. Sejam  $y \in U$  e  $\gamma > 0$  tais que  $W_\gamma^s(y) \subseteq U$ . Tomemos um  $\varepsilon > 0$ , suficientemente pequeno, de forma que se  $d(z, w) < \varepsilon$  então  $W_\gamma^{s(u)}(z) \cap W_\gamma^{u(s)}(w) \neq \emptyset$ , o que é possível pois as variedades estáveis e instáveis variam continuamente. Pela Proposição 2.2, como  $f$  é  $s$ -minimal, existe  $K > 0$  uniforme tal que  $D_K^s(z) \subseteq W^s(z)$  é  $\varepsilon$ -denso em  $M$  para todo  $z \in M$ . Por hiperbolicidade, existe  $n \in \mathbb{N}$  tal que  $f^{-n}(W_\gamma^s(y))$  contém  $D_K^s(f^{-n}(y))$ , logo  $f^{-n}(W_\gamma^s(y))$  é  $\varepsilon$ -denso em  $M$ .

Por escolha de  $\varepsilon$  temos que  $W_\gamma^u(f^{-n}(x)) \cap f^{-n}(W_\gamma^s(y)) \neq \emptyset$ , pois  $f^{-n}(W_\gamma^s(y))$  passa  $\varepsilon$  próximo de  $f^{-n}(x)$ , ou seja, existe  $w \in f^{-n}(W_\gamma^s(y))$  tal que  $d(w, f^{-n}(x)) < \varepsilon$ , o que

implica que existe  $q \in W^u(f^{-n}(x)) \cap f^{-n}(W_\gamma^s(y))$ . Como  $q \in W^u(f^{-n}(x))$  então  $f^n(q) \in f^n(W^u(f^{-n}(x))) = W^u(x)$  e como  $q \in f^{-n}(W_\gamma^s(y))$  então  $f^n(q) \in f^n(f^{-n}(W_\gamma^s(y))) = W_\gamma^s(y) \subseteq U$ .

Portanto,  $f^n(q) \in W^u(x) \cap U$ , ou seja,  $W^u(x) \cap U \neq \emptyset$ . Como  $U \subseteq M$  é um aberto qualquer e  $x \in M$  um ponto qualquer, isso prova que  $f$  é  $u$ -minimal.

*iv)  $\Rightarrow$  v)* Sejam  $U, V \subseteq M$  dois abertos quaisquer. Tomemos  $x \in U$  um ponto qualquer e  $\delta > 0$  tal que  $V$  contenha uma bola de raio  $\delta$ . Como  $f$  é  $u$ -minimal, pela Proposição 2.2 existe um  $K > 0$  uniforme tal que  $D_K^u(z) \subseteq W^u(z)$  é  $\delta$ -denso em  $M$ , para todo  $z \in M$ .

Tomemos  $\varepsilon > 0$  tal que  $W_\varepsilon^u(x) \subseteq U$ . Por hiperbolicidade existe  $n_0 \in \mathbb{N}$  tal que para todo  $n > n_0$ , temos que  $f^n(W_\varepsilon^u(x))$  contém  $D_K^u(f^n(x))$ , ou seja,  $D_K^u(f^n(x)) \subseteq f^n(W_\varepsilon^u(x)) \subseteq W^u(f^n(x))$ . Como  $D_K^u(f^n(x))$  é  $\delta$ -denso em  $M$  e como  $D_K^u(f^n(x)) \subseteq f^n(W_\varepsilon^u(x))$ , então  $f^n(W_\varepsilon^u(x))$  também é  $\delta$ -denso em  $M$ , para todo  $n > n_0$ .

Portanto  $W_\varepsilon^u(x) \subseteq U$  e  $f^n(W_\varepsilon^u(x)) \cap V \neq \emptyset$  para todo  $n > n_0$ , ou seja,  $f$  é topologicamente *mixing*.

*v)  $\Rightarrow$  vi)* Demonstrado na Proposição 1.7.

*vi)  $\Rightarrow$  i)* Sejam  $x \in M$  um ponto qualquer e  $V_x$  uma vizinhança qualquer de  $x$ . Como  $f$  é transitiva, então existe  $n \in \mathbb{N}$  tal que  $f^n(V_x) \cap V_x \neq \emptyset$ . Logo,  $x \in \Omega(f)$  e portanto  $\Omega(f) = M$ .

□

# Capítulo 3

## Densidade das Variedades Estáveis e Instáveis dos Difeomorfismos Parcialmente Hiperbólicos

Neste capítulo enfraqueceremos as hipóteses usadas na construção do conjunto hiperbólico, não teremos os mesmos resultados do caso Anosov, mas ainda assim podemos extrair resultados interessantes. Começaremos por supor que o subespaço central não é o subespaço trivial, isto é,  $E_x^c \neq \{0\}$ , para todo  $x \in M$ . E para isso, introduziremos um novo conceito de decomposição do espaço tangente, em que um subespaço domina o outro, mais precisamente:

**Definição 3.1.** *Seja  $f : M \rightarrow M$  um difeomorfismo de classe  $C^k$  definido em uma variedade diferenciável  $M$ . Dizemos que um conjunto  $\Lambda \subseteq M$  admite uma **decomposição dominada** no espaço tangente se  $\Lambda$  é  $f$ -invariante e existem  $0 < \lambda < 1$  e  $C \in \mathbb{R}$ , tais que para cada  $x \in M$ :*

- i) Existe uma decomposição  $T_x M = E_x \oplus F_x$ ;*
- ii) Essa decomposição é  $Df$ -invariante, ou seja,  $Df(E_x) = E_{f(x)}^s$  e  $Df(F_x) = F_{f(x)}$ ;*
- iii)  $E_x$  e  $F_x$  variam continuamente com  $x$ ;*
- iv)  $\frac{\|Df^n|_{E_x}(v)\|}{\|Df^n|_{F_x}(v)\|} \leq C\lambda^n\|v\|$  para todo  $v \in T_x M$  e todo  $n \in \mathbb{N}$ .*

Essa decomposição estabelece uma relação entre os subespaços  $E_x$  e  $F_x$ , embora eles possam não contrair nem expandir sempre, sabemos que quando  $E_x$  contrai, ele o faz exponencialmente mais rápido que o  $F_x$ , e quando  $E_x$  expande,  $F_x$  também expande exponencialmente mais rápido. Note que um conjunto hiperbólico possui uma decomposição dominada, basta tomar  $E_x = E_x^s$  e  $F_x = E_x^u$ . Podemos então definir uma decomposição parcialmente hiperbólica.

**Definição 3.2.** Seja  $f : M \rightarrow M$  um difeomorfismo de classe  $C^k$  definido em uma variedade diferenciável  $M$ . Dizemos que  $\Lambda \subseteq M$  é um conjunto **parcialmente hiperbólico**, se  $\Lambda$  é  $f$ -invariante e existem  $0 < \lambda < 1$  e  $C \in \mathbb{R}$ , tais que para cada  $x \in \Lambda$ :

- i) Existe a decomposição  $T_x M = E_x^s \oplus E_x^c \oplus E_x^u$ ;
- ii) Essa decomposição é  $Df_x$ -invariante, ou seja,  $Df(E_x^s) = E_{f(x)}^s$ ,  $Df(E_x^c) = E_{f(x)}^c$  e  $Df(E_x^u) = E_{f(x)}^u$ ;
- iii)  $E_x^s$ ,  $E_x^c$  e  $E_x^u$  variam continuamente com  $x$ ;
- iv)  $\|Df^n|_{E_x^s}(v)\| \leq C\lambda^n\|v\|$  para todo  $v \in E_x^s$  e todo  $n \in \mathbb{N}$ ;
- v)  $\|Df^{-n}|_{E_x^u}(v)\| \leq C\lambda^n\|v\|$  para todo  $v \in E_x^u$  e todo  $n \in \mathbb{N}$ ;
- vi)  $\frac{\|Df^n|_{E_x^s}(v)\|}{\|Df^n|_{E_x^c}(v)\|} \leq C\lambda^n\|v\|$  e  $\frac{\|Df^n|_{E_x^c}(v)\|}{\|Df^n|_{E_x^u}(v)\|} \leq C\lambda^n\|v\|$ , para todo  $v \in T_x M$  e todo  $n \in \mathbb{N}$ .

Quando  $M$  é um conjunto parcialmente hiperbólico, chamamos  $f : M \rightarrow M$  de **difeomorfismo Parcialmente Hiperbólico**. Note que o subespaço  $E_x^c$  forma uma decomposição dominada com  $E_x^s$  e  $E_x^u$ , isto é, nos pontos em que  $E_x^c$  contrai,  $E_x^s$  contrai exponencialmente mais rápido, e nos pontos em que  $E_x^c$  expande,  $E_x^u$  expande exponencialmente mais rápido. Isso significa que os subespaços centrais são dominados em ambos os extremos pelos subespaços estáveis e instáveis. Analogamente ao caso Anosov, podemos garantir a existência de variedades estáveis e instáveis forte locais, embora elas possuam um comportamento diferente, como veremos no próximo resultado.

**Teorema 3.3.** Sejam  $f : M \rightarrow M$  um difeomorfismo de classe  $C^r$  definido em uma variedade diferenciável  $M$ ,  $\Lambda \subseteq M$  um conjunto parcialmente hiperbólico e  $x \in \Lambda$  um ponto qualquer, então existem variedades locais únicas  $W_{loc}^{ss}(x)$  e  $W_{loc}^{uu}(x)$  que integram  $E_x^s$  e  $E_x^u$ , respectivamente, em que  $f(W_{loc}^{ss}(x)) \subseteq W_{loc}^{ss}(f(x))$  e  $f^{-1}(W_{loc}^{uu}(f(x))) \subseteq W_{loc}^{uu}(x)$ . Além disso,

$$W^{ss}(x) = \bigcup_{n=0}^{+\infty} f^{-n}\left(W_{loc}^{ss}(f^n(x))\right) \quad e \quad W^{uu}(x) = \bigcup_{n=0}^{+\infty} f^n\left(W_{loc}^{uu}(f^{-n}(x))\right)$$

também são subvariedades de  $M$  de mesma dimensão que  $E_x^s$  e  $E_x^u$ , respectivamente, e variam continuamente com o  $x$ . E  $W^{ss}(x)$  é chamada de **variedade estável forte** de  $x$  e  $W^{uu}(x)$  de **variedade instável forte** de  $x$ .

*Demonstração.* Pode ser encontrada em [7], no Capítulo 5, Teorema 5.5 e Corolário 5.6.  $\square$

É claro que  $W^{ss}(x)$  e  $W^{uu}(x)$  estão contidas, respectivamente, nos conjuntos estáveis e instáveis, que em geral não são subvariedades. Nosso objetivo principal desse capítulo é estudar as propriedades provenientes da densidade das variedades fortes.

**Definição 3.4.** *Seja  $f : M \rightarrow M$  um difeomorfismo parcialmente hiperbólico. Dizemos que  $f$  é  $ss$ -**minimal** se para todo ponto  $x \in M$ , a variedade estável forte  $W^{ss}(x)$  é densa em  $M$ . Analogamente, dizemos que  $f$  é  $uu$ -**minimal** se para todo ponto  $x \in M$ , a variedade instável forte  $W^{uu}(x)$  é densa em  $M$ .*

Chamamos de **disco estável forte** de  $x$  de tamanho  $k$ , a bola fechada  $D_k^{ss}(x) \subseteq W^{ss}(x)$  de raio  $k$  pela métrica em  $W^{ss}(x)$  e centrada em  $x$ . Analogamente, definimos o **disco instável forte**  $D_k^{uu}(x) \subseteq W^{uu}(x)$  de  $x$  de tamanho  $k$ . Caso precisemos deixar claro qual a função estamos nos referindo, denotaremos tais discos por  $D_k^{ss}(x, f)$  e  $D_k^{uu}(x, f)$ , respectivamente.

Vejamos que  $ss(uu)$ -minimalidade também tem implicações topológicas na dinâmica assim como o Teorema 2.7.

**Teorema 3.5.** *Seja  $f : M \rightarrow M$  um difeomorfismo parcialmente hiperbólico. Se  $f$  for  $ss$ -minimal ou  $uu$ -minimal, então  $f$  é topologicamente mixing.*

A demonstração desse teorema é inteiramente análoga a apresentada no passo  $iii) \Rightarrow iv)$  do Teorema 2.7.

Esse teorema não é uma equivalência, como no caso Anosov, porque a demonstração de topologicamente mixing implicar  $s(u)$ -minimal depende fortemente da existência de um  $\delta > 0$  tal que se  $d(z, w) < \delta$  então  $W_\varepsilon^{s(u)}(z) \cap W_\varepsilon^{u(s)}(w) \neq \emptyset$ , o que nesse caso não acontece, pois a dimensão de  $E_x^c$  é diferente de 0, daí não podemos garantir que as variedades estáveis e instáveis fortes locais desses pontos se intersectam, por transversalidade.

A seguir estudaremos o caso em que a  $ss$ -minimalidade e  $uu$ -minimalidade existe a menos de conjuntos de medida nula.

### 3.1 $m$ -minimalidade

Existem difeomorfismos parcialmente hiperbólicos em que o conjunto dos pontos cuja variedade estável e instável forte são densas em  $M$  é um conjunto grande em termos de medida. Para estudarmos esse caso, precisaremos de algumas definições adicionais.

**Definição 3.6.** *Sejam  $f : M \rightarrow M$  um difeomorfismo parcialmente hiperbólico e  $m$  uma medida de Lebesgue  $f$ -invariante tal que  $m(M) = 1$ . Definimos os conjuntos  $\mathcal{X}^s(f) = \{x \in$*

$M; \overline{W^{ss}(x)} = M\}$  e  $\mathcal{X}^u(f) = \{x \in M; \overline{W^{uu}(x)} = M\}$ , o conjunto dos pontos que possuem variedade estável forte densa em  $M$  e o conjunto dos pontos que possuem variedade instável forte densa em  $M$ , respectivamente; e  $\mathcal{X}(f) = \mathcal{X}^s(f) \cap \mathcal{X}^u(f)$ . Dizemos que  $f$  é *ms-minimal* se  $m(\mathcal{X}^s(f)) = 1$ . Analogamente, dizemos que  $f$  é *mu-minimal* se  $m(\mathcal{X}^u(f)) = 1$ . Finalmente, dizemos que  $f$  é *m-minimal* se for ambos, *ms-minimal* e *mu-minimal*, isto é,  $m(\mathcal{X}(f)) = 1$ .

Em (Arbieto/Catalan/Nobili [1]), eles mostram que difeomorfismos *m-minimais* são abundantes no conjunto dos difeomorfismos. Mais precisamente:

**Teorema 3.7.** *Seja  $\text{Diff}_m^1(M)$  o conjunto dos difeomorfismos de  $M$  em  $M$  de classe  $C^1$  que preservam a medida  $m$ . Então, existe um conjunto aberto  $\mathcal{G} \subseteq \text{Diff}_m^1(M)$  tal que todo difeomorfismo de classe  $C^2$  parcialmente hiperbólico  $f \in \mathcal{G}$  é *m-minimal*.*

*Demonstração.* Pode ser encontrada em [1], Teorema 1.4. □

Na sequência enunciaremos o resultado principal desse capítulo.

**Teorema 3.8.** *Seja  $f : M \rightarrow M$  um difeomorfismo parcialmente hiperbólico preservando a medida de Lebesgue  $m$ . Se  $f$  for *ms-minimal* ou *mu-minimal*, então  $f$  é topologicamente mixing.*

Para provar esse teorema, demonstraremos alguns resultados preliminares, como o Lema a seguir.

**Lema 3.9.** *Sejam  $M$  uma variedade diferenciável compacta contando com uma  $\sigma$ -álgebra de Borel, e  $m$  uma medida de Lebesgue em  $M$  tal que  $m(M) = 1$ . Se  $A \subseteq M$  é um conjunto aberto e  $A \subseteq \bigcup_{x \in A} B(x, \delta_x)$ , em que  $B(x, \delta_x)$  é uma bola aberta contida em  $A$  para todo  $x \in A$ , então para todo  $\varepsilon > 0$  dado, existe um conjunto finito  $\{x_1, x_2, \dots, x_k\} \subseteq A$  tal que*

$$m\left(A - \bigcup_{i=1}^k B(x_i, \delta_{x_i})\right) < \varepsilon$$

*Demonstração.* Para uniformizar a demonstração, faremos uma substituição de notação, façamos  $\delta_x^1 = \delta_x$ .

Tomemos  $\gamma_1 = \sup\{\delta_x^1; x \in A\}$ . Pela compacidade de  $M$  temos que  $\gamma_1 \in \mathbb{R}$  e pela definição de supremo existe  $x_1 \in A$  tal que  $\delta_{x_1}^1 > \frac{\gamma_1}{2}$ .

Se  $A \subseteq \overline{B(x_1, \delta_{x_1}^1)}$ , como  $m(\overline{B(x_1, \delta_{x_1}^1)} - B(x_1, \delta_{x_1}^1)) = 0$ , então  $m(A - B(x_1, \delta_{x_1}^1)) = 0 < \varepsilon$  finalizando a demonstração.

Se  $A \not\subseteq \overline{B(x_1, \delta_{x_1}^1)}$ , então  $A - \overline{B(x_1, \delta_{x_1}^1)} \neq \emptyset$  é um conjunto aberto e podemos tomar  $\delta_x^2 < \delta_x^1$  de forma que

$$A - \overline{B(x_1, \delta_{x_1}^1)} \subseteq \bigcup_{x \in A - \overline{B(x_1, \delta_{x_1}^1)}} B(x, \delta_x^2).$$

Assim, tomemos  $\gamma_2 = \sup \{\delta_x^2; x \in A - \overline{B(x_1, \delta_{x_1}^1)}\}$ . Pela definição de supremo existe  $x_2 \in A - \overline{B(x_1, \delta_{x_1}^1)}$  tal que  $\delta_{x_2}^2 > \frac{\gamma_2}{2}$ . Note que por construção temos  $B(x_1, \delta_{x_1}^1) \cap B(x_2, \delta_{x_2}^2) = \emptyset$ .

Seguindo recursivamente esse processo de construção, podemos chegar a um dos dois casos:

**Caso 1:** Existe um  $k \in \mathbb{N}$  tal que

$$A \subseteq \bigcup_{i=1}^k \overline{B(x_i, \delta_{x_i}^i)}.$$

**Caso 2:** Existe uma sequência infinita de pontos  $x_i \in A$  tal que  $\delta_{x_i}^i > 0$  e  $B_i = B(x_i, \delta_{x_i}^i) \subseteq A$  é uma sequência de abertos dois a dois disjuntos.

Se vale o Caso 1, então a demonstração está concluída. Por outro lado vejamos o cenário do Caso 2. Observemos que como os  $B_i$  são dois a dois disjuntos e  $m(A) \leq m(M) = 1$ , temos que  $\lim_{i \rightarrow +\infty} \delta_{x_i}^i = 0$ . Usando isso mostraremos a seguinte afirmação.

$$\text{Afirmação: } m\left(A - \bigcup_{i=1}^{+\infty} B_i\right) = 0.$$

De fato, seja  $D_i = B(x_i, 5\delta_{x_i}^i)$ . Como  $\lim_{i \rightarrow +\infty} \delta_{x_i}^i = 0$ , temos que  $\lim_{i \rightarrow +\infty} m(D_i) = 0$  e portanto  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sum_{i=n+1}^{+\infty} m(D_i)\right) = 0$ . Vamos mostrar agora que  $A - \bigcup_{i=1}^n B_i \subseteq \bigcup_{i=n+1}^{\infty} D_i$ . Dado  $x \in A - \bigcup_{i=1}^n B_i$ , por definição de  $\gamma_i$  existe  $n_0 > n$  tal que  $d(x, x_{n_0}) < 4\delta_{x_{n_0}}^{n_0}$ . Daí,  $x \in B(x_{n_0}, 5\delta_{x_{n_0}}^{n_0}) = D_{n_0}$ , logo  $x \in \bigcup_{i=n+1}^{\infty} D_i$ . Como  $x \in A - \bigcup_{i=1}^n B_i$  é um qualquer, temos que  $A - \bigcup_{i=1}^n B_i \subseteq \bigcup_{i=n+1}^{\infty} D_i$ .

Logo,

$$\begin{aligned} m\left(A - \bigcup_{i=1}^{+\infty} B_i\right) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} m\left(A - \bigcup_{i=1}^n B_i\right) \\ &\leq \lim_{n \rightarrow +\infty} m\left(\bigcup_{i=n+1}^n D_i\right) \\ &\leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sum_{i=n+1}^{+\infty} m(D_i)\right) \\ &= 0. \end{aligned}$$

Mostrando a Afirmação.

Portanto, dado  $\varepsilon > 0$  existe  $k \in \mathbb{N}$  tal que  $m(A - \bigcup_{i=1}^k B_i) < \varepsilon$ . Como  $\delta_{x_i}^i \leq \delta_{x_i}$  temos

$$m\left(A - \bigcup_{i=1}^k B(x_i, \delta_{x_i})\right) \leq m\left(A - \bigcup_{i=1}^k B_i\right) < \varepsilon.$$



E assim, concluimos a demonstração.  $\square$

Definamos os conjuntos  $\mathcal{X}_\delta^s(f) = \{x \in M; W^{ss}(x) \text{ é } \delta\text{-denso em } M\}$  e  $\mathcal{X}_\delta^u(f) = \{x \in M; W^{uu}(x) \text{ é } \delta\text{-denso em } M\}$ . Note que tais conjuntos são abertos, pois  $W^{ss}(x)$  e  $W^{uu}(x)$  variam continuamente com  $x$ , e temos as seguintes inclusões:  $\mathcal{X}^s(f) \subseteq \mathcal{X}_\delta^s(f)$  e  $\mathcal{X}^u(f) \subseteq \mathcal{X}_\delta^u(f)$ . A seguinte proposição é uma consequência da definição de  $ms$ -minimal e do Lema 3.9.

**Proposição 3.10.** *Sejam  $f : M \rightarrow M$  um difeomorfismo parcialmente hiperbólico e  $\varepsilon \in (0, 1]$  dado, se  $f$  for  $ms$ -minimal ou  $mu$ -minimal, então para todo  $\delta > 0$ , existe um conjunto  $W \subseteq \mathcal{X}^{s(u)}(f)$  e  $K > 0$  suficientemente grande tal que  $D_K^{ss(uu)}(x)$  é  $\delta$ -denso em  $M$  para todo  $x \in W$  e  $m(W) > 1 - \varepsilon$ .*

*Demonstração.* Vamos provar para o caso  $ms$ -minimal. Para o caso  $mu$ -minimal a demonstração é análoga.

Seja  $\delta > 0$  e  $x \in \mathcal{X}^s(f)$  um ponto qualquer. Então, existe  $k_x > 0$  tal que  $D_{k_x}^{ss}(x)$  é  $\delta$ -denso em  $M$ . Pela continuidade das variedades estáveis fortes, existe uma vizinhança  $V_x \subseteq \mathcal{X}_\delta^s(f)$  tal que  $D_{k_x}^{ss}(y)$  é  $\delta$ -denso em  $M$  para todo  $y \in V_x$ . Como  $x$  é um ponto qualquer de  $\mathcal{X}_\delta^s(f)$ , então  $\bigcup_{x \in \mathcal{X}_\delta^s(f)} V_x$  é uma cobertura aberta, e portanto mensurável, de  $\mathcal{X}_\delta^s(f)$ . Temos que  $m(\mathcal{X}_\delta^s(f)) = 1$ , pois  $\mathcal{X}^s(f) \subseteq \mathcal{X}_\delta^s(f)$  e, por  $ms$ -minimalidade,  $m(\mathcal{X}^s(f)) = 1$ . Logo, pelo Lema 3.9, dado  $\varepsilon > 0$  existe  $n \in \mathbb{N}$  tal que  $m(\bigcup_{i=1}^n V_{x_i}) > 1 - \varepsilon$ .

Seja  $k_i \in \mathbb{N}$  tal que  $D_{k_{x_i}}^{ss}(x_i)$  seja  $\delta$ -denso em  $M$ , tomemos  $K = \max\{k_{x_1}, k_{x_2}, \dots, k_{x_n}\}$  e  $W = \mathcal{X}^s(f) \cap (\bigcup_{i=1}^n V_{x_i})$ . Note que  $m(W) = m(\bigcup_{i=1}^n V_{x_i}) > 1 - \varepsilon$ , pois  $m(\mathcal{X}^s(f)) = 1$ . Então, para todo  $x \in W$  temos que  $x \in V_{x_i}$ , para algum  $i \in \mathbb{N}$ , logo  $D_K^{ss}(x)$  contém  $D_{k_{x_i}}^{ss}(x)$ , e portanto é  $\delta$ -denso em  $M$ , concluindo a demonstração.  $\square$

Agora podemos demonstrar o Teorema 3.8.

*Demonstração do Teorema 3.8.* Vamos provar para o caso  $mu$ -minimal. Para o caso  $ms$ -minimal a demonstração é análoga.

Sejam  $U, V \subseteq M$  dois abertos quaisquer. Tomemos  $\varepsilon > 0$  tal que  $U$  contenha uma bola aberta  $B$  de raio  $\varepsilon$ , e  $D_\varepsilon^{uu}(x) \subseteq U$  para todo  $x \in B$ . Como  $B$  é aberto, então  $b = m(B) > 0$ .

Seja  $\delta > 0$  tal que  $V$  contenha uma bola de raio  $\delta$ . Como  $f$  é  $mu$ -minimal, pela Proposição 3.10 existem  $W \subseteq M$  e  $K > 0$  suficientemente grande, tal que  $D_K^{uu}(x)$  é  $\delta$ -denso para todo  $x \in W$  e  $m(W) > 1 - b$ . Por hiperbolicidade, existe  $n_0 \in \mathbb{N}$  tal que  $f^n(D_\varepsilon^{uu}(x)) \supseteq D_K^{uu}(f^n(x))$  para todo  $n > n_0$  e para todo  $x \in M$ . Observemos que  $m(f^{-n}(W)) = m(W)$  pois  $f$  preserva a medida. Fixemos  $n > n_0$ .

*Afirmação:*  $f^{-n}(W) \cap B \neq \emptyset$ .

De fato, suponhamos que  $f^{-n}(W) \cap B = \emptyset$ . Daí, por aditividade da medida, temos que se  $f^{-n}(W) \cap B = \emptyset$  então  $m(f^{-n}(W) \cup B) = m(f^{-n}(W)) + m(B) > b + 1 - b = 1$ . Absurdo pois  $f^{-n}(W) \cup B \subseteq M$  e  $m(M) = 1$ . Logo  $f^{-n}(W) \cap B \neq \emptyset$ .

Tomemos, agora,  $z \in f^{-n}(W) \cap B$ . Como  $z \in f^{-n}(W)$  temos também que  $f^n(z) \in W$ , logo  $f^n(D_\varepsilon^{uu}(z)) \supseteq D_K^{uu}(f^n(z))$  é  $\delta$ -denso em  $M$ . Por escolha de  $B$ , temos  $D_\varepsilon^{uu}(z) \subseteq U$  e por escolha de  $\delta$ , temos  $f^n(D_\varepsilon^{uu}(z))$  é  $\delta$ -denso, logo intersecta  $V$ , ou seja,  $f^n(U) \cap V \neq \emptyset$ . Como  $n > n_0$  foi fixado arbitrariamente, então  $f^n(U) \cap V \neq \emptyset$  para todo  $n > n_0$  e portanto temos que  $f$  é topologicamente mixing.  $\square$

### 3.1.1 Propriedades Ergódicas

Além das propriedades topológicas, a  $m$ -minimalidade também desfruta de propriedades ergódicas interessantes. Lembrando que uma dinâmica é ergódica para uma probabilidade  $\mu$ , se as médias temporais coincidirem  $\mu$ -quase todo ponto  $x \in M$  com as respectivas médias espaciais, isto é,  $\tilde{\varphi}(x) = \bar{\varphi}$  para  $\mu$ -quase todo ponto  $x \in M$  e para toda função integrável  $\varphi : M \rightarrow \mathbb{R}$ , em que

$$\tilde{\varphi}(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \varphi(f^j(x)) \quad \text{e} \quad \bar{\varphi} = \int_M \varphi \, d\mu.$$

Definiremos a seguir, uma propriedade ergódica satisfeita pelos difeomorfismos  $m$ -minimais.

**Definição 3.11.** *Um difeomorfismo  $f : M \rightarrow M$  é **fracamente ergódico** em relação a medida  $f$ -invariante  $\mu$ , se a órbita de  $\mu$ -quase todo ponto  $x \in M$ , é densa em  $M$ .*

A ergodicidade fraca, como já diz no nome, é uma definição mais geral do que a de ergodicidade propriamente dita, como mostra a proposição a seguir.

**Proposição 3.12.** *Seja  $f : M \rightarrow M$  um difeomorfismo ergódico em relação a uma probabilidade  $\mu$  absolutamente contínua em relação a medida de Lebesgue  $m$ . Então,  $f$  é fracamente ergódico.*

*Demonstração.* Por compacidade,  $M$  admite uma base enumerável de abertos  $\{B_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ . Dado  $k \in \mathbb{N}$ , definamos o seguinte conjunto:

$$A_k = \{x \in M; \mathcal{O}(x) \cap B_k \neq \emptyset\}.$$

*Afirmção 1:*  $A_k$  é um conjunto aberto  $f$ -invariante e  $\mu(A_k) = 1$ .

De fato, claramente  $A_k$  é  $f$ -invariante porque  $x \in A_k$  se, e somente se,  $\mathcal{O}(x) \subseteq A_k$ . Dado  $x \in A_k$  existe  $j \in \mathbb{N}$  tal que  $f^j(x) \in B_k$ . Daí, como  $B_k$  é aberto e  $f$  é um difeomorfismo,

existe um aberto  $U$  contendo  $x$ , tal que  $f^j(U) \subseteq B_k$  e portando  $U \subseteq A_k$ , ou seja,  $A_k$  é aberto. Como  $\mu$  é absolutamente contínua em relação a medida de Lebesgue  $m$  e todo conjunto aberto é mensurável na  $\sigma$ -álgebra de Borel e possui medida de Lebesgue positiva, então  $\mu(A_k) > 0$ . Pelo item *ii*) do Teorema 1.29, temos que  $\mu(A_k) = 1$ .

Portanto  $A = \bigcap_{k=1}^{\infty} A_k$  é o conjunto dos pontos que possuem órbitas densas em  $M$ . Como  $\mu(A_k) = 1$  para todo  $k \in \mathbb{N}$ , então  $\mu(A) = \mu(\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k) = \mu(\bigcup_{k=1}^{\infty} (M - A_k)) = 1$ , pois  $\mu(M - A_k) = 0$  para todo  $k \in \mathbb{N}$ . Logo,  $f$  é fracamente ergódico.  $\square$

No âmbito dos difeomorfismos parcialmente hiperbólicos, para demonstrarmos a propriedade de ergodicidade fraca, usaremos um resultado demonstrado por (Zhang[8]) que garante que as variedades estáveis fortes e as instáveis fortes estão contidas em um conjunto mensurável.

**Teorema 3.13.** *Sejam  $f : M \rightarrow M$  um difeomorfismo de classe  $C^r$ , em que  $r > 1$ ,  $\mu$  uma probabilidade  $f$ -invariante absolutamente contínua em relação a medida de Lebesgue  $m$  e  $\Lambda \subseteq M$  um conjunto mensurável parcialmente hiperbólico. Então, para cada ponto  $x \in \Lambda$ , tem-se  $W^{ss}(x) \subseteq \Lambda$  e  $W^{uu}(x) \subseteq \Lambda$ .*

*Demonstração.* Pode ser encontrada em [8], Corolário 1 do Teorema 3.3.  $\square$

Esse teorema nos leva a concluir, no lema seguinte, que se  $f : M \rightarrow M$  é um difeomorfismo  $ms(mu)$ -minimal, então não existe subconjunto  $f$ -invariante próprio de  $M$ , com medida positiva, que seja compacto.

**Lema 3.14.** *Seja  $f : M \rightarrow M$  um difeomorfismo de classe  $C^{1+\alpha}$  parcialmente hiperbólico  $ms$ -minimal ou  $mu$ -minimal. Se  $\Lambda \subseteq M$  é um conjunto compacto  $f$ -invariante com  $m(\Lambda) > 0$ , então  $\Lambda = M$ .*

*Demonstração.* Seja  $\Lambda \subseteq M$  um conjunto compacto  $f$ -invariante com  $m(\Lambda) > 0$ , pelo Teorema 3.13,  $W^{ss}(x) \subseteq \Lambda$  e  $W^{uu}(x) \subseteq \Lambda$ . Como  $m(\mathcal{X}^s(f)) = 1$ , pois  $f$  é  $ms$ -minimal, temos  $m(\Lambda \cap \mathcal{X}^s(f)) = m(\Lambda) > 0$  e daí  $\mathcal{X}^s(f) \neq \emptyset$ . Então, para todo  $x \in \Lambda \cap \mathcal{X}^s(f)$  temos  $W^{ss}(x) \subseteq \Lambda$  e  $\overline{W^{ss}(x)} = M$ , e como  $\Lambda$  é fechado, temos  $\Lambda = M$ .  $\square$

A seguinte proposição, que é uma consequência direta do lema anterior, relaciona a  $ms(mu)$ -minimalidade com  $ss(uu)$ -minimalidade.

**Proposição 3.15.** *Seja  $f : M \rightarrow M$  um difeomorfismo de classe  $C^{1+\alpha}$  parcialmente hiperbólico. Então, são verdadeiras as seguintes afirmações:*

- i) Se  $f$  é  $ms$ -minimal e existe um conjunto compacto  $f$ -invariante  $\Lambda \subseteq \mathcal{X}^s$  com  $m(\Lambda) > 0$ , então  $f$  é  $ss$ -minimal.*

ii) Se  $f$  é  $\mu$ -minimal e existe um conjunto compacto  $f$ -invariante  $\Lambda \subseteq \mathcal{X}^u$  com  $m(\Lambda) > 0$ , então  $f$  é  $uu$ -minimal.

*Demonstração.* Vamos provar o primeiro item. Para o segundo item a demonstração é análoga.

Pelo Lema 3.14, temos que  $\Lambda = M$ . Portanto, como  $\Lambda \subseteq \mathcal{X}^s(f)$ , temos  $\mathcal{X}^s(f) = M$ , ou seja,  $f$  é  $ss$ -minimal.  $\square$

Agora podemos enunciar e demonstrar o teorema que garante a ergodicidade fraca dos difeomorfismos  $ms(\mu)$ -minimal.

**Teorema 3.16.** *Seja  $f : M \rightarrow M$  um difeomorfismo de classe  $C^{1+\alpha}$  parcialmente hiperbólico. Se  $f$  é  $ms$ -minimal ou  $\mu$ -minimal, então  $f$  é fracamente ergódico.*

*Demonstração.* Por compacidade,  $M$  admite uma base enumerável de abertos  $\{B_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ . Dado  $k \in \mathbb{N}$ , definamos o seguinte conjunto:

$$A_k = \{x \in M; \mathcal{O}(x) \cap B_k = \emptyset\}.$$

*Afirmção 1:*  $A_k$  é um conjunto compacto  $f$ -invariante.

De fato, claramente  $A_k$  é  $f$ -invariante porque  $x \in A_k$  se, e somente se,  $\mathcal{O}(x) \subseteq A_k$ . E seja  $(M - A_k) = \{x \in M; \mathcal{O}(x) \cap B_k \neq \emptyset\}$ . Então, dado  $x \in (M - A_k)$  existe  $j \in \mathbb{N}$  tal que  $f^j(x) \in B_k$ . Daí, como  $B_k$  é aberto e  $f$  é um difeomorfismo, existe um aberto  $U$  contendo  $x$ , tal que  $f^j(U) \subseteq B_k$  e portando  $U \subseteq (M - A_k)$ , ou seja,  $(M - A_k)$  é aberto e por isso  $A_k$  é fechado. Logo,  $A_k \subseteq M$  é compacto, pois é um fechado contido em um compacto.

Como  $A_k \cap B_k = \emptyset$  e  $m(B_k) > 0$  pois é um aberto, temos que  $m(A_k) < m(A_k \cup B_k) \leq 1$ .

*Afirmção 2:*  $m(A_k) = 0$  para todo  $k \in \mathbb{N}$ .

De fato, suponhamos que  $m(A_k) > 0$ . Logo,  $A_k$  é um conjunto compacto  $f$ -invariante com  $m(A_k) > 0$ , e pelo Lema 3.14,  $A_k = M$ . Absurdo, pois  $A_k \cap B_k = \emptyset$ .

Portando, por construção de  $A_k$ , para cada  $k \in \mathbb{N}$  o conjunto  $(M - A_k)$  é o conjunto dos pontos cujas órbitas passam por  $B_k$ . Logo,  $\bigcap_{k \in \mathbb{N}} (M - A_k)$  é o conjunto dos pontos cujas órbitas passam por todos os abertos da base. Daí, para concluir a demonstração, basta mostrarmos que  $m\left(\bigcap_{k \in \mathbb{N}} (M - A_k)\right) = 1$ . De fato,  $m\left(\bigcup_{k \in \mathbb{N}} A_k\right) = 0$  o que implica  $m\left(\bigcap_{k \in \mathbb{N}} (M - A_k)\right) = m\left(M - \bigcup_{k \in \mathbb{N}} A_k\right) = 1$ .  $\square$

# Referências Bibliográficas

- [1] Alexander Arbieto, Thiago Catalan e Felipe Nobili, *On  $m$ -minimal partially hyperbolic diffeomorphisms*, [arXiv:1512.00388](#), 2015.
- [2] Clark Robinson, *Dynamical Systems - Stability, Symbolic Dynamics, and Chaos*, CRC Press, 2ª Edição, 1999.
- [3] Andrzej Lasota e Michael C. Mackey, *Chaos, Fractals, and Noise - Stochastic Aspects of Dynamics*, Springer, 2ª Edição, 1985.
- [4] Peter Walters, *An Introduction to Ergodic Theory*, Springer, 1ª Edição, 1982.
- [5] Krerley Oliveira e Marcelo Viana, *Fundamentos da Teoria Ergódica*, SBM, 2ª Edição, 2019.
- [6] Jacob Palis, Jr e Welington de Melo, *Geometric Theory of Dynamical Systems - An Introduction*, Springer-Verlag, 1ª Edição, 1982.
- [7] Morris W. Hirsch, Charles C. Pugh e Michael Shub, *Lecture Notes in Mathematics - Invariant Manifolds*, Springer-Verlag, 1ª Edição, 1977.
- [8] Pengfei Zhang, *Partially hyperbolic sets with positive measure and ACIP for partially hyperbolic systems*, Discrete and Continuous Dynamical Systems, volume 32, 2010. DOI:10.3934/dcds.2012.32.1435