

# 2004-AL-P-MATH-1-Q07

## 7(a)(i)

(E) has a unique solution.

$$\Rightarrow \Delta \neq 0$$

$$\Rightarrow \begin{vmatrix} 1 & a-2 & a \\ 1 & 2 & 4 \\ a & -1 & 3 \end{vmatrix} \neq 0$$

$$\Rightarrow 2a^2 - 12a + 16 \neq 0$$

$$\Rightarrow 2(a-2)(a-4) \neq 0$$

$$\Rightarrow a \neq 2 \text{ and } a \neq 4$$

On the other hand, when  $a \neq 2$  and  $a \neq 4$

$$\Rightarrow \Delta \neq 0$$

$\Rightarrow$  (S) has a unique solution.

Hence, (E) has a unique solution if and only if  $a \neq 2$  and  $a \neq 4$ .

Moreover,

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} 1 & a-2 & a \\ 1 & 2 & 4 \\ b & -1 & 3 \end{vmatrix} \text{ and } \Delta_y = \begin{vmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & 1 & 4 \\ a & b & 3 \end{vmatrix} \text{ and } \Delta_z = \begin{vmatrix} 1 & a-2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ a & -1 & b \end{vmatrix}$$

$$\Rightarrow \Delta_x = 2(b-2)(a-4) \text{ and } \Delta_y = (b-a)(a-4) \text{ and } \Delta_z = (a-b)(a-4)$$

---

When  $a \neq 2$  and  $a \neq 4$  (i.e.  $\Delta \neq 0$ )

$$\Rightarrow x = \frac{\Delta_x}{\Delta} \text{ and } y = \frac{\Delta_y}{\Delta} \text{ and } z = \frac{\Delta_z}{\Delta}$$

$$\Rightarrow x = \frac{2(b-2)(a-4)}{2(a-2)(a-4)} \text{ and } y = \frac{(b-a)(a-4)}{2(a-2)(a-4)} \text{ and } z = \frac{(a-b)(a-4)}{2(a-2)(a-4)}$$

$$\Rightarrow x = \frac{b-2}{a-2} \text{ and } y = \frac{b-a}{2(a-2)} \text{ and } z = \frac{a-b}{2(a-2)}$$

## 7(a)(ii)(1)

When  $a = 2$  (i.e.  $\Delta = 0$ ),

$$\Delta_x = 2(b-2)(a-4) \text{ and } \Delta_y = (b-a)(a-4) \text{ and } \Delta_z = (a-b)(a-4)$$

$$\Rightarrow \Delta_x = -4(b-2) \text{ and } \Delta_y = -2(b-2) \text{ and } \Delta_z = 2(b-2)$$

When (E) is consistent,  $\Delta_x = \Delta_y = \Delta_z = 0$

$$\Rightarrow -4(b-2) = -2(b-2) = 2(b-2) = 0$$

$$\Rightarrow b = 2$$

$$\text{In this case, (E) } \begin{cases} x + 2z = 1 \\ x + 2y + 4z = 1 \\ 2x - y + 3z = 2 \end{cases}$$

Consider the augmented matrix :

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 1 \\ 2 & -1 & 3 & 2 \end{array} \right]$$

$$\Rightarrow \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \end{array} \right]$$

$$\Rightarrow \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

$\Rightarrow$  The solutions are  $x = 1 - 2t$ ,  $y = -t$ ,  $z = t$  where  $t \in R$

## 7(a)(ii)(2)

When  $a = 4$ ,

$$(E) \begin{cases} x + 2y + 4z = 1 \\ x + 2y + 4z = 1 \\ 4x - y + 3z = b \end{cases}$$

$$\Rightarrow (E) \begin{cases} x + 2y + 4z = 1 \\ 4x - y + 3z = b \end{cases}$$

Consider the augmented matrix :

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 4 & 1 \\ 4 & -1 & 3 & b \end{array} \right]$$

$$\Rightarrow \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 4 & 1 \\ 0 & -9 & -13 & b-4 \end{array} \right]$$

$$\Rightarrow \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{13}{9} & \frac{4-b}{9} \end{array} \right]$$

$$\Rightarrow \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{10}{9} & \frac{1+2b}{9} \\ 0 & 1 & \frac{13}{9} & \frac{4-b}{9} \end{array} \right]$$

$\Rightarrow$  The solutions are  $x = \frac{2b - 10t + 1}{9}$ ,  $y = \frac{4 - b - 13t}{9}$ ,  $z = t$  where  $b, t \in R$

## 7(b)

Using result in (a)(ii)(1),  $x = 1 - 2t$ ,  $y = -t$ ,  $z = t$  where  $t \in R$

Since  $x, y, z$  satisfy  $k(x^2 - 3) > yz$

$$\Rightarrow k[(1 - 2t)^2 - 3] > -t^2$$

$$\Rightarrow (4k + 1)t^2 - 4kt - 2k > 0$$

$$\Rightarrow 4k + 1 > 0 \text{ and } (-4k)^2 - 4(4k + 1)(-2k) < 0$$

$$\Rightarrow k > -\frac{1}{4} \text{ and } 48k^2 + 8k < 0$$

$$\Rightarrow k > -\frac{1}{4} \text{ and } k(6k + 1) < 0$$

$$\Rightarrow k > -\frac{1}{4} \text{ and } \{ (k < 0 \text{ and } 6k + 1 > 0) \text{ or } (k > 0 \text{ and } 6k + 1 < 0) \}$$

$$\Rightarrow k > -\frac{1}{4} \text{ and } \{ (k < 0 \text{ and } k > -\frac{1}{6}) \text{ or } (k > 0 \text{ and } k < -\frac{1}{6}) \text{ rejected } \}$$

$$\Rightarrow k > -\frac{1}{4} \text{ and } k < 0 \text{ and } k > -\frac{1}{6}$$

$$\Rightarrow k > -\frac{1}{6} \text{ and } k < 0$$