

HyperGal : Modéliseur de scène pour l'extraction de sources ponctuelles

La première partie de ce manuscrit était dédiée à la présentation du contexte scientifique dans lequel ce travail de recherche est effectué.

Nous avons dans un premier temps introduit les notions de cosmologies nécessaires pour comprendre l'environnement scientifique de travail, ainsi que la nature et le rôle des supernovae de type Ia en tant que sondes cosmologiques.

Dans un second temps nous avons présenté la collaboration Zwicky Transient Facility, ses différents groupes de recherches et plus particulièrement la place qu'occupe l'étude des SNeIa dans ce relevé astronomique nouvelle génération. Après avoir introduit la nécessité d'une méthode de classification spectroscopique des événements transitoires détectés par la caméra ZTF, nous avons présenté la Spectral Energy Distribution machine, un spectrographe 3D que possède la collaboration et conçu pour la classification.

Le pipeline de réduction de données actuel, **PYSEDm**, permet également une extraction des sources ponctuelles observées par la caméra de l'IFU de la SEDm. La méthode implémentée est toutefois rudimentaire, et ne permet pas de palier aux nombreuses situations de contamination de la source ponctuelle par sa galaxie hôte.

Non seulement cela induit une perte statistique de supernovae classifiables non négligeable, mais de surcroît cela induit un biais environnemental dans l'échantillon des SNeIa de ZTF.

C'est pour répondre à cette problématique que nous introduisons **HYPERGAL**, un modéliseur de scène pour l'extraction de sources ponctuelles.

4.1 Idée générale

4.1.1 Problématique

Le champ de vue de la SEDm étant étroit (28×28 arcsec), nous avons en général 3 composantes qui composent la scène, à savoir le fond du ciel, la galaxie hôte et la source ponctuelle.

La difficulté majeure d'une modélisation de scène spectrale provient de la chromaticité de chacune de ces composantes, et plus particulièrement de la galaxie qui est une source structurée de forme et chromaticité variable.

Une première idée serait d'attendre l'extinction de l'évènement transitoire, réobserver l'hôte, et projeter cette seconde acquisition dans l'espace de la première observation afin d'isoler la source ponctuelle. Une telle approche est envisageable pour une extraction de quelques cibles, mais en aucun cas à notre époque où les relevés grands champs et à haute cadence deviennent légions et observent des milliers de supernovae par an.

Le but d'**HYPERGAL** est de pouvoir modéliser la scène observée par la SEDm après réduction des données, c'est à dire le cube 3D, à la volée des observations.

Il va donc non seulement falloir trouver un moyen de modéliser chacune des composantes, mais également de les projeter dans l'espace des observations de la SEDm. Cela implique une étude profonde des caractéristiques de l'instrument mais également de prendre en compte les conditions environnementales comme l'atmosphère le long de la ligne de visée.

4.1.2 La composante galactique

La motivation principale de ce modéliseur de scène est le fait que nous avons des informations sur la galaxie hôte avant l'apparition de l'évènement transitoire. En effet, d'autres relevés astronomiques comme le Sloan Digital Sky Survey (SDSS; [York et al. \(2000\)](#)) ou Panstarrs ([Chambers et al., 2016](#)) ont couvert des portions communes de ciel avec ZTF, et permettent donc de remonter à des informations photométriques de la galaxie encore isolée de la supernova.

Sauf que nous souhaitons une modélisation spectrale. Il faut donc un moyen de passer de l'espace photométrique à l'espace spectral, autrement dit estimer la Spectral Energy Distribution (SED) de la galaxie.

Plus précisément encore, l'objectif est de pouvoir recréer un cube 3D contenant uniquement la galaxie, afin de pouvoir le projeter dans l'espace de la SEDm en prenant en compte les propriétés de l'instrument et les conditions d'observation. Donc non seulement il faut être en mesure de passer de l'espace photométrique à l'espace spectral, mais il faut le faire localement pour que chaque spaxel du cube modèle ait son propre spectre associé.

Une approche triviale de ce problème serait de partir d'images de plusieurs bandes photométriques de la galaxie, et interpoler un spectre pour chaque pixel de ces images à l'aide d'un simple polynôme. Cela permettrait de créer un cube 3D avec une source structurée. Mais grâce à l'avènement de nombreux instruments terrestres et spatiaux lancés au cours des dernières décennies, nous avons une certaine connaissance de la composition d'une galaxie, et ainsi des différentes contributions qui forment sa SED.

L'idée est donc d'utiliser un SED Fitter appliqué aux données photométriques de la galaxie, afin de construire un cube 3D qui servira de base pour le modéliseur de scène.

très difficile, comme par exemple la dégénérescence entre l'âge et la métallicité (Worthey, 1994), ou encore l'âge et l'atténuation (Papovich et al., 2001).

Ces deux dernières décennies ont été extrêmement riches en développement de modèles et observations panchromatiques, permettant une compréhension de plus en plus fine de la formation et l'évolution d'une galaxie.

Ont vu ainsi le jour des modèles de populations stellaires grâce à Fioc & Rocca-Volmerange (1997), Bruzual & Charlot (2003) et Maraston (2005). D'un autre côté, différentes lois d'atténuation par la poussière ont été développées, comme par Calzetti et al. (1994, 2000) via l'étude de SED de galaxies proches ayant un fort taux de formation stellaire, ou encore avec une approche plus théorique de modèles de transferts radiatifs (Witt & Gordon, 2000). Comme mentionné précédemment, la poussière ré-émet dans l'infrarouge et l'étude et la modélisation de ce phénomène est un domaine actif de recherche (Casey, 2012; Dale et al., 2014; Draine & Li, 2007; Chary & Elbaz, 2001).

La manipulation de modèles pour chaque processus physique en oeuvre dans une galaxie a permis l'émergence de nombreuses méthodes pour fitter une SED. Ces nouvelles techniques permettent ainsi d'inférer les propriétés intrinsèques des galaxies observées (locales, globales ou les deux), de pouvoir interpoler un spectre à partir d'informations photométriques ou encore d'en estimer le redshift.

4.2.2 SED Fitter

Le fit d'une distribution énergétique spectrale d'une galaxie est la méthode première permettant d'inférer ses propriétés physiques intrinsèques à partir d'observations. Ces propriétés peuvent ensuite être confrontés aux prédictions provenant de théories d'évolution et formations de galaxies. De ce fait, l'utilisation de SED Fitter est une pratique très fréquente lorsqu'il s'agit de tester des hypothèses en astronomie extragalactique (Tinsley, 1980; Walcher et al., 2011; Conroy, 2013; Chevallard & Charlot, 2016; Briday et al., 2022).

Trois composantes sont nécessaires pour procéder à un fit de SED : un modèle physique qui décrit les différentes contributions qui la composent, des données d'observations de la galaxie (photométriques et/ou spectroscopiques) et le fitteur lui-même qui va inférer la combinaison adéquate entre les modèles physiques et les observations.

De nombreuses techniques de SED Fitting ont été développées, certaines basées sur la simple optimisation de maximum de vraisemblance, parfois appelée code d'inversion, comme dans ULYSS¹ (Koleva et al., 2009), FIREFLY² (Wilkinson et al., 2017) ou LEPHARE³ (Arnouts & Ilbert, 2011) plus axé sur la détermination de redshift photométrique.

Cette technique est très populaire de part sa rapidité de calcul et une certaine simplicité à mettre en place. Néanmoins ces avantages sont bridés par certaines limites. Par exemple, de part la haute non-Gaussianité de certains espaces de vraisemblance, un léger changement dans les données d'entrées (comme un bruit dans une image photométrique de galaxie) peut conduire à de grands écarts dans les paramètres inférés (Ocvirk et al., 2006). Par ailleurs, une méthode de maximum de vraisemblance peut être difficile à adapter à des modèles hautement non-linéaires comme l'émission par la poussière.

Dans l'optique de résoudre ces problèmes, des techniques de forward-modeling Bayésien

1. <http://ulyss.univ-lyon1.fr>

2. <http://www.icg.port.ac.uk/firefly/>

3. <https://www.cfht.hawaii.edu/~arnouts/LEPHARE/lephare.html>




FIGURE 4.2 – Présentation du pipeline HYPERGAL .

ont à leur tour été développées. Avec cette méthode, des grilles de paramètres sont pré-calculées puis comparées aux observations. Le calcul de vraisemblance est alors très rapidement déterminée, malgré le fait que le nombre de modèle à calculer au préalable croît exponentiellement à mesure que l'on rajoute des paramètres. Parmi les codes développés à partir de cette méthode, on peut citer Kauffmann et al. (2003), Salim et al. (2007), le framework CIGALE¹ (Burgarella et al., 2005; Noll et al., 2009; Boquien et al., 2019) ou encore MAGPHYS² (da Cunha et al., 2008).

Le succès du forward-modeling Bayésien a rapidement été adopté, et étendu à un couplage avec des algorithmes de Monte-Carlo par chaînes de Markov (MCMC) pour plus efficacement explorer l'espace des posterior. Cette extension, initiée par Acquaviva et al. (2011) avec GALMC (retiré du domaine public par faute de maintenance), puis rapidement suivi de codes plus récents tels que BEAGLE³ (Chevallard & Charlot, 2016), BAGPIPES⁴ (Carnall et al., 2018, 2019) ou encore plus récemment PROSPECTOR⁵ (Johnson et al., 2021) et PIXEDFIT⁶ (Abdurro'uf et al., 2021).

Nous terminerons la présentation des SED Fitter en mentionnant le site sedfitting.org, maintenu par Tamas Budavari, Daniel Dale, Brent Groves et Jakob Walcher qui regroupe la grande majorité des codes et set de modèles disponibles publiquement.

4.3 Présentation du Pipeline

Nous allons à présent introduire le modélisateur de scène HYPERGAL . Les étapes principales de ce pipeline sont présentées dans la Figure 4.2, et tracerons l'organisation de cette Partie du manuscrit.

1. <https://cigale.lam.fr>
2. <http://www.iap.fr/magphys/>
3. <http://www.jacopochevallard.org/beagle/>
4. <https://github.com/ACCarnall/bagpipes>
5. <https://github.com/bd-j/prospector>
6. <https://github.com/aabdurrouf/pixedfit>

4.3.1 Cube intrinsèque

Comme abordé dans la section 4.1, le coeur d'**HYPERGAL** repose sur la conception d'un cube 3D contenant la galaxie hôte isolée de sa supernova : c'est la modélisation hyperspectrale de la galaxie. Le but n'est pas de remonter aux propriétés intrinsèques de la galaxie, mais de simplement être en mesure d'interpoler un spectre cohérent à l'échelle local.

Cette étape, entièrement indépendante des observations de la SEDm, va nécessiter l'utilisation d'un SED Fitter, que nous avons introduit dans la section 4.2. Dans un premier temps, nous allons récupérer des images de différentes bandes photométriques de la galaxie hôte de la supernova détectée par ZTF. On procèdera ensuite à un fitting de SEDs de portions locales de la galaxie, ce qui permettra d'obtenir une multitude de spectres propre à chaque région de la galaxie. Avec un échantillonnage spectral adéquat, nous serons ainsi en mesure de reconstruire un cube 3D, dont les deux dimensions spatiales (x, y) seront définis par les images photométriques, et la dimension spectral par le SED Fitter. Le cube résultant ne contiendra ainsi que la galaxie hôte, et sera appelé dans la suite de ce manuscrit *cube intrinsèque*. Cette étape de modélisation hyperspectrale est détaillée dans le Chapitre ??.

4.3.2 Modélisation de scène 2D

Dans cette seconde étape, les observations de la SEDm deviennent nécessaires : le but ici est de projeter le cube intrinsèque de la galaxie dans l'espace des observations. Pour faire cela, nous allons de façon indépendante caractériser la réponse impulsionnelle spatiale et spectrale de la SEDm (Chapitre ??).

En utilisant ces informations, nous projetterons dans l'espace de la SEDm le cube intrinsèque préalablement scindé en N méta-tranches (2D). Il faudra pour cela prendre en compte la forme et la taille de l'échantillonnage spatial des deux espaces (source photométrique et MLA de la SEDm) ainsi que la différence de seeing. En plus de la composante galactique, nous caractériserons les composantes de supernova, de fond de ciel et de potentiels artefacts à modéliser pour compléter la scène. La projection de chaque meta-tranche dans l'espace SEDm sera fittée aux meta-tranches correspondantes de l'observation, dont la minimisation permettra de récupérer un set de $N \times 2D$ paramètres.

4.3.3 Modélisation chromatique et projection 3D

Les $N \times 2D$ paramètres sont ensuite utilisés pour fixer la chromaticité des composantes de la scène, comme la réponse impulsionnelle spatiale de la SEDm (fonction d'étalement de point ; PSF) ou la variation de la position des objets dans le MLA due à la réfraction de la lumière par l'atmosphère (ADR). Les modèles de chromaticités sont déterminés a priori, et les paramètres de ces modèles sont fittés à partir des $N \times 2D$ paramètres obtenus de l'étape précédente.

Une fois la chromaticité fixée, l'ensemble des paramètres de projection de chaque tranche du cube intrinsèque dans l'espace SEDm devient fixe, et seuls les paramètres d'amplitudes (fond de ciel, supernova...) sont fittés pour chaque longueur d'onde. Cette étape permet ainsi d'extraire les trois composantes de la scène d'observation de la SEDm, à savoir le background, la galaxie hôte et la source ponctuelle.

Bibliographie

- Abdurro'uf, Lin, Y.-T., Wu, P.-F., & Akiyama, M. 2021, [The Astrophysical Journal, Supplement, 254, 15](#)
- Acquaviva, V., Gawiser, E., & Guaita, L. 2011, [The Astrophysical Journal, 737, 47](#)
- Arnouts, S. & Ilbert, O. 2011, LePHARE : Photometric Analysis for Redshift Estimate, Astrophysics Source Code Library, record ascl :1108.009
- Boquien, M., Burgarella, D., Roehlly, Y., et al. 2019, [Astronomy and Astrophysics, 622, A103](#)
- Briday, M., Rigault, M., Graziani, R., et al. 2022, [Astronomy and Astrophysics, 657, A22](#)
- Bruzual, G. & Charlot, S. 2003, [Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 344, 1000](#)
- Burgarella, D., Buat, V., & Iglesias-Páramo, J. 2005, [Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 360, 1413](#)
- Calzetti, D., Armus, L., Bohlin, R. C., et al. 2000, [The Astrophysical Journal, 533, 682](#)
- Calzetti, D., Kinney, A. L., & Storchi-Bergmann, T. 1994, [The Astrophysical Journal, 429, 582](#)
- Carnall, A. C., McLure, R. J., Dunlop, J. S., et al. 2019, [Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 490, 417](#)
- Carnall, A. C., McLure, R. J., Dunlop, J. S., & Davé, R. 2018, [Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 480, 4379](#)
- Casey, C. M. 2012, [Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 425, 3094](#)
- Chambers, K. C., Magnier, E. A., Metcalfe, N., et al. 2016, [arXiv e-prints, arXiv:1612.05560](#)
- Chary, R. & Elbaz, D. 2001, [The Astrophysical Journal, 556, 562](#)
- Chevallard, J. & Charlot, S. 2016, [Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 462, 1415](#)
- Conroy, C. 2013, [Annual Review of Astronomy & Astrophysics, 51, 393](#)
- da Cunha, E., Charlot, S., & Elbaz, D. 2008, [Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 388, 1595](#)
- Dale, D. A., Helou, G., Magdis, G. E., et al. 2014, [The Astrophysical Journal, 784, 83](#)
- Draine, B. T. & Li, A. 2007, [The Astrophysical Journal, 657, 810](#)

- Fioc, M. & Rocca-Volmerange, B. 1997, *Astronomy and Astrophysics*, 326, 950
- Johnson, B. D., Leja, J., Conroy, C., & Speagle, J. S. 2021, *The Astrophysical Journal, Supplement*, 254, 22
- Kauffmann, G., Heckman, T. M., White, S. D. M., et al. 2003, *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 341, 33
- Koleva, M., Prugniel, P., Bouchard, A., & Wu, Y. 2009, *Astronomy and Astrophysics*, 501, 1269
- Kormendy, J. & Ho, L. C. 2013, *Annual Review of Astronomy & Astrophysics*, 51, 511
- Maraston, C. 2005, *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 362, 799
- Noll, S., Burgarella, D., Giovannoli, E., et al. 2009, *Astronomy and Astrophysics*, 507, 1793
- Ocvirk, P., Pichon, C., Lançon, A., & Thiébaud, E. 2006, *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 365, 46
- Papovich, C., Dickinson, M., & Ferguson, H. C. 2001, *The Astrophysical Journal*, 559, 620
- Salim, S., Rich, R. M., Charlot, S., et al. 2007, *The Astrophysical Journal, Supplement*, 173, 267
- Tinsley, B. M. 1980, *Fundamentals Cosmic Phys.*, 5, 287
- Walcher, J., Groves, B., Budavári, T., & Dale, D. 2011, *Astrophysics & Space Science*, 331, 1
- Wilkinson, D. M., Maraston, C., Goddard, D., Thomas, D., & Parikh, T. 2017, *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 472, 4297
- Witt, A. N. & Gordon, K. D. 2000, *The Astrophysical Journal*, 528, 799
- Worthey, G. 1994, *The Astrophysical Journal, Supplement*, 95, 107
- York, D. G., Adelman, J., Anderson, John E., J., et al. 2000, *The Astronomical Journal*, 120, 1579