

TA section 6

JERRY C.

108354501@nccu.edu.tw

April 22, 2025

Review: Point Estimation

估計量的優劣評估

■ **不偏性:** $\mathbb{E}[T(\mathbf{X})] = q(\theta)$.

– 不偏估計量非唯一。

■ **效率性:** (相對有效性)

- **均方差較佳估計量:** $re(T_2, T_1) = R(\theta, T_1)/R(\theta, T_2) \leq 1$ (T_1 較佳) – $q(\theta)$ 之均方差 (MSE):

$$MSE_{\theta}(T) = R(\theta, T) = \mathbb{E}[(T(\mathbf{X}) - q(\theta))^2] = \text{Var}[T(\mathbf{X})] + \text{Bias}_{\theta}^2(T(\mathbf{X})).$$

– $\text{Var}[T(\mathbf{X})] = \mathbb{E}[(T(\mathbf{X}) - \mathbb{E}T(\mathbf{X}))^2]$, 且 $\text{Bias}_{\theta}(T(\mathbf{X})) = \mathbb{E}[T(\mathbf{X})] - q(\theta)$.

- **最佳不偏估計量 (best unbiased estimator, BUE):** CRLB (Cramer-Rao lower bound): $(q'(\theta))^2/I(\theta)$; “效率可達性 (Efficiency Attainment)”。
- **均勻最小變異不偏估計量 (uniformly minimum variance unbiased estimator, UMVUE):**
 - [Rao-Blackwell Theorem]: (充份 + 不偏 \Rightarrow 效率)
 - [Lehmann-Scheffé (-Rao-Blackwell) Theorem]: (完備 + 充份 + 不偏 \Rightarrow 效率)
- **BUE \Rightarrow UMVUE.** ,i.e., $\text{Var}[\text{BUE}] \leq \text{Var}[\text{UMVUE}]$. (即: UMVUE 可能達不到 CRLB)

大樣本性質

■ 一致性:

- (weak consistency) $T_n \xrightarrow{P} q(\theta)$ as $n \rightarrow \infty$ if

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|T_n - q(\theta)| < \epsilon) = 1, \forall \epsilon > 0.$$

- (mean-squares consistency/ L_2 -norm consistency) $T_n \xrightarrow{\text{m.s.}} q(\theta)$ as $n \rightarrow \infty$ if

$$\mathbb{E}[(T_n - q(\theta))^2] \rightarrow 0, \text{ as } n \rightarrow \infty.$$

或 $\lim_{n \rightarrow \infty} \text{Var}[T_n] = 0$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \text{Bias}_\theta(T_n) = 0$.

- 漸近不偏性: $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[T_n] = q(\theta)$.
- 漸近效率性: $\text{are}(T_{2n}, T_{1n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} [\text{Var}[T_{1n}] / \text{Var}[T_{2n}]] \leq 1$ for T_{1n}, T_{2n} two (asymptotic) unbiased estimators, 則 T_{1n} 具漸近有效。
- 漸近常態性: 給定一估計量, 其漸近變異數 $\text{Avar}[T_n] = \sigma_n^2(\theta)$ 與漸近期望值 $\text{Asy. } \mathbb{E}[T_n] = \mu_n(\theta)$, 則 $(T_n - \mu_n(\theta)) / \sigma_n(\theta) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1)$.
- 最佳漸近常態性: 若 $n\sigma_n^2(\theta) \rightarrow v^2(\theta)$ 且 $n^{1/2}(\mu_n(\theta) - q(\theta)) \rightarrow 0$, 其中 $v^2(\theta) > 0$ 為某一 θ 之函數, 則稱 T_n 具有最佳漸近常態性。即, 此時漸近變異數為 $v^2(\theta)/n$ 。

Example

- $X_1, \dots, X_n \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, (μ, σ^2) 未知。 Let $q(\sigma^2) := \sigma^2$, consider two estimators of $q(\sigma^2)$,

$$T_1 = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 / n,$$

$$T_2 = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 / (n-1) = nT_1 / (n-1).$$

- $\mathbb{E}[T_1] = (n-1)\sigma^2/n \neq \sigma^2$ (biased for σ^2), $\text{Var}[T_1] = 2(n-1)\sigma^4/n^2$. Also,

$$R(\theta, T_1) = \text{Var}[T_1] + \text{Bias}^2(\theta, T_1) = \frac{2(n-1)\sigma^4}{n^2} + \frac{\sigma^4}{n^2} = \frac{(2n-1)\sigma^4}{n^2}.$$

- $\mathbb{E}[T_2] = \sigma^2$ (unbiased for σ^2), $\text{Var}[T_2] = 2\sigma^4/(n-1) > \text{Var}[T_1]$. So,

$$R(\theta, T_2) = 2\sigma^4/(n-1) > R(\theta, T_1).$$

(T_1 的 MSE 比較小, 可是它是偏的。)

- (若不考慮不偏性)

$$\text{Var}[T_1] < \text{CRLB}(\sigma^2) = 2\sigma^4/n < \text{Var}[T_2].$$

- 換言之, 即使 T_2 可知是 UMVUE, 但卻達不到 CRLB. (效率不可達)。
- 若不追求不偏性, 則永遠可找到一個更有效率的估計量 (如: T_1)。

• Theorem (Efficiency Attainment)

假設 $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ 有一 joint pdf $f(\mathbf{x}|\theta)$, 與其對應之 likelihood function $L(\theta|\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^n f(x_i|\theta)$, 則對 $q(\theta)$ 的任一不偏估計量 $U(\mathbf{X})$ 滿足 $\text{Var}[U(\mathbf{X})] < \infty$ 且

$$\frac{d}{d\theta} \mathbb{E} U(\mathbf{X}) = \int \frac{\partial}{\partial \theta} U(\mathbf{X}) f(\mathbf{x}|\theta) d\theta,$$

其 $U(\mathbf{X})$ 之變異數可達到 CRLB, 若且唯若存在一個 θ 的函數 $a(\theta)$ 使得以下等式成立:

$$a(\theta) [U(\mathbf{X}) - q(\theta)] = \frac{\partial}{\partial \theta} \log L(\theta|\mathbf{x}).$$



$$\frac{\partial}{\partial \theta} \log L(\theta | \mathbf{x}) = \frac{n}{2\sigma^4} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 - \sigma^2 \right) =: a(\theta) [T_2 + (\bar{X}^2 - \mu^2) - \sigma^2]$$

無法寫成 T_2 的不偏函數, 且 μ 未知 (除非 $\mathbb{E}[\bar{X}^2] = \mu^2$)

大樣本之下呢? ($n \rightarrow \infty$)

- (小樣本) T_2 不偏, 但 MSE 卻較大 (因變異數大的幅度超過 T_1 偏誤的幅度), T_2 真的比較差嗎? 我們來看大樣本之下:
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[T_1] = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[T_2] = \sigma^2$ (T_1, T_2 都是漸近不偏),
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \text{Var}[T_1] = \lim_{n \rightarrow \infty} \text{Var}[T_2] = 0$ (均方差一致性);

$$\text{are}(T_2, T_1) = \lim_{n \rightarrow \infty} \text{Var}[T_1] / \text{Var}[T_2] = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2(n-1)\sigma^4/n^2}{2\sigma^4/(n-1)} = 1,$$

且 T_2 是 UMVUE, 故 T_2 具漸近有效性。

§7.3 #1

1. 設 X_1, \dots, X_n 為一組由 $Ber(\theta)$ 分佈所產生之隨機樣本, $0 \leq \theta \leq 1$ 。試分別求 $\theta, \theta^2, \theta(1 - \theta)$ 之 UMVUE。

求 UMVUE 三招:

- 「充份 + 不偏」: 定理 3.1: Rao-Blackwell Theorem (非唯一解)
- 「完備充份 + 不偏」: 定理 3.2: Lehmann-Scheffé Theorem (唯一解)
- 「不偏 + CRLB」: (i) “Efficiency Attainment” (最效率可達性); (ii) 定理 4.3: 滿足 CRLB 的不偏之一個參數 (one-dimensional) 指數族。

使用 R-B Thm. & L-S Thm 原則:

- 給定 $T(\mathbf{X})$ is a C.S.S.,
- 設法找一個 $h(T(\mathbf{X}))$ (完備充份統計量的函數) 為 $q(\theta)$ 之不偏估計量, 則利用條件期望值性質, 取條件不偏式

$$h(T(\mathbf{X})) = \mathbb{E}[h(T(\mathbf{X}))|T(\mathbf{X})]$$

為 $q(\theta)$ 之一 UMVUE。 (定理 3.2)

- 若 $h(T(\mathbf{X}))$ 不易找出, 則設法造出:
 - (1): 任找一個 $q(\theta)$ 之不偏估計量: $S(\mathbf{X})$ (不一定是 $T(\mathbf{X})$ 的函數, 若是 $T(\mathbf{X})$ 的函數, 則同上);
 - (2): 取條件不偏式, 造出:

$$\mathbb{E}[S(\mathbf{X})|T(\mathbf{X})],$$

此即 $q(\theta)$ 之一 UMVUE。 (定理 3.1)

定理 3.1.: 充份 + 不偏 \Rightarrow 有效

• Theorem

設 $T(\mathbf{X})$ 為 θ 之一充份統計量, 設 $S(\mathbf{X})$ 為 $q(\theta)$ 為任一不偏估計量, 且 $\mathbb{E}|S(\mathbf{X})| < \infty, \forall \theta \in \Omega$. 令

$$T^*(\mathbf{X}) := \mathbb{E}[S(\mathbf{X})|T(\mathbf{X})],$$

則 $\forall \theta \in \Omega$,

$$R(\theta, T^*) \leq R(\theta, S).$$

定理 3.2.: 完備充份 + 不偏 \Rightarrow 有效

• Theorem

設 $T(\mathbf{X})$ 為一完備充份統計量, 且 $S = S(\mathbf{X})$ 為 $q(\theta)$ 之一不偏估計量。則 $T^*(\mathbf{X}) = \mathbb{E}[S(\mathbf{X})|T(\mathbf{X})]$ 為 $q(\theta)$ 之一 UMVUE; 若 $\text{Var}[T^*] < \infty, \forall \theta \in \Omega$, 則 T^* 為 $q(\theta)$ 唯一之 UMVUE。

定理 4.3.

• Theorem

設 $T(\mathbf{X})$ 為 $q(\theta)$ 一不偏估計量, $\mathbb{E}[T(\mathbf{X})] = q(\theta)$ 。設一分佈族 $\{P_\theta; \theta \in \Omega\}$ 滿足正規條件, 且為一個參數之指數族, 有 pdf 如下式:

$$f(\mathbf{x}|\theta) = h(\mathbf{x}) \exp(w(\theta)T(\mathbf{x}))I_A(\mathbf{x}), \quad \theta \in \Omega,$$

其中 $w(\theta)$ 有一連續且不為零之導數, $\forall \theta \in \Omega$, 若且唯若 $\text{Var}[T(\mathbf{X})]$ 達到 CRLB, 且 $T(\mathbf{X})$ 為 $q(\theta)$ 之一 UMVUE。

- $T(\mathbf{X}) = \sum_{i=1}^n X_i$ is a C.S.S.
- Let $S(\mathbf{X}) = \bar{X}$, such that $\mathbb{E}[S(\mathbf{X})] = \theta$.
- Then, let

$$h_1(T(\mathbf{X})) = \mathbb{E}[S(\mathbf{X})|T(\mathbf{X})] = S(\mathbf{X}),$$

$\mathbb{E}[h_1(T(\mathbf{X}))] = \mathbb{E}[\bar{X}] = \theta$. 故, $S(\mathbf{X}) = \bar{X}$ 為 θ 之一不偏估計量, 且為 $T(\mathbf{X})$ 的函數。So,

$$h_1(T(\mathbf{X})) = \bar{X}$$

is an UMVUE of θ by R-B Thm & L-S Thm.

- Let $S(\mathbf{X}) = (n/(n-1))\bar{X}(1 - \bar{X})$, such that $\mathbb{E}[S(\mathbf{X})] = \theta(1 - \theta)$.
- Let $h_2(T(\mathbf{X})) = \mathbb{E}[S(\mathbf{X})|T(\mathbf{X})] = S(\mathbf{X})$,

$$\mathbb{E}[h_2(T(\mathbf{X}))] = \mathbb{E}[S(\mathbf{X})] = \mathbb{E}\left[\left(\frac{n}{n-1}\right)\bar{X}(1 - \bar{X})\right] = \theta(1 - \theta).$$

Since that $S(\mathbf{X})$ is unbiased for $\theta(1 - \theta)$ and is a function of $T(\mathbf{X})$. So,

$$h_2(T(\mathbf{X})) = (n/(n-1))\bar{X}(1 - \bar{X})$$

is an UMVUE of $\theta(1 - \theta)$ by R-B Thm & L-S Them.

- Let $S(\mathbf{X}) = T(\mathbf{X})(T(\mathbf{X}) - 1)/n(n - 1)$, such that $\mathbb{E}[S(\mathbf{X})] = \theta^2$.
- Let $h_3(T(\mathbf{X})) = \mathbb{E}[S(\mathbf{X})|T(\mathbf{X})] = S(\mathbf{X})$, such that $\mathbb{E}[h_3(\mathbf{X})] = \mathbb{E}[S(\mathbf{X})]$.
- Since $\mathbb{E}[T^2(\mathbf{X})] - \mathbb{E}[T(\mathbf{X})] = \text{Var}[T(\mathbf{X})] + \mathbb{E}[T(\mathbf{X})]^2 - \mathbb{E}[T(\mathbf{X})] = n\theta(1 - \theta) + n^2\theta^2 - n\theta = n(n - 1)\theta^2$, then

$$\mathbb{E}[h_3(T(\mathbf{X}))] = \mathbb{E}[S(\mathbf{X})] = \mathbb{E}\left[\frac{T(\mathbf{X})(T(\mathbf{X}) - 1)}{n(n - 1)}\right] = \theta^2.$$

So,

$$h_3(T(\mathbf{X})) = \sum_{i=1}^n X_i (\sum_{i=1}^n X_i - 1) / n(n - 1)$$

is an UMVUE of θ^2 by R-B Thm & L-S Thm.