



# บทที่ 4: ปริมาณสารสัมพันธ์

## Ch04: Stoichiometry

**Department of Chemistry,  
School of Science, KMITL**

# ปริมาณสารสัมพันธ์


มวลโมเลกุล (m.w.), Molar mass, มวลสูตร  
(Covalent) (Ionic)

[C=12, H=1, O=16, N=14]

$$H_2O = 2(H) + 1(O) = 2(1) + 1(16) = 18 \text{ g/mol}$$

$$H_2VO_4 = 2(H) + 1(V) + 4(O) = 2(1) + 32 + 4(16) = 98 \text{ g/mol}$$

$$Na_2VO_4 \cdot 2H_2O = 2(Na) + 1(V) + 4(O) + 2(H_2O) \\ = 2(23) + 32 + 4(16) + 2(18) = 178 \text{ g/mol}$$



สาร 1 mol มีอนุภาค =  $6.02 \times 10^{23}$  อนุภาค  
ธาตุ  $\Leftarrow$  atom  
สป.  $\Leftarrow$  โมเลกุล  
cvl  
Ionic  $\Leftarrow$  ไอออน

$H_2O$  1 mol มีมวล 18 g  
 $CH_3COOH$  1 mol มีมวล 60 g

↓

② น้ำหนัก  
ผล

$$M = 2(C) + 4(H) + 2(O) \\ = 2(12) + 4(1) + 2(16) \\ = 60 \text{ g/mol}$$

สาร 1 โมล

③ ปริมาตร  
[g/mol]  $\Rightarrow$  mTP

OC = 273 K

$SO_2$  (g)  
 $O_2$  (g)  
 $NH_3$  (g)

$$O_2(g) \text{ 1 mol มีปริมาตร } = 22.4 \text{ dm}^3 \\ 22,400 \text{ cm}^3$$



- ปริมาณสารสัมพันธ์ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์เชิงปริมาณระหว่างสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ในปฏิกิริยาเคมี ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการคำนวณและทำนายผลของปฏิกิริยาเคมี
- บทนี้จะอธิบายหลักการและวิธีการคำนวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมีต่าง ๆ
- การเข้าใจหลักการปริมาณสารสัมพันธ์จะช่วยให้ นักศึกษาสามารถคำนวณปริมาณสารที่เกิดขึ้นในปฏิกิริยา ปริมาณสารที่ใช้ไป และปริมาณสารที่เหลือได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังเป็นความรู้พื้นฐานสำหรับ การศึกษาเคมีในระดับที่สูงขึ้น และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

**Department of Chemistry, School of Science, KMITL**



## สารประกอบเคมี (Chemical Compounds)

โมเลกุลของสารประกอบจะมีธาตุอย่างน้อย 2 ชนิดในโมเลกุลโดยจะมีสูตรเคมีแบบย่อเป็นตัวย่อ โดยใช้สัญลักษณ์ธาตุในการแสดงชนิดของธาตุและมีตัวเลขห้อยเพื่อระบุจำนวนของอะตอมของธาตุนั้นในโมเลกุล หากเป็นเลข 1 จะไม่ใส่ตัวเลข 1 ระบุไว้



## สูตรอย่างง่าย (Empirical Formula)

สูตรอย่างง่ายคือสูตรที่แสดงอัตราส่วนลงตัวย่อที่สุทธระหว่างชนิดของธาตุในโมเลกุล ทั้งนี้ตัวเลขต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น

## สูตรโมเลกุล (Molecular Formula)

สูตรโมเลกุลจะต้องแสดงจำนวนทั้งหมดของแต่ละธาตุในโมเลกุล ตัวอย่างเช่น  $P_2O_5$  ทั้งนี้ข้อสังเกตจะได้ว่า

สูตรโมเลกุล = (สูตรอย่างง่าย)<sub>n</sub> โดย n = 1, 2, 3,... ตัวอย่างเช่น







# มวลอะตอมและมวลโมเลกุล

## มวลอะตอม (Atomic Mass)

มวลอะตอม คือมวลเฉลี่ยของอะตอมของธาตุนั้น ๆ โดยพิจารณาจากไอโซโทปที่มีอยู่ตามธรรมชาติ มีหน่วยเป็น u (unified atomic mass unit) หรือ amu (atomic mass unit) โดย  $1 \text{ u} = 1.66054 \times 10^{-24} \text{ g}$

## มวลโมเลกุล (Molecular Mass)

มวลโมเลกุลคือผลรวมของมวลอะตอมของธาตุทั้งหมดที่เป็นองค์ประกอบในโมเลกุลนั้น คำนวณได้จากการนำมวลอะตอมของแต่ละธาตุคูณด้วยจำนวนอะตอมของธาตุนั้นในโมเลกุล แล้วนำมารวมกัน ตัวอย่างเช่น

$$\begin{aligned} \text{H}_2\text{O} \text{ มีมวลโมเลกุลเป็น} &= 2(\text{มวลอะตอมของ H}) + 1(\text{มวลอะตอมของ O}) \\ &= 2(1) + 1(16) = 18 \text{ amu} \text{ (น้ำหนักของ 1 โมเลกุล)} \end{aligned}$$



# มวลสูตร

## มวลสูตร (Formula Mass)

มวลสูตรใช้สำหรับสารประกอบไอออนิก คำนวณเช่นเดียวกับมวลโมเลกุล คือผลรวมของมวลอะตอมของธาตุทุกตัวในสูตรเคมี มีหน่วยเป็น u เช่นกัน



มวลโมเลกุลของแบเรียมไนเตรต  $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$  มีค่าเท่าใด

One mole of barium nitrate contains exactly one mole of  $\text{Ba}^{2+}$  ions and two moles of  $\text{NO}_3^-$  ions. The two moles of  $\text{NO}_3^-$  ions contain two moles of N atoms and six moles of O atoms. Therefore, the molar mass of  $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$  is calculated as follows.

$$1 \text{ mol Ba} \times \frac{137.33 \text{ g Ba}}{\text{mol Ba}} = 137.33 \text{ g Ba}$$

$$2 \text{ mol N} \times \frac{14.01 \text{ g N}}{\text{mol N}} = 28.02 \text{ g N}$$

$$6 \text{ mol O} \times \frac{16.00 \text{ g O}}{\text{mol O}} = 96.00 \text{ g O}$$

$$\text{molar mass of } \text{Ba}(\text{NO}_3)_2 = 261.35 \text{ g/mol}$$



# โมลและจำนวนอนุภาค

## โมลของสารประกอบ (Mole of a Compound; mol)

โมลเป็นหน่วยที่ใช้ในการเปรียบเทียบปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมี ทำให้สามารถคำนวณปริมาณสารที่เข้าทำปฏิกิริยาและผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง โดยอาศัยอัตราส่วนจำนวนโมลจากสมการเคมีที่สมดุล

เนื่องจากอะตอมมีมวลที่น้อยมากซึ่งหน่วยจะเป็น amu ไม่สามารถชั่งได้ ดังนั้นเพื่อความสะดวกจึงใช้หน่วยเป็นกรัม โดย 1 โมล มีจำนวน  $6.02 \times 10^{23}$  เสมอ แล้วเปลี่ยนหน่วยน้ำหนักจาก amu เป็นกรัม ตัวอย่างเช่น

$\text{MgCl}_2$  1 โมเลกุล จะมีน้ำหนัก

$$\text{Mg} + 2\text{Cl} = 24 + 2(35.5) = 95 \text{ amu}$$

ดังนั้น

$\text{MgCl}_2$  1 โมล จะมีน้ำหนัก

95 กรัม (น้ำหนักของ  $6.02 \times 10^{23}$  โมเลกุล)



# ความสัมพันธ์ระหว่างโมลและจำนวนอนุภาค

## Mole of a Compound



Avogadro's Constant

$$N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

Specifically, *a mole of compound* is an amount of compound containing **Avogadro's number** ( $6.02214 \times 10^{23}$ ) of formula units or molecules. **The molar mass is the mass of one mole of compound.**

$$1 \text{ mol H}_2\text{O} = 18.0153 \text{ g H}_2\text{O} = 6.02214 \times 10^{23} \text{ H}_2\text{O molecules}$$

$$1 \text{ mol MgCl}_2 = 95.211 \text{ g MgCl}_2 = 6.02214 \times 10^{23} \text{ MgCl}_2 \text{ formula units}$$

$$\begin{aligned} 1 \text{ mol Mg(NO}_3)_2 &= 148.3148 \text{ g Mg(NO}_3)_2 \\ &= 6.02214 \times 10^{23} \text{ Mg(NO}_3)_2 \text{ formula units} \end{aligned}$$

Density,  $d$

converts from volume to mass

Molar mass,  $M$

converts from mass to amount (mol)

Avogadro constant,  $N_A$

converts from amount (mol) to elementary entities



## Conversion Factor

Neon 1 mol =  $6.02 \times 10^{23}$  atoms = 20.18 g

$$\frac{1 \text{ mol Ne}}{6.02 \times 10^{23} \text{ atoms}} = \frac{6.02 \times 10^{23} \text{ atoms}}{1 \text{ mol Ne}} = \frac{1 \text{ mol Ne}}{20.18 \text{ g Ne}} = \frac{20.18 \text{ g Ne}}{6.02 \times 10^{23} \text{ atoms}} = 1$$

เนื่องจากมีค่าเท่ากันในหน่วยที่ต่างกัน จึงนำไปใช้ในการเปลี่ยนหน่วยได้

$$\text{mol Ne} = \frac{1 \text{ mol Ne}}{20.18 \text{ g Ne}} \times 0.00426 \text{ g Ne} = 2.11 \times 10^{-4} \text{ mol Ne}$$



ตัวอย่าง

จงหาปริมาณและจำนวนโมลของนีออนปริมาณ 0.00426 กรัม

$$\text{Ne} = 20.18 \text{ g/mol}$$

$$\text{Atoms Ne} = \frac{6.02 \times 10^{23} \text{ Atoms Ne}}{1 \text{ mol Ne}} \times 2.11 \times 10^{-4} \text{ mol Ne} = 1.27 \times 10^{20} \text{ atoms}$$

$$0.00426 \text{ g Ne} \times \frac{1 \text{ mol Ne}}{20.18 \text{ g Ne}} = 2.11 \times 10^{-4} \text{ mol Ne}$$

$$0.00426 \text{ g Ne} \times \frac{1 \text{ mol Ne}}{20.18 \text{ g Ne}} \times \frac{6.02 \times 10^{23} \text{ atoms}}{1 \text{ mol Ne}} = 1.27 \times 10^{20} \text{ atoms Ne}$$



ก๊าซโบรมีนปริมาณ 3.2 โมล มีมวลเป็นกี่กรัม

$\text{Br}_2$

$$\text{Br}_2 = 2(80) = 160 \text{ g/mol}$$

$$(\text{Br}_2): 2 \times 79.904 \text{ g/mol} = 159.808 \text{ g/mol}$$

$$\text{Mass} = 3.20 \text{ mol} \times 159.808 \text{ g/mol} = 511.3856 \text{ g}$$

$$\text{gBr}_2 = \frac{160 \text{ gBr}_2}{1 \text{ mol Br}_2} \times 3.2 \text{ mol Br}_2 = 512 \text{ g}$$

$$\begin{aligned} \text{Atom Br} &= \frac{6.02 \times 10^{23} \text{ Atom Br}}{1 \text{ mol Br}} \times \frac{2 \text{ mol Br}}{1 \text{ mol Br}_2} \times 3.2 \text{ mol Br}_2 \\ &= 3.85 \times 10^{24} \text{ Atom Br} \end{aligned}$$



ไอบูโพรเฟน (Ibuprofen,  $C_{13}H_{18}O_2$ ) เป็นสารออกฤทธิ์ที่พบในยาแก้ปวด มีมวลโมเลกุล 206.28 กรัมต่อโมล

ต่อโมล  $\text{mol } C_{13}H_{18}O_2 = \frac{1 \text{ mol } C_{13}}{206.28 \text{ g } C_{13}} \times 33 \text{ g } C_{13} = \frac{33}{206.28} = 0.16 \text{ mol } C_{13}H_{18}O_2$

a) หากเม็ดยาในขวดมีไอบูโพรเฟนรวมเท่ากับ 33 กรัม ขวดนั้นจะมีไอบูโพรเฟนกี่โมล?

b) ในขวดข้างต้นมีจำนวนโมเลกุลของไอบูโพรเฟนกี่โมเลกุล?

c) มวลรวมของอะตอมคาร์บอนในไอบูโพรเฟน 33 กรัม มีค่าเป็นกี่กรัม?

$$gC = \frac{12gC}{1 \text{ mol } C} \times \frac{13 \text{ mol } C}{1 \text{ mol } C_{13}H_{18}O_2} \times 0.16 \text{ mol } C_{13}H_{18}O_2$$
  

$$= 12 \times 13 \times 0.16$$
  

$$= 24.96 \text{ g } C$$

a.  $33 \text{ g } C_{13}H_{18}O_2 \times \frac{1 \text{ mol } C_{13}H_{18}O_2}{206.31 \text{ g } C_{13}H_{18}O_2} = 0.16 \text{ mol } C_{13}H_{18}O_2$

b.  $0.16 \text{ mol } C_{13}H_{18}O_2 \times \frac{6.022 \times 10^{23} \text{ molecules}}{\text{mol}} = 9.6 \times 10^{22} \text{ molecules } C_{13}H_{18}O_2$

c.  $0.16 \text{ mol } C_{13}H_{18}O_2 \times \frac{13 \text{ mol } C}{\text{mol } C_{13}H_{18}O_2} \times \frac{12.01 \text{ g } C}{\text{mol } C} = 25 \text{ g } C$

The bottle contains 0.16 mol of ibuprofen, which is  $9.6 \times 10^{22}$  molecules of ibuprofen.

The sample of ibuprofen contains 25 g of carbon.



## ร้อยละประกอบของธาตุในโมเลกุล (Elemental Composition in the Substance)

$$\% \text{ธาตุ} = \frac{\text{น้ำหนักของธาตุนั้น}}{\text{มวลโมเลกุลของสาร}} \times 100 = \frac{(\text{จำนวนอะตอม})(\text{น้ำหนักของอะตอม})}{\text{มวลโมเลกุลของสาร}} \times 100$$

**ตัวอย่าง** สารประกอบโครเมียมชนิดหนึ่งประกอบด้วย Cr: 26.52%, S: 24.52%, O: 48.95% มีมวลโมเลกุล 392 g/mol จงหาสูตรโมเลกุลของสารประกอบโครเมียมนี้

$$\text{Cr: S: O} = \frac{26.52}{52} : \frac{24.52}{32} : \frac{48.95}{16} = \frac{0.51}{0.51} : \frac{0.766}{0.51} : \frac{3.05}{0.51} = 1 : 1.5 : 6 = 2 : 3 : 12 \Rightarrow \text{Cr}_2\text{S}_3\text{O}_{12}$$

$\begin{matrix} \text{Cr} & : & \text{S} & : & \text{O} \\ 26.52 & : & 24.52 & : & 48.95 \\ 52 & : & 32 & : & 16 \end{matrix}$

ดังนั้นสูตรอย่างง่ายเป็น  $\text{Cr}_2\text{S}_3\text{O}_{12}$

$$\text{สูตรโมเลกุล} = (\text{สูตรอย่างง่าย})_n = (2(52) + 3(32) + 12(16))n = (392)n$$

ดังนั้น  $n = 1$

สูตรโมเลกุลจึงเป็น  $\text{Cr}_2\text{S}_3\text{O}_{12}$

$$(\text{Cr}_2\text{S}_3\text{O}_{12})_n = 392$$

$$(392)_n = 392$$

$$n = 1$$





เกลือบางชนิดสามารถตกผลึกจากสารละลายที่มีน้ำอยู่ด้วย ทำให้เกลือเหล่านี้สามารถกักเก็บโมเลกุลของน้ำไว้ภายในโครงสร้างผลึกของตนเองได้ โซเดียมคาร์บอเนตสามารถเกิดเป็นสารไฮเดรต ซึ่งมีน้ำจำนวน 10 โมเลกุลต่อหนึ่งหน่วยสูตรของโซเดียมคาร์บอเนต จึงคำนวณหาค่าร้อยละโดยมวลของน้ำในสารประกอบโซเดียมคาร์บอเนตเดคาไฮเดรต (sodium carbonate decahydrate,  $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ ) ซึ่งมีมวลโมเลกุลเท่ากับ 286.19 กรัมต่อโมล

$$MW = 286.19 \text{ g/mol}$$

$$\begin{aligned} \% \text{H}_2\text{O} &= \frac{n(\text{H}_2\text{O})}{M(\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O})} \times 100 \\ &= \frac{10(18)}{286.19} \times 100 \\ &= 62.97\% \end{aligned}$$

One mole of  $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$  contains 10 mol  $\text{H}_2\text{O}$ . As noted earlier, the molar mass of  $\text{H}_2\text{O}$  is 18.02 g/mol. The mass of 10 mol  $\text{H}_2\text{O}$  is calculated as follows.

$$10 \text{ mol } \text{H}_2\text{O} \times \frac{18.02 \text{ g } \text{H}_2\text{O}}{\text{mol } \text{H}_2\text{O}} = 180.2 \text{ g } \text{H}_2\text{O}$$

$$\text{mass of } \text{H}_2\text{O} \text{ per mole of } \text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O} = 180.2 \text{ g}$$

The molar mass of  $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$  is 286.19 g/mol, so we know that 1 mol of the hydrate has a mass of 286.19 g. The mass percentage of 10 mol  $\text{H}_2\text{O}$  in 1 mol  $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$  can now be calculated.

$$\begin{aligned} \text{mass percentage of } \text{H}_2\text{O} \text{ in } \text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O} &= \frac{180.2 \text{ g } \text{H}_2\text{O}}{286.19 \text{ g } \text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}} \times 100 \\ &= 62.97\% \text{ H}_2\text{O} \end{aligned}$$

$$\% \text{Na} = \frac{2(23)}{286.19} \times 100$$



## การหาสูตรอย่างง่ายและสูตรโมเลกุล

### สูตรอย่างง่าย (Empirical Formula)

แสดงอัตราส่วนอย่างต่ำของจำนวนอะตอมของธาตุต่าง ๆ ในสารประกอบ เช่น  $\text{CH}_2\text{O}$  เป็นสูตรอย่างง่ายของ กลูโคส  $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$

- คำนวณมวลของธาตุแต่ละชนิดจากร้อยละโดยมวล
- หาจำนวนโมลของธาตุแต่ละชนิด
- หาอัตราส่วนโมลอย่างต่ำ

### • สูตรโมเลกุล (Molecular Formula)

แสดงจำนวนอะตอมที่แท้จริงของธาตุต่าง ๆ ในโมเลกุล เช่น  $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$  เป็นโมเลกุลของกลูโคส

- ต้องทราบสูตรเอมพิริคัลก่อน
- ต้องทราบมวลโมเลกุลของสารประกอบ
- คำนวณจากสูตร: สูตรโมเลกุล = (สูตรเอมพิริคัล) $n$
- โดย  $n = \text{มวลโมเลกุล} / \text{มวลสูตรเอมพิริคัล}$



การวิเคราะห์เชิงปริมาณพบว่าสารประกอบชนิดหนึ่งประกอบด้วย ไฮโดรเจน 2.016%, กำมะถัน 32.60%, และออกซิเจน 65.30% จงหาสูตรอย่างง่าย (empirical formula) ของสารประกอบนี้

Mass composition (mass of each element in 100.0 g sample):

2.016 g H, 32.60 g S, and 65.30 g O

Composition in moles:  $2.016 \text{ g H} \times \frac{1 \text{ mol H}}{1.007 \text{ g H}} = 2.001 \text{ mol H}$

$$32.60 \text{ g S} \times \frac{1 \text{ mol S}}{32.06 \text{ g S}} = 1.016 \text{ mol S}$$

$$65.30 \text{ g O} \times \frac{1 \text{ mol O}}{16.00 \text{ g O}} = 4.081 \text{ mol O}$$

Least whole-number mole ratio of atoms:

The compound contains atoms in the ratio 2.001 mol H : 1.016 mol S : 4.081 mol O. To find the least whole-number mole ratio, divide each value by the least number in the ratio.

$$\frac{2.001 \text{ mol H}}{1.016} : \frac{1.016 \text{ mol S}}{1.016} : \frac{4.081 \text{ mol O}}{1.016} = 1.969 \text{ mol H} : 1 \text{ mol S} : 4.019 \text{ mol O}$$

Rounding each number in the ratio to the nearest whole number yields a mole ratio of 2 mol H : 1 mol S : 4 mol O. The empirical formula of the compound is





สารประกอบชนิดหนึ่งประกอบด้วยธาตุไนโตรเจน (N) จำนวน 1.52 กรัมและออกซิเจน (O) จำนวน 3.47 กรัม โดยมวลโมลาร์ของสารประกอบนี้อยู่ในช่วงระหว่าง 90 ถึง 95 กรัม จงหาสูตรโมเลกุล (molecular formula) และมวลโมลาร์ที่แน่นอนของสารประกอบดังกล่าว

**Solution** We are given grams of N and O. Use molar mass as a conversion factor to convert grams to moles of each element. Let  $n$  represent the number of moles of each element. We write

$$n_{\text{N}} = 1.52 \text{ g N} \times \frac{1 \text{ mol N}}{14.01 \text{ g N}} = 0.108 \text{ mol N}$$

$$n_{\text{O}} = 3.47 \text{ g O} \times \frac{1 \text{ mol O}}{16.00 \text{ g O}} = 0.217 \text{ mol O}$$

Thus, we arrive at the formula  $\text{N}_{0.108}\text{O}_{0.217}$ , which gives the identity and the ratios of atoms present. However, chemical formulas are written with whole numbers. Try to convert to whole numbers by dividing the subscripts by the smaller subscript (0.108). After rounding off, we obtain  $\text{NO}_2$  as the empirical formula.

The molecular formula might be the same as the empirical formula or some integral multiple of it (for example, two, three, four, or more times the empirical formula). Comparing the ratio of the molar mass to the molar mass of the empirical formula will show the integral relationship between the empirical and molecular formulas. The molar mass of the empirical formula  $\text{NO}_2$  is

$$\text{empirical molar mass} = 14.01 \text{ g} + 2(16.00 \text{ g}) = 46.01 \text{ g}$$

Next, we determine the ratio between the molar mass and the empirical molar mass

$$\frac{\text{molar mass}}{\text{empirical molar mass}} = \frac{90 \text{ g}}{46.01 \text{ g}} \approx 2$$

The molar mass is twice the empirical molar mass. This means that there are two  $\text{NO}_2$  units in each molecule of the compound, and the molecular formula is  $(\text{NO}_2)_2$  or  $\text{N}_2\text{O}_4$ .

The actual molar mass of the compound is two times the empirical molar mass, that is,  $2(46.01 \text{ g})$  or  $92.02 \text{ g}$ , which is between  $90 \text{ g}$  and  $95 \text{ g}$ .

# สมการเคมีและการดุลสมการ

## เขียนสมการเคมี

เขียนสูตรเคมีของสารตั้งต้นทางซ้ายและผลิตภัณฑ์ทางขวา โดยใช้ลูกศรแสดงทิศทางของปฏิกิริยา

## ตรวจสอบสมดุล


นับจำนวนอะตอมของแต่ละธาตุทางซ้ายและขวาลูกศร ต้องเท่ากันเสมอตามกฎการอนุรักษ์มวล

## ปรับสัมประสิทธิ์

ใส่ตัวเลขหน้าสูตรเคมีเพื่อให้จำนวนอะตอมทั้งสองข้าง เท่ากัน เริ่มจากโมเลกุลที่ซับซ้อนก่อน

## ตรวจสอบซ้ำ

นับจำนวนอะตอมทั้งหมดอีกครั้งเพื่อยืนยันว่าสมการ สมดุล



| วิธี/ขั้นตอนการคิด            | $\text{C}_5\text{H}_{12} + \text{O}_2 \Rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$    |        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ดุลโลหะ                       | ไม่มีโลหะ                                                                              |        |
| ดุลโลหะ(ยกเว้น H และ O)       | $\text{C}_5\text{H}_{12} + \text{O}_2 \Rightarrow 5\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$   |        |
| ดุล H และ O                   | $\text{C}_5\text{H}_{12} + \text{O}_2 \Rightarrow 5\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$  |        |
|                               | $\text{C}_5\text{H}_{12} + 8\text{O}_2 \Rightarrow 5\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$ |        |
| ตรวจสอบจำนวนของธาตุในสมการ    | C = 5                                                                                  | C = 5  |
|                               | H = 12                                                                                 | H = 12 |
|                               | O = 16                                                                                 | O = 16 |
| พิจารณาจำนวนอะตอมทางซ้ายไปขวา | $\text{C}_5\text{H}_{12} + 8\text{O}_2 \Rightarrow 5\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$ |        |



จงเขียนสมการเคมี (formula equation) สำหรับปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นเมื่อ โซเดียมออกไซด์ (ของแข็ง) ถูกเติมลงในน้ำที่อุณหภูมิห้อง และเกิดเป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์ (ละลายในน้ำ) ให้ระบุสถานะของสาร (เช่นของแข็ง ของเหลว ก๊าซ หรือสารละลาย) ในสมการสูตรด้วย จากนั้นปรับสมการสูตรให้เป็นสมการเคมีที่ดุล

The word equation must show the reactants, sodium oxide and water, to the left of the arrow. The product, sodium hydroxide, must appear to the right of the arrow.



The word equation is converted to a formula equation by replacing the name of each compound with the appropriate chemical formula. To do this requires knowing that sodium forms a 1+ ion, that oxygen has a 2- charge, and that a hydroxide ion has a charge of 1-.



Adding symbols for the physical states of the reactants and products and the coefficient 2 in front of NaOH produces a balanced chemical equation.











# ประเภทของปฏิกิริยาเคมี

ปฏิกิริยาการสังเคราะห์ (synthesis reaction) หรือ  
ปฏิกิริยาการรวมตัว (composition reaction or  
combination reaction)

สารตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปจะรวมกันเพื่อเกิดสารประกอบ  
ใหม่ ปฏิกิริยาประเภทนี้สามารถเขียนในรูปสมการทั่วไป  
ดังนี้  $A + X \longrightarrow AX$

A และ X อาจเป็นธาตุหรือสารประกอบ ส่วน AX คือ  
สารประกอบที่ได้



## Evidence for a Chemical Reaction

- Some Clues That a Chemical Reaction Has Occurred.
  - The color changes
  - A solid forms
  - Bubbles form
  - Heat and/or a flame is produced, or heat is absorbed.



**a**  
When colorless hydrochloric acid is added to a red solution of cobalt(II) nitrate, the solution turns blue, a sign that a chemical reaction has taken place.



**b**  
A solid forms when a solution of sodium dichromate is added to a solution of lead nitrate.



**c**  
Bubbles of hydrogen gas form when calcium metal reacts with water.



**d**  
Methane gas reacts with oxygen to produce a flame in a Bunsen burner.





## ประเภทของปฏิกิริยาเคมี

### ปฏิกิริยาการสลายตัว (decomposition reaction)

สารประกอบเพียงชนิดเดียวจะเกิดปฏิกิริยาและแยกตัวออกเป็นสารตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป




AX คือสารประกอบส่วน A และ X อาจเป็นธาตุหรือสารประกอบก็ได้ โดยทั่วไปปฏิกิริยาการสลายตัวจะเกิดขึ้นเมื่อมีการให้พลังงาน เช่น พลังงานไฟฟ้าหรือความร้อน



### ปฏิกิริยาการเผาไหม้ (combustion reaction)

สารจะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนและปลดปล่อยพลังงานจำนวนมากในรูปของแสงและความร้อน การเผาไหม้ของก๊าซธรรมชาติ ก๊าซโพรเพน น้ำมันเบนซินและไม้ ล้วนเป็นตัวอย่างของปฏิกิริยาการเผาไหม้

ปฏิกิริยาการเผาไหม้ของโพรเพน ( $\text{C}_3\text{H}_8$ ) ส่งผลให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และไอน้ำ









## ประเภทของปฏิกิริยาเคมี

### ปฏิกิริยาแทนที่ (displacement or replacement reaction)

a) ปฏิกิริยาแทนที่เดี่ยว (single-displacement reaction)






b) ปฏิกิริยาแทนที่คู่ (double-displacement reaction)





จัดประเภทของปฏิกิริยาแต่ละข้อต่อไปนี้ว่าเป็น ปฏิกิริยาการรวมตัว ปฏิกิริยาการสลายตัว ปฏิกิริยาแทนที่เดี่ยว ปฏิกิริยาแทนที่คู่ หรือปฏิกิริยาการเผาไหม้



**a** ปฏิกิริยาการรวมตัว (Combination/Synthesis)

**b** ปฏิกิริยาแทนที่เดี่ยว (Single-displacement)


**c** ปฏิกิริยาการสลายตัว (Decomposition)

**d** ปฏิกิริยาการเผาไหม้ (Combustion)



ข้อมูลเชิงปริมาณจากสมการเคมีที่ดุล

Chemical  
equation:



Molecular  
interpretation:

2 molecules  $\text{H}_2$



1 molecule  $\text{O}_2$



2 molecules  $\text{H}_2\text{O}$




Mole-level  
interpretation:

2 mol  $\text{H}_2$



4.0 g  $\text{H}_2$

1 mol  $\text{O}_2$



32.0 g  $\text{O}_2$

2 mol  $\text{H}_2\text{O}$



36.0 g  $\text{H}_2\text{O}$

Convert to grams (using molar masses)


Notice the conservation of mass  
(4.0 g + 32.0 g = 36.0 g)



## ปริมาณสารสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี


การคำนวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมีเป็นการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ตามอัตราส่วนโมลในสมการที่ดุลแล้ว โดยสามารถคำนวณหาปริมาณสารตั้งต้นที่ต้องใช้ หรือปริมาณผลิตภัณฑ์ที่จะได้จากปฏิกิริยา ซึ่งมีความสำคัญในการทำการทดลองและกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม

ในการคำนวณปริมาณสารตั้งต้นที่ต้องใช้หรือสารผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในปฏิกิริยา โดยอาจจะเริ่มจากจำนวนกรัม หรือโมลของสารตั้งต้นหรือผลิตภัณฑ์ โดยจะใช้เลขสัมประสิทธิ์จากสมการที่ดุลมาสัมพันธ์กัน ดังแผนภาพ






ในยานอวกาศ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่นักบินอวกาศหายใจออกมา สามารถกำจัดได้ด้วยการทำปฏิกิริยากับ ลิเทียมไฮดรอกไซด์ ดังสมการ



อยากรทราบว่าต้องใช้ลิเทียมไฮดรอกไซด์กี่โมลในการทำปฏิกิริยากับคาร์บอนไดออกไซด์ 20 โมล ซึ่งเป็นปริมาณเฉลี่ยที่มนุษย์หายใจออกต่อวัน

Given:




$$20 \text{ mol CO}_2 \times \frac{2 \text{ mol LiOH}}{1 \text{ mol CO}_2} = 40 \text{ mol LiOH}$$



ในกระบวนการสังเคราะห์แสง (photosynthesis) พืชใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เพื่อสร้างกลูโคส ( $C_6H_{12}O_6$ ) และออกซิเจน จากปฏิกิริยาระหว่างคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ **อยากทราบว่าจะได้กลูโคสกี่กรัม หากมีน้ำ 3.00 โมล** ทำปฏิกิริยากับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์


Given:



Find:

$$g_{C_6H_{12}O_6} = \frac{180 g_{C_6H_{12}O_6}}{1 mol_{C_6H_{12}O_6}} \times \frac{1 mol_{C_6H_{12}O_6}}{6 mol_{H_2O}} \times 3 mol_{H_2O} = \frac{180 \times 3}{82} = 90.1 g_{C_6H_{12}O_6}$$

You must start with a balanced equation.



Given the amount in mol of  $H_2O$ , you need to get the mass of  $C_6H_{12}O_6$  in grams. Two conversion factors are needed—the mole ratio of  $C_6H_{12}O_6$  to  $H_2O$  and the molar mass of  $C_6H_{12}O_6$ .

$$mol\ H_2O \times \frac{mol\ C_6H_{12}O_6}{mol\ H_2O} \times \frac{g\ C_6H_{12}O_6}{mol\ C_6H_{12}O_6} = g\ C_6H_{12}O_6$$


Use the periodic table to compute the molar mass of  $C_6H_{12}O_6$ .

$$C_6H_{12}O_6 = 180.18\ g/mol$$

$$3.00\ mol\ H_2O \times \frac{1\ mol\ C_6H_{12}O_6}{6\ mol\ H_2O} \times \frac{180.18\ g\ C_6H_{12}O_6}{1\ mol\ C_6H_{12}O_6} = 90.1\ g\ C_6H_{12}O_6$$



ขั้นตอนแรกในกระบวนการผลิตกรดไนตริกในอุตสาหกรรม คือการออกซิเดชันของแอมโมเนียโดยมีตัวเร่ง




ทำปฏิกิริยาโดยใช้แอมโมเนีย 824 กรัม และมีออกซิเจนมากเกินไป


(a) จะได้แก๊ส NO กี่โมล

(b) จะได้  $\text{H}_2\text{O}$  กี่โมล

Given:



First, write the balanced chemical equation.



Two conversion factors are needed to solve part (a)—the molar mass factor for  $\text{NH}_3$  and the mole ratio of NO to  $\text{NH}_3$ . Part (b) starts with the same conversion factor as part (a), but then the mole ratio of  $\text{H}_2\text{O}$  to  $\text{NH}_3$  is used to convert to the amount in moles of  $\text{H}_2\text{O}$ . The first conversion factor in each part is the molar mass factor of  $\text{NH}_3$ .

$$\text{a. } \text{g NH}_3 \times \frac{1 \text{ mol NH}_3}{17 \text{ g NH}_3} \times \frac{4 \text{ mol NO}}{4 \text{ mol NH}_3} = \text{mol NO}$$

$$\text{b. } \text{g NH}_3 \times \frac{1 \text{ mol NH}_3}{17 \text{ g NH}_3} \times \frac{6 \text{ mol H}_2\text{O}}{4 \text{ mol NH}_3} = \text{mol H}_2\text{O}$$

Use the periodic table to compute the molar mass of  $\text{NH}_3$ .

$$1 \text{ mol NH}_3 = 17.04 \text{ g/mol}$$

$$\text{a. } 824 \text{ g NH}_3 \times \frac{1 \text{ mol NH}_3}{17.04 \text{ g NH}_3} \times \frac{4 \text{ mol NO}}{4 \text{ mol NH}_3} = 48.4 \text{ mol NO}$$

$$\text{b. } 824 \text{ g NH}_3 \times \frac{1 \text{ mol NH}_3}{17.04 \text{ g NH}_3} \times \frac{6 \text{ mol H}_2\text{O}}{4 \text{ mol NH}_3} = 72.5 \text{ mol H}_2\text{O}$$

$$\text{mol NO} = \frac{4 \text{ mol NO}}{4 \text{ mol NH}_3} \times \frac{1 \text{ mol NH}_3}{17 \text{ g NH}_3} \times 824 \text{ g NH}_3 = 48.47 \text{ mol NO}$$

$$\text{mol H}_2\text{O} = \frac{6 \text{ mol H}_2\text{O}}{4 \text{ mol NH}_3} \times \frac{1 \text{ mol NH}_3}{17 \text{ g NH}_3} \times 824 \text{ g NH}_3 = 72.71 \text{ mol H}_2\text{O}$$






# สารกำหนดปริมาณและสารคงเหลือ

## สารกำหนดปริมาณ (limiting reagent, limiting reactant)

คือสารตั้งต้นที่หมดก่อนในปฏิกิริยาเคมี ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดปริมาณผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะมีส่วนตั้งต้นตัวอื่นมากเพียงใด ผลิตภัณฑ์ก็จะเกิดขึ้นตามปริมาณของสารกำหนดปริมาณนี้เท่านั้น

## สารคงเหลือ (excess reactant)

คือสารตั้งต้นที่เหลือหลังจากปฏิกิริยาเสร็จสิ้นเนื่องจากสารกำหนดปริมาณหมดไปก่อน ทำให้ปฏิกิริยาหยุดลง สารคงเหลือจะไม่มีผลต่อปริมาณผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น



H<sub>2</sub> ในปฏิกิริยาหมดก่อน = สารกำหนดปริมาณ

O<sub>2</sub> เหลืออยู่หลังจากปฏิกิริยาเสร็จสิ้น = สารคงเหลือ

ปริมาณของผลิตภัณฑ์ H<sub>2</sub>O ที่เกิดขึ้นขึ้นอยู่กับปริมาณของสารกำหนดปริมาณ H<sub>2</sub>



## การคำนวณหาสารกำหนดปริมาณ

คำนวณจำนวนโมลของสารตั้งต้นทั้งหมด แล้วเทียบกับอัตราส่วนในสมการเคมี สารใดที่ให้จำนวนโมลของผลิตภัณฑ์น้อยที่สุด สารนั้นคือสารกำหนดปริมาณ ดังขั้นตอนต่อไปนี้

1. ดุลสมการ
2. จากข้อมูลปริมาณสารที่กำหนดมาให้ ให้อยู่ในรูปโมล
3. ใช้ปริมาณสารสัมพันธ์ของสารตั้งต้นแต่ละตัว เพื่อหาโมลของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น
4. สารตั้งต้นที่ทำให้เกิดสารผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่น้อยกว่า จัดเป็นสารกำหนดปริมาณ
5. สารตั้งต้นที่ทำให้เกิดสารผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่มากกว่า จัดเป็นสารคงเหลือ
6. ถ้าต้องการทราบว่าสารคงเหลือมีปริมาณอยู่เท่าไร สามารถคำนวณโดยการนำมวลของสารคงเหลือที่ใช้ไปในปฏิกิริยามาลบออกจากมวลทั้งหมดของสารคงเหลือที่กำหนดมาให้



## ร้อยละของผลิตภัณฑ์ (percent yield)

ในการผลิตสารเคมีบางครั้งสารผลิตภัณฑ์อาจจะได้น้อยกว่าความเป็นจริงซึ่งอาจจะเกิดจากปฏิกิริยาที่ไม่สมบูรณ์ หรือเกิดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่ได้สนใจ หรืออาจจะเกิดจากข้อผิดพลาดระหว่างทำการทดลอง ดังนั้นจึงได้รายงานออกมาในแบบร้อยละของผลิตภัณฑ์ ในรูปอัตราส่วนของผลได้จริงต่อผลได้ทางทฤษฎี คูณด้วย 100%

$$\text{Percent yield} = \frac{\overset{\text{experiment}}{\text{actual yield}}}{\text{theoretical yield}} \times 100\%$$

**ผลผลิตที่ได้จริง (actual yield)** เป็นปริมาณผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจริงจากการทดลอง

**ผลผลิตทางทฤษฎี (theoretical yield)** เป็นปริมาณผลิตภัณฑ์สูงสุดที่ควรเกิดขึ้นตามการคำนวณจากสารกำหนดปริมาณ


**ร้อยละของการเปลี่ยนไป (%conversion)** จะดูว่าสารตั้งต้นเปลี่ยนไปเท่าไรเมื่อปฏิกิริยาเสร็จสิ้นเทียบกับตอนเริ่มปฏิกิริยา

$$\% \text{ conversion} = \frac{\text{น้ำหนักสารตั้งต้นที่เหลือ}}{\text{น้ำหนักสารตั้งต้นตอนเริ่ม}} \times 100 \%$$



แคลเซียมไฮดรอกไซด์เป็นเบสที่ใช้สำหรับแก้ปัญหากรณีกรดปนเปื้อนหรือหก โดยจะทำปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกตามสมการดังนี้

ต้อง Check ว่าสารใดเป็นสารกำหนดปริมาณ



หากคุณทำกรดไฮโดรคลอริกหก 6.3 โมล และเติมแคลเซียมไฮดรอกไซด์ 2.8 โมล ลงไปในนั้น สารใดเป็นสารกำหนดปริมาณ

(check;

$$\text{Ca(OH)}_2 : \text{HCl} = 2.8 : 6.3$$

$$= \frac{2.8}{1} : \frac{6.3}{2}$$

$$= 2.8 : 3.15$$

ดังนั้น  $\text{Ca(OH)}_2$  คือสารกำหนดปริมาณ

**Given:** amount of reactant  $\text{Ca(OH)}_2 = 2.8 \text{ mol}$   
amount of reactant  $\text{HCl} = 6.3 \text{ mol}$

**Unknown:** limiting reactant

Choose one of the reactants, in this case  $\text{Ca(OH)}_2$ . Use the mole ratio between the two reactants to compute the amount of the other reactant that would be needed to react with it. Compare that amount with the amount available.


$$\text{mol Ca(OH)}_2 \times \frac{\text{mole ratio } 2 \text{ mol HCl}}{1 \text{ mol Ca(OH)}_2} = \text{mol HCl needed}$$

$$2.8 \text{ mol Ca(OH)}_2 \times \frac{2 \text{ mol HCl}}{1 \text{ mol Ca(OH)}_2} = 5.6 \text{ mol HCl needed}$$

The solution shows that more  $\text{HCl}$  (6.3 mol) is available than is needed (5.6 mol) to react with the 2.8 mol  $\text{Ca(OH)}_2$  available. Therefore,  $\text{HCl}$  is present in excess, making  $\text{Ca(OH)}_2$  the limiting reactant.



ออกไซด์สีดำของเหล็ก  $\text{Fe}_3\text{O}_4$  พบตามธรรมชาติในรูปของแมกนีไทต์ สารนี้ยังสามารถสังเคราะห์ได้ในห้องปฏิบัติการ โดยทำปฏิกิริยาระหว่างเหล็กร้อนแดงกับไอน้ำ



- a) เมื่อผสมน้ำ 36.0 กรัม กับเหล็ก 67.0 กรัม สารใดเป็นสารกำหนดปริมาณ
- b) จะได้มวลของออกไซด์สีดำของเหล็กเท่าใด ( $\text{Fe}_3\text{O}_4$ ) ในหน่วยกรัม
- c) เมื่อปฏิกิริยาเกิดขึ้นจนสมบูรณ์ จะมีสารตั้งต้นเหลืออยู่กี่กรัม

a) check ; สังกะหนูปริมาณ  $\leftarrow \text{Fe} : \text{H}_2\text{O}$

$$\text{Fe} : \text{H}_2\text{O} = \frac{1.20}{3} : \frac{2.00}{4} = 0.40 : 0.50$$

$$\text{b) } g \text{ Fe}_3\text{O}_4 = \frac{231.55 \text{ g Fe}_3\text{O}_4}{1 \text{ mol Fe}_3\text{O}_4} \times \frac{1 \text{ mol Fe}_3\text{O}_4}{3 \text{ mol Fe}} \times 1.20 \text{ mol Fe} = 92.62 \text{ g Fe}_3\text{O}_4$$

$$\text{c) } g \text{ H}_2\text{O}_{\text{rxnt}} = \frac{18 \text{ g H}_2\text{O}}{1 \text{ mol H}_2\text{O}} \times \frac{4 \text{ mol H}_2\text{O}}{3 \text{ mol Fe}} \times 1.20 \text{ mol Fe} = 28.8 \text{ g H}_2\text{O}_{\text{rxn}} \therefore \text{H}_2\text{O เหลือ} = 36 - 28.8 = 7.2 \text{ g H}_2\text{O}$$

a. Use the periodic table to determine the molar masses of  $\text{H}_2\text{O}$ , Fe, and  $\text{Fe}_3\text{O}_4$ . Then, determine how many mol  $\text{Fe}_3\text{O}_4$  can be produced from each reactant.

$$1 \text{ mol H}_2\text{O} = 18.02 \text{ g}$$

$$1 \text{ mol Fe} = 55.85 \text{ g}$$

$$1 \text{ mol Fe}_3\text{O}_4 = 231.55 \text{ g}$$

$$67.0 \text{ g Fe} \times \frac{1 \text{ mol Fe}}{55.85 \text{ g Fe}} \times \frac{1 \text{ mol Fe}_3\text{O}_4}{3 \text{ mol Fe}} = 0.400 \text{ mol Fe}_3\text{O}_4$$

$$36.0 \text{ g H}_2\text{O} \times \frac{1 \text{ mol H}_2\text{O}}{18.02 \text{ g H}_2\text{O}} \times \frac{1 \text{ mol Fe}_3\text{O}_4}{4 \text{ mol H}_2\text{O}} = 0.499 \text{ mol Fe}_3\text{O}_4$$

**Fe is the limiting reactant**, because the given amount of Fe can make only 0.400 mol  $\text{Fe}_3\text{O}_4$ , which is less than the 0.499 mol  $\text{Fe}_3\text{O}_4$  that the given amount of  $\text{H}_2\text{O}$  would produce.


$$\text{b. } 0.400 \text{ mol Fe}_3\text{O}_4 \times \frac{231.55 \text{ g Fe}_3\text{O}_4}{1 \text{ mol Fe}_3\text{O}_4} = 92.6 \text{ g Fe}_3\text{O}_4$$

$$\text{c. } 0.400 \text{ mol Fe}_3\text{O}_4 \times \frac{4 \text{ mol H}_2\text{O}}{1 \text{ mol Fe}_3\text{O}_4} \times \frac{18.02 \text{ g H}_2\text{O}}{1 \text{ mol H}_2\text{O}} = 28.8 \text{ g H}_2\text{O consumed}$$

$$36.0 \text{ g H}_2\text{O} - 28.8 \text{ g H}_2\text{O consumed} = 7.2 \text{ g H}_2\text{O remaining}$$



ไดคลอรีนมอนอกไซด์ ( $\text{Cl}_2\text{O}$ ) บางครั้งถูกใช้เป็นสารเติมคลอรีนที่มีฤทธิ์แรงในงานวิจัย สามารถผลิตได้โดยการทำให้ก๊าซคลอรีนผ่านปรอท(II)ออกไซด์ที่ถูกให้ความร้อน ตามสมการเคมีดังนี้:



หากปริมาณสารตั้งต้นเพียงพอที่จะผลิต  $\text{Cl}_2\text{O}$  ได้ 0.86 กรัม แต่ได้ผลผลิตจริงเพียง 0.71 กรัม จงหาร้อยละผลผลิต (Percentage yield) ของปฏิกิริยานี้

$$\frac{0.71 \text{ g Cl}_2\text{O}}{0.86 \text{ g Cl}_2\text{O} \times 100} = 83\% \text{ yield}$$

$$\Rightarrow \% \text{ yield} = \frac{\text{exp}}{\text{theory}} \times 100$$

$$= \left( \frac{0.71}{0.86} \right) \times 100 \checkmark$$



## ความเข้มข้นของสารละลาย (Concentration of solution)

มวลเปอร์เซ็นต์ (mass percent, %m/m) % w/w

$$\% \text{ m/m} = \frac{\text{mass of solute}}{\text{mass of solution}} \times 100\%$$

$$\text{mass of solution} = \text{mass of solute} + \text{mass of solvent}$$

ในการบอกความเข้มข้นของสารละลายที่เจือจางมาก ๆ นิยมใช้  
ในหน่วย ส่วนในล้านส่วน (ppm) หรือ ส่วนในพันล้านส่วน  
(ppb)

$$\text{ppm} = \frac{\text{mass solute}}{\text{mass solution}} \times 10^6 \text{ ppm}$$

$$\text{ppb} = \frac{\text{mass solute}}{\text{mass solution}} \times 10^9 \text{ ppb}$$

สารละลายที่มีตัวทำละลายเป็นน้ำ

สารละลายที่มีความเข้มข้นของตัวถูกละลาย 1 ppm  
หมายความว่า มีตัวถูกละลาย 1 กรัมต่อสารละลาย  
หนึ่งล้าน (10<sup>6</sup>) กรัม หรือเท่ากับ 1 มิลลิกรัมของตัว  
ถูกละลายต่อสารละลาย 1 กิโลกรัม เนื่องจากความ  
หนาแน่นของน้ำคือ 1 กรัมต่อมิลลิลิตร สารละลาย  
เจือจาง 1 กิโลกรัมจะมีปริมาตรใกล้เคียงกับ 1 ลิตร  
ดังนั้น

$$1 \text{ ppm} = \frac{1 \text{ mg Solute}}{1 \text{ L Solution}}$$

$$1 \text{ ppb} = \frac{1 \text{ } \mu\text{g Solute}}{1 \text{ L Solution}}$$






## ความเข้มข้นของสารละลาย (Concentration of solution)

โมลาริตี (Molarity, M, mol/L) คือจำนวนโมลของตัวถูกละลาย ต่อปริมาตร 1 ลิตรของสารละลาย

$$(M) \text{ Molarity} = \frac{\text{moles solute}}{\text{volume of solution in liters}} = \frac{\text{mol}}{L}$$

## Solution Composition: Molarity



**a**  
Put a weighed amount of a substance (the solute) into the volumetric flask, and add a small quantity of water.



**b**  
Dissolve the solid in the water by gently swirling the flask (with the stopper in place).



**c**  
Add more water (with gentle swirling) until the level of the solution just reaches the mark etched on the neck of the flask. Then mix the solution thoroughly by inverting the flask several times.

โมแลลิตี (Molality, m, mol/kg) คือจำนวนโมลของตัวถูกละลายต่อมวล 1 กิโลกรัมของตัวทำละลาย มีหน่วยเป็น mol/kg คำนวณจาก

$$\text{Molality } (m) = \frac{\text{moles of solute}}{\text{kilograms of solvent}} = \frac{\text{mol}}{\text{kg}}$$



สารละลายปริมาตร 3.50 ลิตร มีโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) อยู่ 90.0 กรัม จงหาความเข้มข้นในหน่วยโมลาร์ของสารละลายนี้

$\rightarrow \frac{\text{mol}}{\text{L}}$

*Solute*

$$\text{NaCl} = \text{Na} + \text{Cl} = 23 + 35.5 = 58.5 \text{ g/mol}$$

You will need the molar mass of NaCl.

$$\text{NaCl} = 58.44 \text{ g/mol}$$

$$90.0 \text{ g NaCl} \times \frac{1 \text{ mol NaCl}}{58.44 \text{ g NaCl}} = 1.54 \text{ mol NaCl}$$

$$\frac{1.54 \text{ mol NaCl}}{3.50 \text{ L of solution}} = 0.440 \text{ M NaCl}$$

$$\frac{\text{mol}}{\text{L}} = \frac{90 \text{ g NaCl}}{3.50 \text{ L sol}^n} \times \frac{1 \text{ mol NaCl}}{58.5 \text{ g NaCl}} = 0.439 \frac{\text{mol}}{\text{L}}$$

$$\approx 0.44 \frac{\text{mol}}{\text{L}} (\text{M})$$



สารละลายโพแทสเซียมโครเมต ( $\text{K}_2\text{CrO}_4$ ) เข้มข้น 6.0 โมลาร์ <sup>(mol/L)</sup> จะต้องใช้สารละลายนี้กี่ลิตร เพื่อให้ได้  $\text{K}_2\text{CrO}_4$  ปริมาณ 23.4 กรัม

To get the moles of solute, you'll need to calculate the molar mass of  $\text{K}_2\text{CrO}_4$ .

$$1 \text{ mol K}_2\text{CrO}_4 = 194.2 \text{ g K}_2\text{CrO}_4$$

$$23.4 \text{ g K}_2\text{CrO}_4 \times \frac{1 \text{ mol K}_2\text{CrO}_4}{194.2 \text{ g K}_2\text{CrO}_4} = 0.120 \text{ mol K}_2\text{CrO}_4$$

Use the molarity of the solution to convert. Since you know 6.0 mol of  $\text{K}_2\text{CrO}_4$  is in 1 L of solution, you will need:

$$0.120 \text{ mol K}_2\text{CrO}_4 \times \frac{1 \text{ L}}{6.0 \text{ mol}} =$$

$$= 0.020 \text{ L of K}_2\text{CrO}_4 \text{ solution}$$

$$L \text{ sol}^n = \frac{1 \text{ L sol}^n}{6 \text{ mol K}_2\text{CrO}_4} \times \frac{1 \text{ mol K}_2\text{CrO}_4}{194.2 \text{ g K}_2\text{CrO}_4} \times 23.4 \text{ g K}_2\text{CrO}_4 = 0.020 \text{ L sol}^n$$



สารละลายกรดไนตริก ( $\text{HNO}_3$ ) หนัก 500.0 กรัม มีความเข้มข้น 5.0% โดยมวล ความหนาแน่นของสารละลายเท่ากับ 1.02 g/mL จงหาความเข้มข้นของสารละลาย ในหน่วย

1. โมลาร์  $\Rightarrow \frac{\text{mol}}{L} = \frac{25 \text{ g HNO}_3}{500 \text{ g sol}^n} \times \frac{1 \text{ mol HNO}_3}{63 \text{ g HNO}_3} \times \frac{1.02 \text{ g sol}^n}{1 \text{ mL}} \times \frac{1000 \text{ mL}}{1 \text{ L}} = 0.809 \frac{\text{mol}}{L}$

2. ppm  $\text{g HNO}_3 = \frac{5 \text{ g HNO}_3}{100 \text{ g sol}^n} \times 500 \text{ g sol}^n = 25 \text{ g HNO}_3$

$\text{HNO}_3 = 63 \text{ g/mol}$

(1) คำนวณมวลของ  $\text{HNO}_3$  ในสารละลาย  $\text{g HNO}_3 = \frac{5 \text{ g HNO}_3}{100 \text{ g sol}^n} \times 500 \text{ g sol}^n = 25 \text{ g HNO}_3$

มวล  $\text{HNO}_3$  (g) =  $\frac{5.0 \text{ g HNO}_3}{100 \text{ g สารละลาย}} \times 500.0 \text{ g สารละลาย} = 25.0 \text{ g HNO}_3$

## (2) คำนวณจำนวนโมลของ $\text{HNO}_3$

มวลโมลาร์ของ  $\text{HNO}_3$ :

Molar mass  $\text{HNO}_3 = (1.008 \times 1) + (14.01 \times 1) + (16.00 \times 3) = 63.018 \text{ g/mol}$

$\text{mol HNO}_3 = \frac{25.0 \text{ g}}{63.018 \text{ g/mol}} = 0.3967 \text{ mol}$

## (3) คำนวณปริมาตรสารละลาย (mL $\rightarrow$ L)

ปริมาตรสารละลาย (mL) =  $\frac{500.0 \text{ g}}{1.02 \text{ g/mL}} = 490.196 \text{ mL}$

ปริมาตรสารละลาย (L) =  $\frac{490.196 \text{ mL}}{1000 \text{ mL/L}} = 0.490196 \text{ L}$

## (4) คำนวณ Molarity (M)

$M = \frac{\text{mol HNO}_3}{L \text{ สารละลาย}} = \frac{0.3967 \text{ mol}}{0.490196 \text{ L}} = 0.809 \text{ M}$

## (5) คำนวณความเข้มข้นในหน่วย ppm

$\text{ppm} = \frac{\text{มวล HNO}_3 \text{ (g)}}{\text{มวลสารละลาย (g)}} \times 10^6 = \frac{25.0 \text{ g}}{500.0 \text{ g}} \times 10^6 = 50,000 \text{ ppm}$

$\text{ppm} = \frac{25 \text{ g HNO}_3}{500 \text{ g sol}^n} \times 10^6 = 50,000 \text{ ppm}$



## การเจือจางสารละลาย (Solution Dilution)

การปฏิบัติงานจริงหากต้องเตรียมสารละลายปริมาณมากและหลายครั้ง เพื่อลดความคลาดเคลื่อนและความสะดวกจึงเตรียมสารละลายที่มีความเข้มข้นสูงเรียกว่า stock solution หรือ สารละลายมาตรฐาน (standard solution) จากนั้นค่อยนำมาเจือจาง โดยการเติมตัวทำละลายเพิ่มลงไป จะทำให้ความเข้มข้นของสารละลายลดลงโดยที่จำนวนโมลของตัวถูกละลายยังคงเท่าเดิม โดยมีความสัมพันธ์

$$C_1 V_1 = n_{\text{solute}} = C_2 V_2$$

$$M_1 V_1 = n_{\text{solute}} = M_2 V_2$$

Moles of solute after dilution = moles of solute before dilution

| Initial Conditions |              | = moles of solute = | Final Conditions |              |
|--------------------|--------------|---------------------|------------------|--------------|
| $M_1$              | $\times V_1$ |                     | $M_2$            | $\times V_2$ |
| Molarity           | Volume       |                     | Molarity         | Volume       |
| before             | before       |                     | after            | after        |
| dilution           | dilution     |                     | dilution         | dilution     |

1 Draw 25.0 mL of 1.00 M stock solution into pipette



2 Add concentrated solution in pipette to 250-mL volumetric flask



3 Dilute with water until solution reaches calibration mark on neck of flask and mix to create 0.100 M solution



Preparing 250.0 mL of 0.100 M  $\text{CuSO}_4$  by dilution of 1.00 M  $\text{CuSO}_4$



จงคำนวณหาปริมาตร (mL) ของสารละลาย NaOH ความเข้มข้น  $1.25\text{ M}$   <sup>$C_1$</sup>  ที่ต้องใช้ในการเตรียม  
สารละลาย NaOH ความเข้มข้น  $0.125\text{ M}$   <sup>$C_2$</sup>  ปริมาตร  $200.00\text{ mL}$   <sup>$V_2$</sup>

$$C_1 V_1 = C_2 V_2$$

$$V_1 = \frac{0.125\text{ M} \times 200.00\text{ mL}}{1.25\text{ M}} = 20.00\text{ mL}$$



# Practice





ไอพ่นไฟ

โมโนโซเดียมกลูตาเมต (MSG) ซึ่งเป็นสารปรุงแต่งรสอาหาร ถูกกล่าวถึงว่าอาจเป็นสาเหตุของอาการที่เรียกว่า “กลุ่มอาการร้านอาหารจีน” โดยมีอาการ เช่น ปวดศีรษะและเจ็บหน้าอก MSG มีองค์ประกอบโดยมวลดังนี้: คาร์บอน (C) 35.51%, ไฮโดรเจน (H) 4.77%, ออกซิเจน (O) 37.85%, ไนโตรเจน (N) 8.29% และโซเดียม (Na) 13.60% จงหาสูตรโมเลกุลของ MSG หากมวลโมเลกุลของสารนี้ประมาณ 169 กรัม

### ขั้นที่ 1: สมมติสารหนัก 100.00 g

เพื่อความง่าย สมมติว่าเรามี MSG 100.00 g

จะได้มวลของธาตุต่าง ๆ ดังนี้:

$$\text{มวล C} = \frac{35.51}{100} \times 100.00 \text{ g} = 35.51 \text{ g}$$

$$\text{มวล H} = \frac{4.77}{100} \times 100.00 \text{ g} = 4.77 \text{ g}$$

$$\text{มวล O} = \frac{37.85}{100} \times 100.00 \text{ g} = 37.85 \text{ g}$$

$$\text{มวล N} = \frac{8.29}{100} \times 100.00 \text{ g} = 8.29 \text{ g}$$

$$\text{มวล Na} = \frac{13.60}{100} \times 100.00 \text{ g} = 13.60 \text{ g}$$

### ขั้นที่ 2: หาจำนวนโมลของแต่ละธาตุ

$$\text{ธาตุ C: } \frac{35.51 \text{ g}}{12 \text{ g/mol}} = 2.957 \text{ mol}$$

ธาตุ H:

$$\text{mol H} = \frac{4.77 \text{ g}}{1.008 \text{ g/mol}} = 4.732 \text{ mol}$$

ธาตุ O:

$$\text{mol O} = \frac{37.85 \text{ g}}{16.00 \text{ g/mol}} = 2.365 \text{ mol}$$

ธาตุ N:

$$\text{mol N} = \frac{8.29 \text{ g}}{14.01 \text{ g/mol}} = 0.592 \text{ mol}$$

ธาตุ Na:

$$\text{mol Na} = \frac{13.60 \text{ g}}{22.99 \text{ g/mol}} = 0.592 \text{ mol}$$

### ขั้นที่ 3: หาอัตราส่วนโมลอย่างต่ำ

หารด้วยค่าที่เล็กที่สุดคือ 0.592 mol:

$$\text{C} = \frac{2.957}{0.592} = 5.00$$

$$\text{H} = \frac{4.732}{0.592} = 8.00$$

$$\text{O} = \frac{2.365}{0.592} = 4.00$$

$$\text{N} = \frac{0.592}{0.592} = 1.00$$

$$\text{Na} = \frac{0.592}{0.592} = 1.00$$

ดังนั้น สูตรเคมีพื้นฐาน (Empirical Formula) คือ:




### ขั้นที่ 4: ตรวจสอบมวลโมลาร์ของสูตรเคมีพื้นฐาน

$$\begin{aligned} \text{Molar Mass} &= (5 \times 12.01) + (8 \times 1.008) + (4 \times 16.00) + (1 \times 14.01) + (1 \times 22.99) \\ &= 60.05 + 8.064 + 64.00 + 14.01 + 22.99 = 169.114 \text{ g/mol} \end{aligned}$$

ใกล้เคียงกับโจทย์ที่ให้มาคือ 169 g/mol ดังนั้น  $n = 1$



ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต  $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$  ผลิตได้จากปฏิกิริยาระหว่างก๊าซแอมโมเนีย ( $\text{NH}_3$ ) และกรดซัลฟิวริก ( $\text{H}_2\text{SO}_4$ ) ตามสมการเคมี:



หากต้องการผลิตแอมโมเนียมซัลเฟต  $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$  จำนวน  $1.00 \times 10^5$  กิโลกรัม จะต้องใช้ก๊าซแอมโมเนีย ( $\text{NH}_3$ ) กี่กิโลกรัม?

$$\text{kg NH}_3 = \frac{17 \text{ kg NH}_3}{1 \text{ kmol}} \times \frac{2 \text{ kmol NH}_3}{1 \text{ kmol (NH}_4)_2\text{SO}_4} \times \frac{1 \text{ kmol (NH}_4)_2\text{SO}_4}{132.154 \text{ kg (NH}_4)_2\text{SO}_4} \times 1.00 \times 10^5 \text{ kg (NH}_4)_2\text{SO}_4 = 25,727.56 \text{ kg NH}_3 \#$$

1. Molar mass of  $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 = 28.02 + 8.064 + 32.07 + 64.00 = 132.154 \text{ g/mol}$

2. แปลงมวล  $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$  เป็นหน่วยกรัม


$$1.00 \times 10^5 \text{ kg} \times 1000 \text{ g/kg} = 1.00 \times 10^8 \text{ g}$$

3. คำนวณจำนวนโมลของ  $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$

$$\text{mol (NH}_4)_2\text{SO}_4 = \frac{1.00 \times 10^8 \text{ g}}{132.154 \text{ g/mol}} = 756640.47 \text{ mol}$$

4. หาจำนวนโมลของ  $\text{NH}_3$  ที่ต้องใช้

จากสมการเคมี:



$$\text{mol NH}_3 = 2 \times 756640.47 \text{ mol} = 1513280.94 \text{ mol}$$

5. หามวล  $\text{NH}_3$  (กรัม)

มวลโมลาร์ของ  $\text{NH}_3$ :

$$\text{Molar mass of NH}_3 = (14.01) + (1.008 \times 3) = 17.034 \text{ g/mol}$$

$$\text{Mass of NH}_3(\text{g}) = 1513280.94 \text{ mol} \times 17.034 \text{ g/mol} = 25779620.64 \text{ g}$$

6. แปลงเป็นกิโลกรัม

$$\text{Mass of NH}_3(\text{kg}) = \frac{25779620.64 \text{ g}}{1000 \text{ g/kg}} = 25779.62 \text{ kg}$$


★ คำตอบ

ต้องใช้ก๊าซแอมโมเนีย ( $\text{NH}_3$ ) ประมาณ 25,780 กิโลกรัม เพื่อผลิต  $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$  จำนวน  $1.00 \times 10^5$  กิโลกรัม

$$\boxed{25,780 \text{ kg NH}_3}$$



การลดลงของโอโซน ( $O_3$ ) ในชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์นับเป็นประเด็นที่สร้างความกังวลอย่างมากในหมู่นักวิทยาศาสตร์ตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีความเชื่อว่าโอโซนสามารถทำปฏิกิริยากับไนตริกออกไซด์ ( $NO$ ) ซึ่งถูกปล่อยออกมาจากเครื่องบินเจ็ตที่บินในระดับความสูงมาก เช่น เครื่องบิน SST (Supersonic Transport) โดยปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นคือ: **ต้อง check สารกำหนดปริมาณก่อน**



หากโอโซนปริมาณ 0.740 กรัม ทำปฏิกิริยากับไนตริกออกไซด์ปริมาณ 0.670 กรัม จะสามารถผลิตแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ ( $NO_2$ ) ได้กี่กรัม? สารใดเป็นสารกำหนดปริมาณ (Limiting reagent)? และจงคำนวณจำนวนโมลของสารที่เหลือหลังปฏิกิริยาสิ้นสุด

#### Step 1 → แปลงกรัม $O_3$ → mol $O_3$ → mol $NO_2$ → g $NO_2$

มวลโมลาร์:

- $O_3 = 48.00 \text{ g/mol}$
- $NO_2 = 46.01 \text{ g/mol}$

$$0.740 \text{ g } O_3 \times \frac{1 \text{ mol } O_3}{48.00 \text{ g } O_3} \times \frac{1 \text{ mol } NO_2}{1 \text{ mol } O_3} \times \frac{46.01 \text{ g } NO_2}{1 \text{ mol } NO_2} = 0.7095 \text{ g } NO_2$$

→ ถ้า  $O_3$  ไม่หมด จะได้  $NO_2 = 0.7095 \text{ g}$

#### Step 2 → เช็ค mol ของ NO พอหรือไม่?

หา mol ของ NO

$$0.670 \text{ g } NO \times \frac{1 \text{ mol } NO}{30.01 \text{ g } NO} = 0.02233 \text{ mol } NO$$

mol  $O_3$  ที่มี =

$$0.740 \text{ g } O_3 \times \frac{1}{48.00} = 0.01542 \text{ mol } O_3$$

จากสมการเคมี → ต้องการ 1 mol NO ต่อ 1 mol  $O_3$

→ ต้องใช้ NO = 0.01542 mol ซึ่ง มี NO = 0.02233 mol (มากกว่า)

→  $O_3$  เป็นสารกำหนดปริมาณ

#### Step 3 → หาสาร NO ที่เหลือ

NO ใช้ไปเท่ากับ mol  $O_3 = 0.01542 \text{ mol}$

$$\text{mol NO เหลือ} = 0.02233 - 0.01542 = 0.00691 \text{ mol}$$

#### ★ คำตอบสุดท้าย

$$NO_2 = 0.710 \text{ g}, \text{ Limiting reagent} = O_3, \text{ NO เหลือ} = 0.00691 \text{ mol}$$



ปริมาณแอลกอฮอล์ในสุราที่มีดีกรีสูง (hard liquor) มักระบุในรูปของค่า “proof” ซึ่งนิยามว่าเป็นสองเท่าของเปอร์เซ็นต์ปริมาตรของเอทานอล ( $C_2H_5OH$ ) ที่มีอยู่ จงคำนวณหามวล (เป็นกรัม) ของแอลกอฮอล์ที่มีอยู่ในสุรา gin ขนาด 1.00 L ที่มีค่า 75 proof โดยที่ความหนาแน่นของเอทานอลเท่ากับ 0.798 g/mL

### ★ วิธีทำ (พร้อมหน่วย)

#### 1. แปลง proof → % v/v

นิยาม:

$$\text{Proof} = 2 \times \% \text{ v/v}$$

→ ดังนั้น

$$\% \text{ v/v} = \frac{\text{Proof}}{2} = \frac{75}{2} = 37.5\%$$

→ หมายถึง ใน gin 100 mL จะมีเอทานอล 37.5 mL

#### 2. หา volume ของเอทานอลใน 1.00 L gin

$$1.00 \text{ L gin} = 1000 \text{ mL gin}$$

$$\text{Volume ethanol} = \frac{37.5}{100} \times 1000 \text{ mL} = 375.0 \text{ mL ethanol}$$

$$g \text{ Ethanol} = \frac{0.798 \text{ g Ethanol}}{1 \text{ mL}} \times 375 \text{ mL} = 299.25 \text{ g}$$

#### 3. หา mass ของ ethanol


$$\text{Density ethanol} = 0.798 \text{ g/mL}$$

$$\text{Mass ethanol} = 375.0 \text{ mL} \times 0.798 \text{ g/mL} = 299.25 \text{ g}$$



หากเติมสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ ( $\text{CaCl}_2$ ) ความเข้มข้น 0.150 โมลาร์ ปริมาตร 30.0 มิลลิลิตร ลงในสารละลายเงินไนเตรต ( $\text{AgNO}_3$ ) ความเข้มข้น 0.100 โมลาร์ ปริมาตร 15.0 มิลลิลิตร จะเกิดตะกอนเงินคลอไรด์ ( $\text{AgCl}$ ) ขึ้นเป็นจำนวนกี่กรัม?

หาปริมาณสาร



0.0045

0.0015 mol

เติมสารละลาย:

- $\text{CaCl}_2$  0.150 M, 30.0 mL  $\rightarrow \text{mol CaCl}_2 = MV = \frac{0.150 \text{ mol}}{\text{L}} \times 30 \text{ mL} \times \frac{1 \text{ L}}{1000 \text{ mL}} = 0.0045 \text{ mol}$
- $\text{AgNO}_3$  0.100 M, 15.0 mL  $\rightarrow \text{mol AgNO}_3 = MV = 0.0015 \text{ mol AgNO}_3$

จะเกิดตะกอน  $\text{AgCl}$  กี่กรัม?

### Step 1 – หาคำนวนโมล $\text{CaCl}_2$



$$\text{mol CaCl}_2 = 0.150 \text{ mol/L} \times \frac{30.0 \text{ mL}}{1000 \text{ mL/L}} = 0.00450 \text{ mol}$$

### Step 2 – หาคำนวนโมล $\text{AgNO}_3$

$$\text{mol AgNO}_3 = 0.100 \text{ mol/L} \times \frac{15.0 \text{ mL}}{1000 \text{ mL/L}} = 0.00150 \text{ mol}$$

### Step 3 – เทียบอัตราส่วนโมล

จากสมการ:



$\rightarrow$  ต้องการ  $\text{AgNO}_3$  2 mol ต่อ  $\text{CaCl}_2$  1 mol

### หา Limiting Reagent


ตรวจว่ามี  $\text{AgNO}_3$  พอหรือไม่:

- ต้องใช้  $\text{AgNO}_3 = 0.00450 \times 2 = 0.00900 \text{ mol}$
- แต่มีจริง  $\text{AgNO}_3 = 0.00150 \text{ mol} < 0.00900 \text{ mol}$

$\rightarrow \text{AgNO}_3$  เป็นสารกำหนดปริมาณ

### Step 4 – หาโมล $\text{AgCl}$ ที่เกิดจาก $\text{AgNO}_3$

จากสมการ:



$\rightarrow \text{mol AgCl} = \text{mol AgNO}_3$

$$\text{mol AgCl} = 0.00150 \text{ mol}$$

### Step 5 – แปลง mol $\text{AgCl} \rightarrow \text{g AgCl}$

มวลโมลาร์  $\text{AgCl}$ :

$$M_{\text{AgCl}} = 107.87 + 35.45 = 143.32 \text{ g/mol}$$

$$\text{mass AgCl} = 0.00150 \text{ mol} \times 143.32 \text{ g/mol} = 0.215 \text{ g}$$

$$\text{g AgCl} = \frac{143.32 \text{ g AgCl}}{1 \text{ mol AgCl}} \times \frac{2 \text{ mol AgCl}}{2 \text{ mol AgNO}_3} \times 0.0015 \text{ mol AgNO}_3$$



ผู้ป่วยที่มีภาวะโซเดียมในเลือดต่ำ (Hyponatremia) มีความเข้มข้นของไอออนโซเดียม<sup>Na<sup>+</sup></sup>ในเลือดอยู่ที่ 0.118 โมลาร์ และมีปริมาตรเลือดรวม 4.6 ลิตร ต้องเติมโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ลงในเลือดเป็นปริมาณกี่กรัม จึงจะทำให้ความเข้มข้นของไอออนโซเดียมเพิ่มขึ้นเป็น 0.138 โมลาร์ โดยสมมติว่าปริมาตรของเลือดยังคงเท่าเดิม?

### ★ โจทย์ (ภาษาไทยสรุป)

- ความเข้มข้น Na<sup>+</sup> เดิม = 0.118 M
- ต้องการเพิ่มเป็น = 0.138 M
- ปริมาตรเลือด = 4.6 L
- เติม NaCl (1 mol NaCl → 1 mol Na<sup>+</sup>)

ต้องเติม NaCl กี่กรัม?



### 1. หาความต่างความเข้มข้นที่ต้องเพิ่ม


$$\Delta C_{\text{Na}^+} = 0.138 \text{ M} - 0.118 \text{ M} = 0.020 \text{ mol/L}$$

### 2. คำนวณโมล Na<sup>+</sup> ที่ต้องเพิ่ม

$$0.020 \text{ mol/L} \times 4.6 \text{ L} = 0.0920 \text{ mol Na}^+$$

### 3. แปลง mol Na<sup>+</sup> → g NaCl ด้วย Conversion Factor

เพราะ:



และ

$$M_{\text{NaCl}} = 22.99 + 35.45 = 58.44 \text{ g/mol}$$

ดังนั้น:

$$0.0920 \text{ mol Na}^+ \times \frac{1 \text{ mol NaCl}}{1 \text{ mol Na}^+} \times \frac{58.44 \text{ g NaCl}}{1 \text{ mol NaCl}} = 5.374 \text{ g NaCl}$$

$$g \text{ NaCl} = \frac{58.44 \text{ g NaCl}}{1 \text{ mol NaCl}} \times \frac{1 \text{ mol NaCl}}{1 \text{ mol Na}^+} \times 0.0920 \text{ mol Na}^+$$