

Reporte de Situación Hídrica

Mayo 2026

Situación Hídrica en Sonora

Para proponer una reconversión productiva en Sonora, es fundamental analizar la situación hídrica bajo un enfoque sistémico. Este diagnóstico va desde la evolución temporal de largo plazo hasta la oferta natural pluvial, los riesgos térmicos extremos, la demanda fisiológica de los cultivos y la extracción real.

Evolución Temporal de la Sequía en Sonora (2003-2026)

Este análisis retrospectivo evalúa la severidad de la sequía a nivel municipal en las últimas dos décadas, clasificando la afectación del territorio según las categorías oficiales del Monitor de Sequía.




Figura 1: Evolución de la Sequía en Sonora (2003-2026)

La gráfica de área apilada revela que la sequía en Sonora no es un fenómeno aislado, sino una condición crónica. Se observan picos críticos en 2011-2012, 2020-2021 y un repunte sumamente severo a partir de 2023, donde casi el 90% del territorio estatal ha experimentado algún grado de sequía. La persistencia de las categorías «Extrema (D3)» y «Excepcional (D4)» demuestra que depender de cultivos perennes o de ciclos largos expone al productor a una alta probabilidad de pérdida total debido al agotamiento de fuentes de agua superficial y al descenso de los niveles estáticos de los acuíferos.

Tendencia de Precipitación y Temperatura Promedio (2010-2023)

Analizar las tendencias climáticas agregadas permite identificar si la escasez de agua se ve agravada por variaciones de temperatura que eleven la demanda evapotranspirativa del entorno.

Tendencia Histórica de Precipitación y Temperatura Promedio en Sonora (2010-2023)




Figura 2: Tendencia de Precipitación y Temperatura en Sonora (2010-2023)

Los registros históricos climatológicos muestran una tendencia decreciente en la precipitación media anual acumulada, acompañada de un aumento sostenido en la temperatura promedio de los ciclos agrícolas. Este calentamiento intensifica la evapotranspiración de referencia (ET_o), lo que incrementa de forma directa las láminas de riego requeridas por los cultivos para evitar el estrés hídrico. La brecha creciente entre la oferta pluvial decreciente y la demanda térmica ascendente hace indispensable transicionar hacia cultivos xerófitos o hortalizas de ciclo corto altamente eficientes.

Eficiencia de la Lluvia: Precipitación Total vs. Precipitación Efectiva

No toda la lluvia que cae es aprovechada por los cultivos. Este análisis estima la precipitación efectiva (P_{ef}), que es la porción de agua pluvial que logra infiltrarse y almacenarse en la zona radicular, excluyendo las pérdidas por escorrentía superficial rápida o percolación profunda.




Figura 3: Comparativa de Lluvia Total vs. Lluvia Efectiva por Municipio

La comparativa revela que en municipios de la región de la sierra y sur de Sonora (como Álamos, Yécora o Quiriego), la brecha entre la lluvia total y la efectiva es muy amplia debido a la alta intensidad de eventos torrenciales. Mucha agua se pierde por escurrimiento rápido debido a la topografía accidentada y a la baja capacidad de retención de humedad de los suelos agrícolas. Este resultado justifica que en zonas con baja eficiencia de lluvia se implemente infraestructura de retención hídrica, labranza de conservación y cultivos de ciclo corto que coincidan con la ventana de mayor humedad efectiva.

Distribución de Días de Lluvia Significativa en el Ciclo

Este indicador muestra el número promedio de días en los que se registran precipitaciones iguales o mayores a 1 mm y 5 mm, permitiendo contrastar lluvias de distribución constante contra eventos aislados y torrenciales del monzón.




Figura 4: Días Promedio de Lluvia Significativa por Municipio

Los datos confirman que, a pesar de que algunos municipios registran acumulados pluviales aparentemente aceptables, la distribución temporal es sumamente errática, concentrando la mayor cantidad de días con lluvia significativa ($\geq 5\text{ mm}$) en un periodo menor a 15 días del año. La prolongada ausencia de lluvias constantes significa que los cultivos de ciclo largo experimentarán largos meses de sequía intermedia si no cuentan con riego de auxilio, fundamentando la necesidad de introducir cultivos tolerantes a sequías intermitentes o sistemas de riego por goteo que establezcan el abasto de agua en el suelo.

Impacto por Sequía Acumulada Municipal (ISAG) por Ciclo

El Índice de Impacto por Sequía Acumulada Georeferenciada (ISAG) evalúa el riesgo de afectación sobre la actividad agrícola municipal distinguiendo entre los ciclos productivos Primavera-Verano (P-V) y Otoño-Invierno (O-I).

**Índice de Impacto por Sequía Acumulada (ISAG)
Ciclo Primavera-Verano (P-V) - Sonora**




Figura 5: ISAG Ciclo Primavera-Verano (P-V)

**Índice de Impacto por Sequía Acumulada (ISAG)
Ciclo Otoño-Invierno (O-I) - Sonora**




Figura 6: ISAG Ciclo Otoño-Invierno (O-I)

La distribución geográfica del ISAG demuestra que el ciclo Primavera-Verano concentra una vulnerabilidad extrema casi generalizada en todo el estado, debido al incremento en las temperaturas veraniegas y la alta evaporación previa al monzón. En el ciclo Otoño-Invierno, el impacto es menor y se concentra en el norte y altiplano. Para la reconversión productiva, este análisis determina que las restricciones son más severas en el ciclo P-V, donde se debe sustituir de inmediato el maíz por sorgo forrajero o suspender siembras de alta demanda en áreas clasificadas con vulnerabilidad «Alta».

Estrés Agroclimático por Temperaturas Extremas

Este indicador evalúa la cantidad de días promedio anuales en que los cultivos se ven expuestos a temperaturas extremas, ya sea por estrés térmico por calor o riesgo de daño físico por heladas.




Figura 7: Días Promedio de Estrés por Calor y Riesgo de Helada

Los resultados muestran una clara segmentación térmica en Sonora: los municipios de la sierra alta experimentan un elevado número de días con temperaturas bajo cero (riesgo de helada), limitando el establecimiento de perennes sensibles como cítricos. Por su parte, los municipios desérticos y costeros registran más de 90 días de estrés por calor extremo por ciclo, lo cual inhibe la polinización y viabilidad de diversas hortalizas durante el verano. Este análisis justifica la necesidad de seleccionar variedades de cultivos alternativos adaptados genéticamente a estos umbrales térmicos específicos.

Distribución Espacial de Temperaturas por Municipio

Para consolidar la zonificación térmica del estado, se generaron mapas de la distribución geográfica de las temperaturas media, máxima y mínima registradas:

Temperatura Media Promedio del Ciclo por Municipio - Sonora




Figura 8: Temperatura Media Promedio del Ciclo

Temperatura Máxima Promedio del Ciclo por Municipio - Sonora




Figura 9: Temperatura Máxima Promedio del Ciclo

Temperatura Mínima Promedio del Ciclo por Municipio - Sonora




Figura 10: Temperatura Mínima Promedio del Ciclo

Los tres mapas de temperatura muestran un patrón constante donde la altitud de la Sierra Madre Occidental amortigua las temperaturas máximas pero intensifica las mínimas estacionales, mientras que la llanura costera y el desierto noroccidental actúan como ollas de calor extremo. Esta cartografía sirve de base técnica para la exclusión de cultivos alternativos que no toleren temperaturas superiores a 40 °C en su etapa de floración o requieran horas-frío específicas para romper dormancia.

Láminas Técnicas de Riego por Cultivo (INIFAP/FIRA)

Los requerimientos hídricos teóricos (láminas netas recomendadas) para los cultivos tradicionales y potenciales se presentan en la siguiente tabla de referencia agronómica:

Cultivo	Tipo	Lámina (mm)	Ciclo (Días)
Alfalfa	Forraje (Perenne)	1,650	365
Nogal Pecanero	Frutal (Perenne)	1,350	365
Dátil	Frutal (Perenne)	1,850	365
Maíz Grano	Grano	800	150
Trigo Grano	Grano	650	160
Tomate Rojo	Hortaliza	725	140
Garbanzo Grano	Leguminosa	375	150

La tabla evidencia la gran brecha en el consumo de agua: cultivos perennes como la alfalfa, el nogal y el dátil demandan láminas anuales acumuladas de más de 1,350 mm a 1,850 mm. Al permanecer todo el año en el campo, consumen agua de forma continua, incluso en los meses de sequía más severa. Por otro

lado, granos como el trigo y el maíz requieren láminas sustanciales de 650 a 800 mm pero en periodos más acotados. Las alternativas como el garbanzo (375 mm) y hortalizas tecnificadas representan un consumo sustancialmente menor por ciclo, lo que los convierte en los candidatos ideales para la reconversión hídrica.

Balance de Déficit Hídrico Climatológico por Municipio

El déficit hídrico climatológico ($ET_o - P_{ef}$) representa la brecha física que la precipitación efectiva es incapaz de cubrir para satisfacer la demanda de evapotranspiración de referencia en el suelo.




Figura 11: Municipios con Mayor Déficit Hídrico Climatológico Anual (mm)

Déficit Hídrico Climatológico Promedio (ET0 - Pef) por Municipio - Sonora




Figura 12: Mapa de Distribución del Déficit Hídrico Climatológico

Los resultados cuantitativos demuestran que el municipio de Naco registra el mayor déficit con 1,240.24 mm anuales, seguido de cerca por Arizpe y Bacoachi. Este déficit tan pronunciado significa que para sostener cualquier cultivo en estas zonas, el agricultor debe extraer y bombear volúmenes enormes de agua de riego suplementario. Esto eleva los costos operativos y acelera el abatimiento local de los acuíferos. En municipios con déficits superiores a 1,000 mm, la reconversión hacia cultivos de bajo consumo es una necesidad ambiental imperiosa.

Dependencia de Riego vs. Lluvia (Fracción Azul vs. Verde)

Este análisis calcula la proporción de la evapotranspiración de los cultivos que se cubre con agua extraída de presas o acuíferos (fracción azul) en contraste con la fracción de agua de lluvia efectiva retenida en el suelo (fracción verde).




Figura 13: Dependencia de Riego (Fracción Azul) vs. Lluvia (Fracción Verde)

La fracción azul supera el 90% en la gran mayoría de los municipios de la planicie costera e hiperáridos de Sonora, lo cual ratifica que la agricultura estatal tiene una dependencia casi absoluta de las fuentes de extracción física y de la infraestructura hidráulica. Esto confirma que la sustentabilidad de la agricultura está ligada a reducir la huella hídrica azul mediante la reconversión productiva hacia cultivos de menores láminas, disminuyendo la presión sobre presas y acuíferos.

Presión Hídrica por Concesiones de Extracción (REPNA)

El análisis de los títulos de concesión del REPNA otorgados por la CONAGUA revela la severa presión de extracción que ejerce la agricultura comercial sobre las cuencas e infraestructura hidráulica del estado. El caso más crítico es el de la región del **DDR Hermosillo (Costa de Hermosillo DR-051)**, cuyos títulos agrícolas autorizan una extracción superior a los **320 millones de metros cúbicos anuales**. Este volumen es extraído en su totalidad de fuentes subterráneas, lo que ha provocado un grave fenómeno de intrusión salina del Golfo de California en el acuífero de la Costa de Hermosillo. Cruzar este volumen concesionado con una recurrencia de sequía de 16.8% en el mismo distrito justifica la urgencia legal y física de aplicar reconversión hacia cultivos eficientes que consuman solo una fracción de su título original.

Evolución del Volumen Bruto por Distrito de Riego (1998-2024)

Para complementar la presión legal (concesiones), se analizó la serie histórica de volúmenes brutos de agua superficial y subterránea efectivamente desviados para riego agrícola en los cinco Distritos de Riego (DR) de Sonora.




Figura 14: Evolución del Volumen Bruto de Riego por DR en Sonora (1998-2024)

El gráfico temporal muestra que el **DR-041 Río Yaqui** domina el consumo estatal, registrando consumos brutos de agua de hasta 2,400 Mm³ en años favorables. Sin embargo, muestra una alta vulnerabilidad ante sequías severas; por ejemplo, en 2004, el volumen disponible colapsó a solo 454 Mm³, obligando a reducir drásticamente el área sembrada de trigo y maíz y provocando una crisis económica regional. Por su parte, el **DR-051 Costa de Hermosillo** extrae de manera constante entre 350 y 500 Mm³/año de pozos profundos, sin variabilidad interanual, lo que confirma una presión constante e independiente del clima que acelera la sobreexplotación del acuífero.

Volumen Total Acumulado por Distrito de Riego

Este gráfico apilado acumula los volúmenes anuales desviados por los cinco distritos, dimensionando la demanda hídrica conjunta de la agricultura comercial en el estado.




Figura 15: Volumen Total de Agua Agrícola Acumulado por DR en Sonora

La demanda total acumulada de la agricultura en distritos de riego oscila entre los 2,000 y 4,500 Mm³ de agua bruta anuales. Frente a esta escala de consumo, una reducción de apenas el 10% en el consumo hídrico mediante la reconversión y tecnificación agrícola liberaría entre 200 y 450 millones de metros cúbicos anuales. Este volumen recuperado equivale al consumo total de agua potable de todas las áreas urbanas del estado de Sonora durante un año, demostrando el impacto social y ecológico que tiene la reconversión productiva.

Índice Compuesto de Vulnerabilidad Hídrica Municipal (IVH)

Con el fin de consolidar los 13 indicadores previos en una herramienta única y operativa de planeación y priorización de políticas públicas, se desarrolló el **Índice de Vulnerabilidad Hídrica (IVH)**. Este indicador pondera y normaliza los factores climáticos, geográficos y agrícolas del estado:

Componente	Peso	Fuente
Déficit Hídrico Climatológico ($ET_o - P_{ef}$)	0.35	NASA POWER
Vulnerabilidad ISAG (sequía acumulada)	0.20	MSM / SMN
Dependencia de Riego (fracción azul)	0.35	Modelo HH
Estrés Térmico (calor + helada)	0.10	NASA POWER

El IVH clasifica a los municipios en cuatro categorías:

- **Crítica** ($IVH \geq 0.70$): Prioridad de reconversión inmediata y total.
- **Alta** ($0.50 \leq IVH < 0.70$): Intervención prioritaria y tecnificación.
- **Moderada** ($0.30 \leq IVH < 0.50$): Manejable con rotación de cultivos.
- **Baja** ($IVH < 0.30$): Zonas hídricamente estables.

Mapa de Vulnerabilidad Hídrica Integral

Índice Compuesto de Vulnerabilidad Hídrica Municipal — Sonora




Figura 16: Índice Compuesto de Vulnerabilidad Hídrica Municipal (IVH)

El mapa muestra un claro gradiente de vulnerabilidad que se intensifica del este al oeste. Los municipios de la sierra (como Yécora, Quiriego, Álamos) mostraban niveles bajos o moderados debido a las mayores precipitaciones. En contraste, la planicie costera (Hermosillo, Guaymas, Cajeme) y el desierto de Caborca y San Luis Río Colorado presentan vulnerabilidades críticas y altas debido a la escasez pluvial y la alta dependencia de agua subterránea o superficial para riego.

Ranking de Municipios por Vulnerabilidad Hídrica




Figura 17: Top 15 Municipios con Mayor Vulnerabilidad Hídrica (IVH)

El ranking individualiza los 15 municipios con mayores valores de IVH en el estado, encabezados por San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Plutarco Elías Calles, Hermosillo y Caborca. Estos municipios superan el umbral crítico de 0.70 o se sitúan en la zona de alta vulnerabilidad. Esto indica que cualquier política de reconversión productiva o restricción agrícola debe iniciarse de manera focalizada en estas demarcaciones para maximizar el impacto de ahorro de agua.

Desglose por Componente del Índice




Figura 18: Desglose de Vulnerabilidad por Componente — Top 5 Municipios

El desglose por componente revela la causa raíz de la vulnerabilidad, permitiendo diseñar estrategias personalizadas («trajes a la medida»):

- En **San Luis Río Colorado**, la vulnerabilidad proviene casi por completo del déficit hídrico extremo de su clima desértico.
- En **Hermosillo**, la vulnerabilidad es impulsada principalmente por la altísima dependencia de riego (agua azul) sobre un acuífero ya sobreexplotado, combinada con el impacto acumulado del ISAG.

Esto justifica que en San Luis Río Colorado la solución sea buscar especies rústicas que no requieran agua, mientras que en Hermosillo se debe tecnificar drásticamente el riego (goteo, mallas) o cambiar alfalfa/nogal por cultivos hortícolas rápidos.