



Universidad Autónoma de Nuevo León

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS

TAREA 1

Ecuaciones de movimiento

Autores:

Jesús Eduardo Loera Casas 1898887

Cesar Efrén Valladares Rocha 1841555

Vrani Chavez Islas 1990044

24 de febrero de 2021

Índice

1. Problema del oscilador armónico	1
2. Solución	1
3. Ecuaciones de movimiento	2

Resumen

En este documento nuestro equipo presenta la tarea 2 del curso de mecánica teórica, donde planteamos el problema del oscilador armónico y encontramos sus ecuaciones de movimiento.

1. Problema del oscilador armónico

Encontrar las ecuaciones de movimiento y velocidad respecto al tiempo de un oscilador armónico simple.

Por segunda ley de Newton:

$$F = ma$$

$$-kx = m\ddot{x}$$

Donde tenemos la siguiente igualdad $\omega_0^2 = \frac{k}{m}$, entonces:

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

2. Solución

Solución.

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega_0^2 x = 0$$

Observación: $\frac{d^2x}{dt^2} + \omega_0^2 x = 0$ es una ecuación diferencial lineal no homogénea de orden dos con coeficientes constantes.

Identificamos la ecuación característica: $m^2 + \omega_0^2 = 0$

Ahora buscamos despejar para m:

$$m^2 + \omega_0^2 = 0$$

$$m^2 = -\omega_0^2$$

$$\Rightarrow m = 0 \pm \omega_0 i$$

Observación: Hemos obtenido raíces complejas conjugadas.

Identificamos $a = 0$ y $b = \omega$, la solución general de la ecuación diferencial es de la forma:

$$x_g(t) = C_1 e^{at} \cos(bt) + C_2 e^{at} \sin(bt)$$

Sustituyendo a y b:

$$x_g(t) = C_1 e^{(0)t} \cos((\omega_0)t) + C_2 e^{(0)t} \sin((\omega_0)t)$$

$$x_g(t) = C_1(1) \cos(\omega_0 t) + C_2(1) \sin(\omega_0 t)$$

$$\Rightarrow x_g(t) = C_1 \cos(\omega_0 t) + C_2 \sin(\omega_0 t)$$

3. Ecuaciones de movimiento

Por lo tanto la ecuación del movimiento del oscilador armónico simple es:

- $x(t) = C_1 \cos(\omega_0 t) + C_2 \sin(\omega_0 t)$

Que puede reescribirse como:

- $x(t) = A \cos(\omega_0 t - \phi)$

- $x(t) = A \sin(\omega_0 t - \delta)$