

# Diseño y Análisis de Algoritmos. Problema 1: El Zoológico

Jesús Santos Capote y Kenny Villalobos Morales

Facultad de Matemática y Computación, Universidad de La Habana, La Habana,  
Cuba

## 1. Definición del Problema

En un zoológico un poco especial, se separa a los animales en dos hábitats diferentes de manera general. El hábitat para la reproducción solo acepta animales de la misma especie, mientras que el hábitat para la maduración admite animales de distintas especies, pero no de géneros distintos. El zoológico está pasando por una remodelación, ya que va a recibir  $n$  especies distintas de animales, cada una con un número 'a' de hembras y 'b' de machos, que puede ser distinto entre cada especie. En la remodelación se está pensando en construir salas de exhibición de los animales. Cada una se construirá para ser un hábitat de reproducción o de maduración, y cada sala podrá soportar un máximo de  $k$  animales, lo cual es igual para todas las salas. Como el zoológico necesita ser rentable y cada sala se cobra por separado, se quiere construir el máximo número posible de salas que cumplan con los requerimientos planteados y que, además, estén llenas de animales para el disfrute de los visitantes. ¿Cuántas salas deberá construir el zoológico?

## 2. Modelación del Problema

Se tiene una matriz de dimensión  $2 * n$ , donde cada casilla contiene números enteros. El problema consiste en hallar la cantidad máxima de grupos de tamaño  $k$  que se pueden formar, donde cada elemento de un grupo es una unidad perteneciente a una casilla de la matriz. Además, todos los elementos de un grupo deben pertenecer a casillas de una misma fila o de una misma columna de la matriz.

## 3. Primera Aproximación

Como primera solución se propone aplanar la matriz de entrada para obtener una lista de  $T$  elementos, siendo  $T$  la suma de todos los elementos de la matriz, donde en cada posición hay un animal. Los animales son modelados como una clase *Animal* que tiene dos atributos: *gender*, fila a la que pertenece en la matriz (género), y *specie*, columna a la que pertenece en la matriz (especie). Luego generar todas las permutaciones de la matriz aplanada y por cada una dividirla mediante índices en porciones de tamaño  $k$ , contar cuantas de estas porciones son grupos válidos y actualizar, de ser necesario, el máximo;

### 3.1. Optimalidad

Sea  $S = [a_1, a_2, \dots, a_T]$  una distribución de los animales de la matriz aplanada, tal que la cantidad de porciones de tamaño  $k$  que se pueden formar a partir de ella, que cumplen las restricciones del problema, sea máxima. Esta distribución  $S$  es una permutación de los elementos de la matriz aplanada. El algoritmo propuesto revisa todas las permutaciones de la matriz aplanada y calcula la cantidad de grupos factibles, por tanto, revisa a  $S$ . Luego el algoritmo encuentra la respuesta óptima.

### 3.2. Complejidad Temporal

Aplanar la matriz tiene costo  $O(T)$  donde  $T$  es la cantidad de animales. Computar todas las permutaciones de una lista de tamaño  $T$  tiene un costo  $O(T!)$ . La comprobación de cuántos grupos factibles contiene una permutación de  $T$  elementos tiene complejidad  $O(T)$  y esta comprobación se realiza para cada permutación. Luego por el teorema de la multiplicación contar cuantos grupos factibles tiene cada permutación tiene complejidad  $O(T * T!)$ . Luego el algoritmo tiene complejidad  $O(T + T * T! + T)$  y por el teorema de la suma, la complejidad final es  $O(T * T!)$ .

## 4. Segunda Aproximación

Demostremos que existe un óptimo que solo usa un grupo columna a lo sumo por columna:

Sea  $a_i$  y  $b_i$  los elementos de la columna  $i$ . Sea  $a_i + b_i = c$ .

$$c = p_c * k + r_c, \quad r_c < k$$

$p_c$ , es la cantidad de grupos columna que se pueden formar en la columna  $i$ .

$$a_i = p_a * k + r_a, \quad r_a < k$$

$p_a$ , es la cantidad de grupos fila que se pueden formar solo con los elementos de  $a_i$ .

$$b_i = p_b * k + r_b, \quad r_b < k$$

$p_b$ , es la cantidad de grupos fila que se pueden formar solo con los elementos de  $b_i$ . Por tanto:

$$c = a_i + b_i = p_a * k + p_b * k + r_a + r_b, \quad r_a < k, r_b < k$$

$$c = (p_a + p_b) * k + r_a + r_b$$

con  $r_a + r_b < 2k$ .

Si  $r_a + r_b < k$  entonces por el algoritmo de división, la cantidad de grupos que se pueden formar en la columna  $i$ ,  $\lfloor \frac{c}{k} \rfloor$ , es igual a la suma de  $p_a$  (cantidad de grupos que se pueden formar solo con los elementos de  $a_i$ ) mas  $p_b$  (cantidad de grupos que se pueden formar solo con los elementos de  $b_i$ ). Es decir, para este caso, con formar solo grupos filas con los elementos de  $a_i$  y  $b_i$  se iguala la cantidad de grupos columnas que se pueden formar en la columna  $i$ .

Si  $k \leq r_a + r_b < 2k$  entonces  $r_a + r_b = r' + k$  con  $r' < k$ , luego:

$$c = (p_a + p_b) * k + r' + k$$

$$c = (p_a + p_b + 1) * k + r', \quad r' < k$$

Esto significa que, por el algoritmo de división, la cantidad de grupos que se pueden formar en la columna  $i$ ,  $\lfloor \frac{c}{k} \rfloor$ , es igual a la suma de  $p_a$  (cantidad de grupos que se pueden formar solo con los elementos de  $a_i$ ) mas  $p_b$  (cantidad de grupos que se pueden formar solo con los elementos de  $b_i$ ) mas uno. Es decir, la cantidad de grupos  $p_c$  que se pueden formar en una columna es igual a la cantidad  $p_a + p_b + 1$  a lo sumo, con formar solo grupo filas con los elementos de  $a_i$  y  $b_i$  obtengo la cantidad máxima de grupos menos uno.

Por lo dicho anteriormente existe un óptimo que tiene a lo sumo un grupo con elementos pertenecientes a una misma columna  $i$  para cada  $i$ .

#### 4.1. Explicación del Algoritmo

Partiendo de que solo se necesita tomar un grupo columna por columna a lo sumo y tomar el resto como grupos fila, el algoritmo para cada forma de seleccionar columnas prueba todas las formas de crear un grupo columna en cada columna seleccionada. Luego de tener un conjunto de columnas seleccionadas y una forma de crear grupos columna fijada se calcula la cantidad de grupos filas que se pueden formar y se suma a la cantidad de grupos columnas que se crearon. El retorno del algoritmo sera el mayor número computado de esta forma, que corresponde al número máximo de grupos que se pueden crear cumpliendo las restricciones del problema.

#### 4.2. Complejidad Temporal

### 5. Tercera Aproximación

Sea  $M = \sum_{i=0}^n \text{matriz}[0, i]$ ,  $F = \sum_{i=0}^n \text{matriz}[1, i]$  y  $T = M + F$ .

Sabemos que la cantidad máxima de grupos que se pueden formar es  $\lfloor \frac{T}{k} \rfloor$ . Para toda posible entrada de datos del problema, la solución es mayor o igual que  $\lfloor \frac{T}{k} \rfloor - 1$ . Demostremos esto:

Cumpliendo con las restricciones del problema, siempre es posible formar  $\lfloor \frac{M}{k} \rfloor = p_1 + \lfloor \frac{F}{k} \rfloor = p_2$  grupos factibles, donde cada unidad de los grupos pertenece a una misma fila, quedando  $r_1$  y  $r_2$  elementos residuales en cada fila respectivamente. Luego:

$$M = p_1 * k + r_1, \quad r_1 < k$$

$$F = p_2 * k + r_2, \quad r_2 < k$$

$$T = M + F = p_1 * k + p_2 * k + r_1 + r_2$$

Como  $r_1, r_2 < k$ , entonces  $r_1 + r_2 < 2k$ . Luego, si  $r_1 + r_2 < k$ , tomando  $r_3 = r_1 + r_2$ , se cumple que:

$$T = (p_1 + p_2)k + r_3, \quad r_3 < k$$

$$\text{Luego } \lfloor \frac{T}{k} \rfloor = p_1 + p_2 = \lfloor \frac{M}{k} \rfloor + \lfloor \frac{F}{k} \rfloor$$

Si  $r_1 + r_2$  no es menor que  $k$  entonces  $r_1 + r_2 \geq k$ , entonces  $r_1 + r_2 = r_3 + k$  con  $r_3 < k$ . Luego se cumple que:

$$T = (p_1 + p_2)k + k + r_3 = (p_1 + p_2 + 1)k + r_3$$

$$\text{Luego } \lfloor \frac{T}{k} \rfloor = p_1 + p_2 + 1 \text{ entonces } \lfloor \frac{T}{k} \rfloor - 1 = p_1 + p_2 = \lfloor \frac{M}{k} \rfloor + \lfloor \frac{F}{k} \rfloor$$

Para el caso en que  $r_1 + r_2 < k$ , como  $\lfloor \frac{T}{k} \rfloor = p_1 + p_2$  esta solución es factible y óptima.

Para el caso en que  $r_1 + r_2 \geq k$ ,  $p_1 + p_2 = \lfloor \frac{T}{k} \rfloor - 1$  es la solución óptima si no es posible crear grupos con elementos pertenecientes a una misma columna.

En otro caso, en el que existe  $i$  tal que  $a_i + b_i \geq k$ ,  $p_1 + p_2$  no se garantiza, de momento, que sea una solución óptima. Se podría buscar  $i$  tal que  $\min(a_i, r_1) + \min(b_i, r_2) \geq k$ , para este caso bastaría con asignar el resto de cada fila a  $a_i$  y  $b_i$  respectivamente con ello se formaría un grupo más con elementos pertenecientes a una misma columna, sin disminuir la cantidad  $p_1 + p_2$  de grupos que se pueden formar, logrando crear  $p_1 + p_2 + 1$  grupos que es un resultado óptimo.

Pero de no existir dicho  $i$  no se garantiza aún que  $p_1 + p_2$  sea un resultado óptimo, cabe la posibilidad de que dejando de crear  $m$  grupos con elementos pertenecientes a una misma fila se pudiesen formar  $m + 1$  grupos con elementos pertenecientes a una misma columna. Nótese que para las columnas  $i$  tal que  $a_i + b_i < k$  los elementos de  $a_i$  y  $b_i$  solo pueden ser utilizados para formar grupos de elementos pertenecientes a una misma fila.

Esto se puede ver como el siguiente subproblema:

Se tiene una submatriz de la matriz  $A$  de entrada donde solo están las columnas  $i$  pertenecientes a  $A$  tal que  $A[0, i] + A[1, i] \geq k$ . Sea  $r_1 = M - p_1 * k$  y  $r_2 = F - p_2 * k$ , tal que  $r_1, r_2 < k$  y  $r_1 + r_2 \geq k$  ( $p_1 + p_2 = \lfloor \frac{T}{k} \rfloor - 1$ ). ¿Es posible encontrar un conjunto de columnas  $S$  de tamaño  $m$  tal que pueda formar un grupo con elementos pertenecientes a una misma columna por cada columna en  $S$ , dejando de hacer  $m - 1$  grupos de elementos pertenecientes a una misma fila? ( $\lfloor \frac{T}{k} \rfloor = p_1 + p_2 + m - (m - 1)$ )

Anteriormente se demostró que existe un óptimo que solo usa un grupo columna a lo sumo por columna. Si existiese una solución  $S$  de este subproblema se debe cumplir que:

TODO: Especificar la composici' on del conjunto S de columnas son las columnas con lo que se utiliza de cada una de ellas para hacer el grupo en dicha columna

Siendo:

$$M' = M - \sum S[0, i]$$

$$F' = F - \sum S[1, i]$$

Entonces  $M' \% k + F' \% k < k$  pues:

$$T = |S| * k + \lfloor \frac{M'}{k} \rfloor * k + M' \% k + \lfloor \frac{F'}{k} \rfloor * k + F' \% k$$

$$T = (|S| + \lfloor \frac{M'}{k} \rfloor + \lfloor \frac{F'}{k} \rfloor) * k + M' \% k + F' \% k$$

Por lo que por el algoritmo de la divisi' on:  $|S| + \lfloor \frac{M'}{k} \rfloor + \lfloor \frac{F'}{k} \rfloor = \lfloor \frac{T}{k} \rfloor$

$$T = \lfloor \frac{T}{k} \rfloor * k + T \% k$$

N'otese que si  $M' \% k + F' \% k < k$ , entonces, adem' as,  $M' \% k + F' \% k = T \% k$

Por tanto, si existe una soluci' on S,  $M' \% k + F' \% k = T \% k$ .

Demostremos que  $M' \% k + F' \% k = T \% k \Leftrightarrow M' \% k \leq T \% k$ :

$\Rightarrow$

Supongamos con el fin de llegar a un absurdo que  $M' \% k > T \% k$ , entonces  $M' \% k + F' \% k > T \% k$ , contradicci' on, pues  $M' \% k + F' \% k = T \% k$ . Luego  $M' \% k \leq T \% k$

$\Leftarrow$

$$T = (|S| + \lfloor \frac{M'}{k} \rfloor + \lfloor \frac{F'}{k} \rfloor) * k + F' \% k + M' \% k$$

$$T \% k = ((|S| + \lfloor \frac{M'}{k} \rfloor + \lfloor \frac{F'}{k} \rfloor) * k + F' \% k + M' \% k) \% k$$

$$T \% k = (|S| + \lfloor \frac{M'}{k} \rfloor + \lfloor \frac{F'}{k} \rfloor) * k \% k + (F' \% k + M' \% k) \% k$$

$$T \% k = 0 + (F' \% k + M' \% k) \% k$$

$$T \% k = (F' \% k + M' \% k) \% k$$

Luego T y  $(F' \% k + M' \% k)$  son congruentes m'odulo k.

Si  $M' \% k \leq T \% k$  entonces  $F' \% k = T \% k - M' \% k + x * k$ . Como  $F' \% k < k$ , entonces  $x = 0$  y  $F' \% k = T \% k - M' \% k$ . Luego  $M' \% k + F' \% k = T \% k$

Por tanto si existiese una soluci' on S se debe cumplir que

$$(M - \sum S[0, i]) \% k \leq T \% k$$

$$M \% k - T \% k \leq (\sum S[0, i]) \% k$$

y además como  $(M - \sum S[0, i]) \geq 0$

$$M \% k \geq \sum S[0, i] \% k$$

entonces se cumple que:

$$M \% k - T \% k \leq (\sum S[0, i]) \% k \leq M \% k$$

Luego la solución del