

Sección 3.2

Gráficas de funciones polinómicas



Universidad de Puerto Rico
Recinto Universitario de Mayagüez
Facultad de Artes y Ciencias
Departamento de Ciencias Matemáticas

Contenido

1 Ceros reales y su multiplicidad


2 Máximos y mínimos

En la sección anterior se analizó el comportamiento de las funciones polinómicas cuando $x \rightarrow \infty$ y cuando $x \rightarrow -\infty$. Ahora se consideran algunas propiedades adicionales que ayudarán a graficar las funciones polinómicas.

Ceros reales y su multiplicidad

Considere la siguiente gráfica de la función polinómica

$$f(x) = x^4 - 5x^3 + 3x^2 + 5x - 4$$



Note que la gráfica de f tiene tres interceptos en el eje x .

Se observa que la gráfica *cruza* el eje x en los valores -1 y 4 , además *toca* el eje x en el valor 1 . Como consecuencia de eso, la gráfica entre dos interceptos consecutivos está arriba del eje x o debajo del mismo.

Si se factoriza completamente la función f es fácil hallar los interceptos en x de la gráfica, resolviendo la ecuación $f(x) = 0$.

Cero real de un polinomio

Si f es una función polinómica y c es un número real para el cual $f(c) = 0$, se dice que c es un **cero real** de la función f .

Como consecuencia de esta definición, se puede observar que si c es un cero real de una función f , entonces c es un intercepto en x de la gráfica de f . Más aún, se puede demostrar que $x - c$ es un factor de $f(x)$.

Propiedades de los ceros reales de un polinomio

Sea f un polinomio. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- 1 El número c es una raíz o solución de la ecuación $f(x) = 0$.
- 2 El número c es un cero real de f .
- 3 El número c es un intercepto de la gráfica de f con el eje x .
- 4 El término $x - c$ es un factor de f .

Ejemplo

Encuentre un polinomio de grado 3 cuyos ceros son -2 , 3 y 6 .

Multiplicidad de un cero

Si f es una función polinómica y $x - c$ es un factor de f que aparece exactamente k veces, es decir, k es el mayor entero positivo para el cual $(x - c)^k$ es factor de f , se dice que c es un **cero de multiplicidad k** .

Ejemplo

Determine los ceros de $f(x) = x^4 + 3x^3 - 4x^2$ y su multiplicidad.

Si c es un cero de la función $f(x)$, entonces para trazar la gráfica de f es importante analizar su comportamiento para valores de x cercanos a c , ya sea por la izquierda o por la derecha.

Si el cero es de multiplicidad par, entonces el signo de $f(x)$ no cambia al considerar valores de x cercanos a c , por la derecha o por la izquierda. Por lo tanto, la gráfica de f *toca* pero no cruza el eje x en el valor c .

Si el cero es de multiplicidad impar, entonces $f(x)$ sí cambia de signo al considerar valores de x cercanos a c por ambos lados. Por lo tanto, en este caso la gráfica de f sí cruza el eje x .

En resumen, se tiene el siguiente resultado:


Comportamiento cerca de los ceros

Sea c un cero real con multiplicidad k de una función polinomial f .

- Si k es par, entonces la gráfica de f toca, pero no cruza el eje x en c .
- Si k es impar, entonces la gráfica de f cruza el eje x en c .

Ejemplo


Graficar $f(x) = x(x - 1)^2(x - 3)$.



Máximos y mínimos

Considere la siguiente gráfica de la función polinómica

$$f(x) = -\frac{1}{4}x^4 + 2x^3 - \frac{7}{2}x^2 - 2x + \frac{15}{4}$$



Observe que la gráfica corta el eje x en 4 puntos distintos, los cuales dividen el eje x en cinco intervalos.

A la izquierda de -1 la función crece de manera continua y a la derecha de 5 la función decrece de forma continua. Además, en cada uno de los tres intervalos que están entre -1 y 5 , la función debe tener un máximo o un mínimo local. En este ejemplo, la función polinómica es de grado 4 y tiene 3 máximos o mínimos locales.

De forma general, se tiene la siguiente propiedad:

Máximos y mínimos locales de una función polinómica

La gráfica de una función polinómica de grado n puede tener a lo más $n - 1$ máximos o mínimos locales.

Ejemplos

1. En cada una de las siguientes gráficas de polinomios indique cuál es el grado menor del polinomio.




Figura A




Figura B

2. Seleccione la gráfica que mejor represente la función

$$f(x) = -2x^5 + x^4 - 3x^2 + x - 2$$




Figura C




Figura D

Ahora se resumen las propiedades de las funciones polinómicas que facilitan el trazado de sus gráficas.

Propiedades de las gráficas de funciones polinómicas


Sea $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$, donde $a_n \neq 0$ y $n \geq 2$.

- La gráfica de f es una curva suave y continua.
- El mayor número de máximos y mínimos locales es $n - 1$.
- La función tiene a lo sumo n ceros reales, es decir, intercepta al eje x en a lo más n puntos.
- En un cero de multiplicidad par, la gráfica toca el eje x pero no lo cruza.
- En un cero de multiplicidad impar, la gráfica cruza el eje x .
- Entre dos ceros consecutivos, la gráfica está encima del eje x o debajo del eje x .
- En los extremos (para valores grandes de x , positivos y negativos), la gráfica se comporta como la gráfica de $y = a_n x^n$.

El siguiente teorema es un hecho importante que a veces puede ayudar a graficar una función polinómica.

Teorema del valor intermedio

Si f es una función polinómica donde $f(a)$ y $f(b)$ tienen signos opuestos, entonces existe al menos un cero real de f en el intervalo (a, b) , es decir, existe un valor c entre a y b donde $f(c) = 0$.



Guía para graficar funciones polinómicas

- 1 Determine el comportamiento en los extremos de la gráfica, analizando la forma del término líder $a_n x^n$.
- 2 Halle los ceros de la función así como su multiplicidad. Los ceros coinciden con los interceptos en x . La multiplicidad de los ceros reales se usa para determinar si la gráfica cruza o solamente toca el eje x en esos valores.
- 3 Se usa la información anterior para realizar un bosquejo de las partes importantes de la gráfica.
- 4 De ser necesario, puede determinar si la gráfica está por encima o por debajo del eje x entre dos ceros consecutivos, eligiendo un valor de prueba en ese intervalo y evaluando la función en ese valor. Si el resultado es positivo, la gráfica está por encima del eje x , y si es negativo está por debajo del eje x .
- 5 Puede analizar la cantidad de máximos y mínimos locales usando el grado del polinomio, para verificar que no haya algún error con su gráfica.

Ejemplo

Graficar la función $f(x) = \frac{1}{2}(2x - 1)(x + 2)^2(x - 2)$.

