

Conjuntos Numéricos y sus Propiedades Algebraicas

Prof. Jhon Fredy Tavera Bucurú

2025

Contenido

Números Reales

Números Naturales

Números Enteros

Números Racionales

Conjunto de los números naturales, se construye con la siguiente regla

1. 1 es natural
2. Si n es natural entonces $n + 1$ es natural

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$$



El conjunto de los enteros constan de los números naturales junto con sus negativos y 0:

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$$

Si en una recta definimos un punto como el cero, y escogemos una unidad de medida, creamos puntos equidistantes, asociando a la derecha del cero ordenadamente los números naturales y a la izquierda sus negativos, podemos representar los números enteros gráficamente.

Números Reales (\mathbb{R})

Podemos entender los números reales como aquellos que pueden representarse como un punto en la recta numérica.




Representación decimal

Sea x un número real

1. Si x coincide con una marca entera n , su escritura decimal es n seguida de ceros.
2. Si no es entero: ubica los dos enteros consecutivos cuyas marcas encierran a x ; llama n al menor. Divide el tramo entre esas marcas en 10 partes iguales, numeradas 0–9 desde n . La parte que contiene a x determina d_1 .
3. Dentro de esa parte, vuelve a dividir en 10 partes iguales y numéralas 0–9 desde el extremo junto a n ; la que contiene a x determina d_2 . Repite indefinidamente para d_3, d_4, \dots
4. Si en algún paso x cae exactamente en una marca de subdivisión, detén el proceso y completa con ceros. Decimos que tiene representación finita.

Resultado: la expresión decimal es $n.d_1d_2d_3\dots$. Si x es negativo, aplica el procedimiento a su distancia a 0 y antepone “–”. (Se elige siempre la versión que termina en ceros.)

- ▶ Los **números racionales** (\mathbb{Q}) tienen una representación decimal finita o periódica. Ejemplo: 0.75 , $0.\overline{3}$, $0.14\overline{6}$... etc.
- ▶ Los **números irracionales** (\mathbb{I}) tienen una representación decimal infinita y no periódica, como $\pi = 3.14159265 \dots$ o $\sqrt{2} = 1.41421356 \dots$ etc.



Pertenecer y Estar Contenido

- ▶ **Pertenecer** (\in): Un elemento pertenece a un conjunto si está incluido en él. Por ejemplo, $3 \in \mathbb{N}$, $\frac{2}{3} \in \mathbb{Q}$, $\frac{2}{3} \notin \mathbb{N}$.
- ▶ **Estar Contenido** (\subseteq): Un conjunto A está contenido en un conjunto B si todos los elementos de A también son elementos de B . Por ejemplo, $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$.

Definición (Números Reales)

Los números reales son un cuerpo ordenado y completo

Axiomas de Cuerpo $(F, +, \cdot)$

Estructura aditiva $(F, +)$

- ▶ **Clausura:**
 $a, b \in F \Rightarrow a + b \in F.$
- ▶ **Asociatividad:**
 $(a + b) + c = a + (b + c).$
- ▶ **Conmutatividad:**
 $a + b = b + a.$
- ▶ **Neutro aditivo:** existe $0 \in F$ tal que $a + 0 = a.$
- ▶ **Inverso aditivo:** para todo $a \in F$ existe $-a \in F$ con $a + (-a) = 0.$

Estructura multiplicativa $(F \setminus \{0\}, \cdot)$

- ▶ **Clausura:** $a, b \in F \Rightarrow a \cdot b \in F.$
- ▶ **Asociatividad:**
 $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c).$
- ▶ **Conmutatividad:** $a \cdot b = b \cdot a.$
- ▶ **Neutro multiplicativo:** existe $1 \in F$ tal que $a \cdot 1 = a$ y $1 \neq 0.$
- ▶ **Inverso multiplicativo:** para todo $a \in F \setminus \{0\}$ existe $a^{-1} \in F$ con $a \cdot a^{-1} = 1.$ Decimos que

$$a^{-1} := \frac{1}{a}$$

Vinculación suma–producto

- ▶ **Distributividad:** $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ y $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c.$

Definición

Sean a, b números enteros. Si existe un número entero k tal que $b = a \cdot k$. Decimos que a es un divisor de b y que b es un múltiplo de a .

Ejemplo: Los divisores positivos de 12 son: 1, 2, 3, 4, 6, 12.

Ejemplo: Los múltiplos positivos de 12 son: 12, 24, 36, 48, ...

Máximo común divisor (MCD): mayor entero que divide a todos.

Ej.: $\text{MCD}(24, 36) = 12$. Además

$$\text{MCD}(\text{MCD}(a, b), c) = \text{MCD}(a, b, c)$$

Mínimo común múltiplo (m.c.m.): menor entero positivo múltiplo de todos. Ej.: $\text{mcm}(8, 12) = 24$. Además

$$\text{mcm}(\text{mcm}(a, b), c) = \text{mcm}(a, b, c)$$

Definición: Un número primo es un número natural mayor que 1 que solo tiene dos divisores: 1 y él mismo.

Ejemplo: Los primeros 10 números primos son:

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29.

Existen infinitos números primos

Teorema (Teorema Fundamental de la Aritmética)

Todo número natural mayor que 1 puede descomponerse de manera única como un producto de números primos, salvo el orden de los factores.

Ejemplo:

► $60 = 2^2 \times 3 \times 5$

► $84 = 2^2 \times 3 \times 7$

Números Enteros (\mathbb{Z})

- ▶ **Definición:** Los números enteros incluyen los números naturales, sus opuestos y el cero.
- ▶ **Ejemplos:** $\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots$
- ▶ **Usos:** Representar ganancias y pérdidas, temperaturas bajo cero, etc.

- ▶ $(-1) \cdot a = -a$ para todo $a \in \mathbb{R}$.
- ▶ $-(-a) = a$.
- ▶ $(-a) \cdot b = a \cdot (-b) = -(a \cdot b)$.
- ▶ $a - b = a + (-b)$.
- ▶ $-(a + b) = -a - b, \quad -(a - b) = -a + b$.

Números Racionales (\mathbb{Q})

Definición

Los números racionales son aquellos que pueden expresarse como una división de dos enteros, con denominador (el que divide) distinto de cero.

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} : a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0 \right\}$$

- ▶ **Definición:**
- ▶ **Ejemplos:** $\frac{1}{2}$, $-\frac{3}{4}$, $\frac{-51}{7}$, $\frac{2}{-9}$ etc
- ▶ **Usos:** Fracciones, porcentajes, razones, etc.

Signo Negativo en Fracciones

Propiedad: En una fracción, el signo negativo puede estar:

- ▶ En el numerador.
- ▶ En el denominador.
- ▶ Delante de toda la fracción.

$$\frac{-a}{b} = -\frac{a}{b} = \frac{a}{-b} \quad (b \neq 0)$$

Ej.:

$$\frac{-3}{4} = -\frac{3}{4} = \frac{3}{-4}$$

Todas representan el mismo número racional negativo.

Suma de Fracciones con el Mismo Denominador

Definición: Para sumar fracciones con el mismo denominador, sumamos los numeradores y conservamos el denominador.

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a + b}{c}$$

Ejemplo:

$$\left(\frac{2}{5} + \frac{3}{5}\right) + \frac{7}{5} = \frac{(2 + 3) + 7}{5} = \frac{12}{5}$$

Multiplicación de Fracciones

Definición: Para multiplicar fracciones, multiplicamos los numeradores y los denominadores.

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$$

Ejemplo:

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} = \frac{2 \cdot 4}{3 \cdot 5} = \frac{8}{15}$$

Observación: Es usado en porcentajes, escalas, razones y proporciones, conversiones etc...

Fracciones Equivalentes

Definición: Dos fracciones son *equivalentes* si representan el mismo valor numérico, aunque tengan numeradores y denominadores diferentes.

$$\frac{ak}{bk} = \frac{a}{b} \cdot \frac{k}{k} = \frac{a}{b} \cdot 1 = \frac{a}{b}, \quad (b \neq 0, k \neq 0)$$

Ej.:

$$\frac{2 \cdot 3}{5 \cdot 3} = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}$$

Aquí, $k = 3$ y $\frac{k}{k} = 1$, por lo que la fracción no cambia su valor.

División de Fracciones

División: Multiplicamos por el recíproco.

$$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc} \quad (b, c, d \neq 0)$$

Ley de extremos y medios: En el producto de fracciones, los *extremos* son a y d , y los *medios* son b y c .

Ej.:

$$\frac{\frac{5}{6}}{\frac{3}{4}} = \frac{5}{6} \cdot \frac{4}{3} = \frac{5 \times 4}{6 \times 3} = \frac{20}{18} = \frac{10}{9}.$$

Aquí 5 y 4 son los **extremos**, mientras que 6 y 3 son los **medios**.

Suma de Fracciones con Distinto Denominador

Procedimiento:

1. Hallar el **mínimo común múltiplo** (MCM) de los denominadores.
2. Convertir cada fracción a una equivalente con ese denominador.
3. Sumar los numeradores y mantener el denominador común.

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{a \cdot \frac{\text{MCM}}{b}}{\text{MCM}} + \frac{c \cdot \frac{\text{MCM}}{d}}{\text{MCM}}$$

Ejemplo: Sumar

$$\frac{1}{3} + \frac{2}{5} + \frac{3}{4} + \frac{5}{6}$$

1. MCM de 3, 5, 4, 6 es 60.
2. Fracciones equivalentes:

$$\frac{1}{3} = \frac{20}{60}, \quad \frac{2}{5} = \frac{24}{60}, \quad \frac{3}{4} = \frac{45}{60}, \quad \frac{5}{6} = \frac{50}{60}$$

3. Suma:

$$\frac{20}{60} + \frac{24}{60} + \frac{45}{60} + \frac{50}{60} = \frac{139}{60}$$

4. Resultado final:

$$\frac{139}{60} = 2 + \frac{19}{60} = 2\frac{19}{60}$$

Ejercicios

1. Un rectángulo de área 160 m^2 es dividido en 4 partes, de modo que:
 - ▶ La primera parte es el 15% del área del rectángulo
 - ▶ La segunda parte es el 30% del área del rectángulo
 - ▶ La tercera parte son las dos terceras partes de la primera parte
 - ▶ Determine el área de la cuarta parte en mm^2 .

¿Cuál es el área de cada una de las 4 partes?
2. La distancia entre dos puntos en un plano a escala 1:250 es de 3,5 cm. Determine la distancia real y exprésela en términos de jemes, una medida tradicional de aproximadamente 13 cm. y brazas una medida tradicional de aproximadamente 167 cm

Simplifique la siguiente expresión:

$$\frac{\left[\left(\frac{\frac{2}{3} + \frac{-3}{4} - \frac{5}{6} + \frac{7}{12}}{\left(\frac{7}{8} \cdot \frac{2}{5} \right) - \left(\frac{9}{10} - \frac{1}{2} \right)} \right) - \left(\frac{5}{3} - 1\frac{1}{6} \right) \right] \cdot \frac{3}{7} - \left(\frac{-11}{12} - \frac{5}{18} \right)}{\left(1 - \left[\frac{4}{9} - \frac{1}{3} + \frac{1}{6} \right] \right)}.$$