
1. Ground-state preparation
Strong-coupling vacuum, $|\Omega\rangle_0$
$|0\rangle_{f_0}$
$|0\rangle_{b_0}$
$|1\rangle_{f_1}$
$|0\rangle_{b_1}$
$|0\rangle_{f_2}$
$|0\rangle_{b_2}$
$|1\rangle_{f_3}$
$|0\rangle_{b_3}$
$|0\rangle_{f_4}$
$|0\rangle_{b_4}$
$|1\rangle_{f_5}$
$|0\rangle_{b_5}$
$e^{i\theta^h H^h_{0,1}}$
$e^{i\theta^h H^h_{1,2}}$
$e^{i\theta^h H^h_{2,3}}$
$e^{i\theta^h H^h_{3,4}}$
$e^{i\theta^h H^h_{4,5}}$
$e^{i\theta^h H^h_{5,0}}$
$e^{i\theta^\epsilon H^\epsilon_0}$
$e^{i\theta^\epsilon H^\epsilon_1}$
$e^{i\theta^\epsilon H^\epsilon_2}$
$e^{i\theta^\epsilon H^\epsilon_3}$
$e^{i\theta^\epsilon H^\epsilon_4}$
$e^{i\theta^\epsilon H^\epsilon_5}$
$(\theta^h, \theta^\epsilon)$
VQE
$(\theta^{h*}, \theta^{\epsilon*})$
2. Ansatz optimization
$\mathcal{Q}_{GS}(\theta^{h*}, \theta^{\epsilon*})$
$k = \pm\frac{\pi}{3}$
$\mathcal{Q}_k(\mu_k^A, \sigma_k^A)$
VQE
$\mathcal{Q}_k(\mu_k^{A*}, \sigma_k^{A*})$
$\mathcal{Q}_{GS}(\theta^{h*}, \theta^{\epsilon*})$
$k = 0$
$\mathcal{Q}_k(\mu_k^A, \sigma_k^A)$
VQE
$\mathcal{Q}_k(\mu_k^{A*}, \sigma_k^{A*})$
3. Compute $C_{m,n}$ coeffiecients and build $\Theta_\Psi = \sum_{m,n} \Theta_{m,n}$
with $\Theta_{m,n} = C_{m,n}\widetilde{\mathcal{M}}_{m,n} \otimes |1\rangle\langle 0|_a + C^*_{m,n}\widetilde{\mathcal{M}}^\dagger_{m,n} \otimes |0\rangle\langle 1|_a$
4. Wave-packet circuit
Physical qubits
$|0\rangle_a$
$\mathcal{Q}_{GS}(\theta^{h*}, \theta^{\epsilon*})$
$e^{-i\theta\Theta_{m,n}}$
$e^{-i\theta\Theta_{m,n}}$
$e^{-i\theta\Theta_{m,n}}$
$|\Omega\rangle$
$|\Psi\rangle$