

IT Spillovers in TFP

Marco Brianti and Laura Gati

Boston College

June 26, 2018

$$\max_{C_t, H_t, K_t^C, K_t^I} \sum_{j=0}^{\infty} \beta^j \left[\log C_t - \frac{1}{2} H_t^2 \right]$$

subject to

$$Y_t^C = C_t + I_t^C \quad \text{and} \quad Y_t^I = I_t^I;$$

$$K_{t+1}^C = (1 - \delta^C) K_t^C + I_t^C \quad \text{and} \quad K_{t+1}^I = (1 - \delta^I) K_t^I + I_t^I;$$

$$C_t + K_{t+1}^C + P_t K_{t+1}^I = Y_t^C + P_t Y_t^I + (1 - \delta^C) K_t^C + (1 - \delta^I) P_t K_t^I$$

Production Function

$$Y_t^C = S_t^C N_t (K_t^I)^\gamma (H_{1,t})^{1-a-b} (K_{1,t}^C)^a (K_{1,t}^I)^b$$

$$Y_t^I = S_t^I N_t (K_t^I)^\gamma (H_{2,t})^{1-a-b} (K_{2,t}^C)^a (K_{2,t}^I)^b$$

where

$$Y_t^C = C_t + I_t^C \quad \text{and} \quad Y_t^I = I_t^I;$$


$$K_{t+1}^C = (1 - \delta^C) K_t^C + I_t^C \quad \text{and} \quad K_{t+1}^I = (1 - \delta^I) K_t^I + I_t^I;$$

and

$$H_{1,t} + H_{2,t} = H_t,$$


$$K_{1,t}^C + K_{2,t}^C = K_t^C,$$

$$K_{1,t}^I + K_{2,t}^I = K_t^I$$




Impulse-Response Matching


IT Shock on TFP




IT Shock on IT inv



IT Shock on C



IT Shock on RP



Empirical IRF

