



7.3 关系的运算

关系的基本运算

定义7.6 关系的定义域(domain)、值域(range)与域(field)分别定义为

$$\text{dom}R = \{ x \mid \exists y (\langle x, y \rangle \in R) \}$$

$$\text{ran}R = \{ y \mid \exists x (\langle x, y \rangle \in R) \}$$

$$\text{fld}R = \text{dom}R \cup \text{ran}R$$

例5 $R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 4, 3 \rangle\}$, 则

$$\text{dom}R = \{1, 2, 4\}$$

$$\text{ran}R = \{2, 3, 4\}$$

$$\text{fld}R = \{1, 2, 3, 4\}$$

关系运算(逆与合成)

定义7.7 关系的逆运算

$$R^{-1} = \{ \langle y, x \rangle \mid \langle x, y \rangle \in R \}$$

定义7.8 关系的合成运算

$$R \circ S = \{ \langle x, z \rangle \mid \exists y (\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in S) \}$$

例6 $R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 2 \rangle \}$

$$S = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$$

$$R^{-1} = \{ \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 4, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle \}$$

$$R \circ S = \{ \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle \}$$


$$S \circ R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$$

合成的图示法


利用图示（不是关系图）方法求合成

$$R \circ S = \{ \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle \}$$

$$S \circ R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$$



$R \circ S$



$S \circ R$

$$R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 2 \rangle \}$$

$$S = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$$

定理7.1 设 F 是任意的关系, 则

(1) $(F^{-1})^{-1}=F$

(2) $\text{dom}F^{-1}=\text{ran}F, \text{ran}F^{-1}=\text{dom}F$

证 (1) 任取 $\langle x,y \rangle$, 由逆的定义有

$$\langle x,y \rangle \in (F^{-1})^{-1} \Leftrightarrow \langle y,x \rangle \in F^{-1} \Leftrightarrow \langle x,y \rangle \in F.$$

所以有 $(F^{-1})^{-1}=F$.

(2) 任取 x ,

$$x \in \text{dom}F^{-1} \Leftrightarrow \exists y (\langle x,y \rangle \in F^{-1})$$

$$\Leftrightarrow \exists y (\langle y,x \rangle \in F) \Leftrightarrow x \in \text{ran}F$$

所以有 $\text{dom}F^{-1}=\text{ran}F$.

同理可证 $\text{ran}F^{-1}=\text{dom}F$.

定理7.2 设 F, G, H 是任意的关系, 则

$$(1) (F \circ G) \circ H = F \circ (G \circ H)$$

$$(2) (F \circ G)^{-1} = G^{-1} \circ F^{-1}$$

证 (1) 任取 $\langle x, y \rangle$,

$$\begin{aligned} & \langle x, y \rangle \in (F \circ G) \circ H \\ \Leftrightarrow & \exists t (\langle x, t \rangle \in F \circ G \wedge \langle t, y \rangle \in H) \\ \Leftrightarrow & \exists t (\exists s (\langle x, s \rangle \in F \wedge \langle s, t \rangle \in G) \wedge \langle t, y \rangle \in H) \\ \Leftrightarrow & \exists t \exists s (\langle x, s \rangle \in F \wedge \langle s, t \rangle \in G \wedge \langle t, y \rangle \in H) \\ \Leftrightarrow & \exists s (\langle x, s \rangle \in F \wedge \exists t (\langle s, t \rangle \in G \wedge \langle t, y \rangle \in H)) \\ \Leftrightarrow & \exists s (\langle x, s \rangle \in F \wedge \langle s, y \rangle \in G \circ H) \\ \Leftrightarrow & \langle x, y \rangle \in F \circ (G \circ H) \end{aligned}$$

所以 $(F \circ G) \circ H = F \circ (G \circ H)$

(2) 任取 $\langle x, y \rangle$,

$$\langle x, y \rangle \in (F \circ G)^{-1}$$

$$\Leftrightarrow \langle y, x \rangle \in F \circ G$$

$$\Leftrightarrow \exists t (\langle y, t \rangle \in F \wedge \langle t, x \rangle \in G)$$

$$\Leftrightarrow \exists t (\langle x, t \rangle \in G^{-1} \wedge \langle t, y \rangle \in F^{-1})$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in G^{-1} \circ F^{-1}$$

所以 $(F \circ G)^{-1} = G^{-1} \circ F^{-1}$

定理7.3 设 R 为 A 上的关系, 则

$$R \circ I_A = I_A \circ R = R$$

证 任取 $\langle x, y \rangle$

$$\begin{aligned} & \langle x, y \rangle \in R \circ I_A \\ \Leftrightarrow & \exists t (\langle x, t \rangle \in R \wedge \langle t, y \rangle \in I_A) \\ \Leftrightarrow & \exists t (\langle x, t \rangle \in R \wedge t = y \wedge y \in A) \\ \Leftrightarrow & \langle x, y \rangle \in R \end{aligned}$$

定理7.4

$$(1) F \circ (G \cup H) = F \circ G \cup F \circ H \quad (2) (G \cup H) \circ F = G \circ F \cup H \circ F$$

$$(3) F \circ (G \cap H) \subseteq F \circ G \cap F \circ H \quad (4) (G \cap H) \circ F \subseteq G \circ F \cap H \circ F$$

只证 (3) 任取 $\langle x, y \rangle$,

$$\langle x, y \rangle \in F \circ (G \cap H)$$

$$\Leftrightarrow \exists t (\langle x, t \rangle \in F \wedge \langle t, y \rangle \in G \cap H)$$

$$\Leftrightarrow \exists t (\langle x, t \rangle \in F \wedge \langle t, y \rangle \in G \wedge \langle t, y \rangle \in H)$$

$$\Leftrightarrow \exists t ((\langle x, t \rangle \in F \wedge \langle t, y \rangle \in G) \wedge (\langle x, t \rangle \in F \wedge \langle t, y \rangle \in H))$$

$$\Rightarrow \exists t (\langle x, t \rangle \in F \wedge \langle t, y \rangle \in G) \wedge \exists t (\langle x, t \rangle \in F \wedge \langle t, y \rangle \in H)$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in F \circ G \wedge \langle x, y \rangle \in F \circ H$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in F \circ G \cap F \circ H$$

所以有 $F \circ (G \cap H) \subseteq F \circ G \cap F \circ H$

定理7.4 的结论可以推广到有限多个关系

$$R \circ (R_1 \cup R_2 \cup \dots \cup R_n) = R \circ R_1 \cup R \circ R_2 \cup \dots \cup R \circ R_n$$

$$(R_1 \cup R_2 \cup \dots \cup R_n) \circ R = R_1 \circ R \cup R_2 \circ R \cup \dots \cup R_n \circ R$$

$$R \circ (R_1 \cap R_2 \cap \dots \cap R_n) \subseteq R \circ R_1 \cap R \circ R_2 \cap \dots \cap R \circ R_n$$

$$(R_1 \cap R_2 \cap \dots \cap R_n) \circ R \subseteq R_1 \circ R \cap R_2 \circ R \cap \dots \cap R_n \circ R$$

关系运算(限制与像)

定义7.9 设 R 为二元关系, A 是集合

(1) R 在 A 上的**限制**记作 $R \upharpoonright A$, 其中

$$R \upharpoonright A = \{ \langle x, y \rangle \mid xRy \wedge x \in A \}$$

(2) A 在 R 下的**像**记作 $R[A]$, 其中

$$R[A] = \text{ran}(R \upharpoonright A)$$

说明:

- R 在 A 上的限制 $R \upharpoonright A$ 是 R 的子关系, 即 $R \upharpoonright A \subseteq R$
- A 在 R 下的像 $R[A]$ 是 $\text{ran}R$ 的子集, 即 $R[A] \subseteq \text{ran}R$

例7 设 $R=\{<1,2>, <1,3>, <2,2>, <2,4>, <3,2>\}$, 则

$$R \uparrow \{1\} = \{<1,2>, <1,3>\}$$

$$R \uparrow \emptyset = \emptyset$$

$$R \uparrow \{2,3\} = \{<2,2>, <2,4>, <3,2>\}$$

$$R[\{1\}] = \{2,3\}$$

$$R[\emptyset] = \emptyset$$

$$R[\{3\}] = \{2\}$$

定理7.5 设 F 为关系, A, B 为集合, 则

$$(1) F \uparrow (A \cup B) = F \uparrow A \cup F \uparrow B$$

$$(2) F[A \cup B] = F[A] \cup F[B]$$

$$(3) F \uparrow (A \cap B) = F \uparrow A \cap F \uparrow B$$

$$(4) F[A \cap B] \subseteq F[A] \cap F[B]$$

证 只证 (1) 和 (4).

(1) 任取 $\langle x, y \rangle$

$$\langle x, y \rangle \in F \uparrow (A \cup B)$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in F \wedge x \in A \cup B$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in F \wedge (x \in A \vee x \in B)$$

$$\Leftrightarrow (\langle x, y \rangle \in F \wedge x \in A) \vee (\langle x, y \rangle \in F \wedge x \in B)$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in F \uparrow A \vee \langle x, y \rangle \in F \uparrow B$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in F \uparrow A \cup F \uparrow B$$

所以有 $F \uparrow (A \cup B) = F \uparrow A \cup F \uparrow B$.

(4) 任取 y ,

$$y \in F[A \cap B]$$

$$\Leftrightarrow \exists x (<x, y> \in F \wedge x \in A \cap B)$$

$$\Leftrightarrow \exists x (<x, y> \in F \wedge x \in A \wedge x \in B)$$

$$\Leftrightarrow \exists x ((<x, y> \in F \wedge x \in A) \wedge (<x, y> \in F \wedge x \in B))$$

$$\Rightarrow \exists x (<x, y> \in F \wedge x \in A) \wedge \exists x (<x, y> \in F \wedge x \in B)$$

$$\Leftrightarrow y \in F[A] \wedge y \in F[B]$$

$$\Leftrightarrow y \in F[A] \cap F[B]$$

所以有 $F[A \cap B] \subseteq F[A] \cap F[B]$.

定义7.10

设 R 为 A 上的关系, n 为自然数, 则 R 的 n 次幂定义为:

$$(1) R^0 = \{ \langle x, x \rangle \mid x \in A \} = I_A$$

$$(2) R^{n+1} = R^n \circ R$$

注意:

- 对于 A 上的任何关系 R_1 和 R_2 都有 $R_1^0 = R_2^0 = I_A$
- 对于 A 上的任何关系 R 都有 $R^1 = R$

幂的求法

例 8 设 $A = \{a, b, c, d\}$, $R = \{<a, b>, <b, a>, <b, c>, <c, d>\}$,
求 R 的各次幂, 分别用矩阵和关系图表示.

解 R 与 R^2 的关系矩阵分别是:

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

R^3 和 R^4 的矩阵是:

$$M^3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad M^4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

因此 $M^4=M^2$, 即 $R^4=R^2$. 因此可以得到

$$R^2=R^4=R^6=\dots, \quad R^3=R^5=R^7=\dots$$

R^0 的关系矩阵是

$$M^0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$


关系图




$R^0, R^1, R^2, R^3, \dots$ 的关系图如下图所示.




R^0



R^1



$R^2 = R^4 = \dots$



$R^3 = R^5 = \dots$



幂运算的性质

定理7.6 设 A 为 n 元集, R 是 A 上的关系, 则存在自然数 s 和 t , 使得 $R^s = R^t$.

证 R 为 A 上的关系,

由于 $|A|=n$, A 上的不同关系只有 2^{n^2} 个.

列出 R 的各次幂

$$R^0, R^1, R^2, \dots, R^{2^{n^2}}, \dots,$$

必存在自然数 s 和 t 使得 $R^s = R^t$

定理7.7 设 R 是 A 上的关系, $m, n \in \mathbb{N}$, 则

(1) $R^m \circ R^n = R^{m+n}$

(2) $(R^m)^n = R^{mn}$

证 用归纳法

(1) 对于任意给定的 $m \in \mathbb{N}$, 施归纳于 n .

若 $n=0$, 则有

$$R^m \circ R^0 = R^m \circ I_A = R^m = R^{m+0}$$

假设 $R^m \circ R^n = R^{m+n}$, 则有

$$R^m \circ R^{n+1} = R^m \circ (R^n \circ R) = (R^m \circ R^n) \circ R = R^{m+n+1},$$

所以对一切 $m, n \in \mathbb{N}$ 有 $R^m \circ R^n = R^{m+n}$.

(2) 对于任意给定的 $m \in \mathbb{N}$, 施归纳于 n .

若 $n=0$, 则有

$$(R^m)^0 = I_A = R^0 = R^{m \times 0}$$

假设 $(R^m)^n = R^{mn}$, 则有

$$\begin{aligned}(R^m)^{n+1} &= (R^m)^n \circ R^m = (R^{mn}) \circ R^m \\ &= R^{mn+m} = R^{m(n+1)}\end{aligned}$$

所以对一切 $m, n \in \mathbb{N}$ 有 $(R^m)^n = R^{mn}$.

定理7.8 设 R 是 A 上的关系,

若存在自然数 s, t ($s < t$) 使得 $R^s = R^t$, 则

(1) 对任何 $k \in \mathbb{N}$ 有 $R^{s+k} = R^{t+k}$

(2) 对任何 $k, i \in \mathbb{N}$ 有 $R^{s+kp+i} = R^{s+i}$, 其中 $p = t-s$

(3) 令 $S = \{R^0, R^1, \dots, R^{t-1}\}$, 则对于任意的 $q \in \mathbb{N}$ 有 $R^q \in S$

证 (1) $R^{s+k} = R^s \circ R^k = R^t \circ R^k = R^{t+k}$

(2) 对 k 归纳. 若 $k=0$, 则有 $R^{s+0p+i} = R^{s+i}$

假设 $R^{s+kp+i} = R^{s+i}$, 其中 $p = t-s$, 则

$$R^{s+(k+1)p+i} = R^{s+kp+i+p} = R^{s+kp+i} \circ R^p$$

$$= R^{s+i} \circ R^p = R^{s+p+i} = R^{s+t-s+i} = R^{t+i} = R^{s+i}$$

由归纳法命题得证.

(3) 任取 $q \in \mathbb{N}$,

若 $q < t$, 显然有 $R^q \in S$,

若 $q \geq t$, 则存在自然数 k 和 i 使得

$$q = s + kp + i, \text{ 其中 } 0 \leq i \leq p-1.$$

于是

$$R^q = R^{s+kp+i} = R^{s+i}$$

而

$$s+i \leq s+p-1 = s+t-s-1 = t-1$$

从而证明了 $R^q \in S$.



课后习题

P140:

18 (2)

19 (2)

22