

Semaine n° 31 : du 27 mai au 31 mai

Lundi 27 mai

- **Cours à préparer : Chapitre XXVIII - Séries**
 - *Partie 1* : Série convergente, série divergente ; somme d'une série convergente ; somme partielle d'indice n , reste d'indice n ; séries géométriques, condition nécessaire et suffisante pour la convergence, somme d'une série géométrique convergente ; séries télescopique ; divergence grossière ; série exponentielle.
 - *Partie 2* : Séries à termes positifs ; comparaison de séries à termes positifs ; séries de Riemann.
- **Exercices à traiter en TD**
 - **Feuille d'exercices n° 27** : exercices 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 5.

Mardi 28 mai

- **Cours à préparer : Chapitre XXVIII - Séries**
 - *Partie 3* : Comparaison série-intégrale.
 - *Partie 4* : Séries absolument convergentes ; critère spécial des séries alternées.
- **Exercices à corriger en classe**
 - **Feuille d'exercices n° 27** : exercice 8.

Jeudi 30 mai

- **Cours à préparer : Chapitre XXVIII - Séries**
 - *Partie 5.1* : Famille sommable de réels positifs ; invariance de la somme par permutation ; opérations ; comparaison ; une sous-famille d'une famille sommable de réels positifs est sommable ; sommation par paquets ; théorème de Fubini positif.
 - *Partie 5.2* : Famille sommable de nombres réels ou complexes ; somme d'une famille sommable, invariance par permutation ; linéarité de la somme ; sommation par paquets ; théorème de Fubini ; produit de Cauchy.
- **Exercices à corriger en classe**
 - **Feuille d'exercices n° 27** : exercice 17.

Vendredi 31 mai

- **Cours à préparer : Chapitre XXIX - Espaces euclidiens et préhilbertiens réels**
 - *Partie 1* : Produit scalaire ; espace préhilbertien réel, espace euclidien ; distance ; norme ; distance associée à une norme, norme associée à un produit scalaire ; inégalité de Cauchy-Schwarz, inégalité triangulaire ; identité du parallélogramme, identité de polarisation.
 - *Partie 2.1* : Vecteur unitaire, vecteurs orthogonaux.
 - *De la définition 2.2.1 au corollaire 2.2.7* : Famille orthogonale, famille orthonormale ; théorème de Pythagore ; toute famille orthogonale de vecteurs non nuls est libre.

Échauffements

Mardi 28 mai

- Calculer et factoriser les déterminants suivants :

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a+b & c+a & b+c \\ ab & ca & bc \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} (b+c)^2 & b^2 & c^2 \\ a^2 & (c+a)^2 & c^2 \\ a^2 & b^2 & (a+b)^2 \end{vmatrix}$$

- *Cocher toutes les phrases correctes :*
 - ☐ Une matrice nilpotente est de déterminant nul.
 - ☐ Deux matrices semblables ont même déterminant.
 - ☐ Deux matrices équivalentes ont même déterminant.

Jeudi 30 mai

- Soient $a, b, a_1, \dots, a_n, x \in \mathbb{K}$. Calculer les déterminants suivants :

$$D_1 = \begin{vmatrix} x & a_1 & a_2 & \dots & a_{n-1} & 1 \\ a_1 & x & a_2 & \dots & a_{n-1} & 1 \\ a_1 & a_2 & x & \dots & a_{n-1} & 1 \\ \vdots & & & \ddots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \dots & x & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & \dots & a_n & 1 \end{vmatrix}; \quad D_2 = \begin{vmatrix} a+b & ab & 0 & \dots & 0 \\ 1 & a+b & ab & \ddots & \vdots \\ 0 & 1 & a+b & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & a+b & ab \\ 0 & \dots & 0 & 1 & a+b \end{vmatrix}$$

- *Cocher toutes les phrases correctes :*
 - ☐ Le déterminant d'une matrice à coefficients entiers est un entier.
 - ☐ Le déterminant d'une matrice à coefficients entiers et positifs est un entier positif.
 - ☐ Une matrice à coefficients entiers admet un inverse à coefficients entiers si et seulement si son déterminant est 1 ou -1 .
 - ☐ Le pgcd des coefficients de la première ligne d'une matrice à coefficients entiers qui admet un inverse à coefficients entiers vaut 1.

Vendredi 31 mai

- Calculer les déterminants des endomorphismes φ et ψ de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ définis par :

$$\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \varphi(M) = M^\top \text{ et } \psi(M) = 3M - 2M^\top.$$

- *Cocher toutes les phrases correctes :*
 - ☐ $\det \left(a_i^{j-i} \right)_{i,j \in \llbracket 1,n \rrbracket} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i).$
 - ☐ $\det ((-1)^{i+j} a_{ij}) = \det a_{ij}.$
 - ☐ Pour $\sigma \in S_n$, $\det (\delta_{i,\sigma(j)}) = \varepsilon(\sigma).$
- *Cocher toutes les phrases correctes :*
 - ☐ Pour tout $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $\det (A^\top A) \geq 0.$
 - ☐ Il existe $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ telle que $\det(A^2) = -1.$
 - ☐ Pour tout $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, la fonction $t \mapsto \det(tA + I)$ est polynomiale de degré $n.$
 - ☐ Pour tout $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, il existe au plus n scalaires $\lambda \in \mathbb{R}$ tels que $A - \lambda I$ soit non inversible.