

Devoir à la maison n° 16

À rendre le 4 avril

Pour chaque entier naturel n , on définit la fonction

$$f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \frac{x^n}{\sqrt{1+x}}$$

ainsi que

$$u_n = \int_0^1 \frac{x^n}{\sqrt{1+x}} dx = \int_0^1 f_n.$$

- 1) Soit $n \in \mathbb{N}$. Établir le tableau de variations de f_n sur $[0, 1]$.
- 2) Représenter sur un même graphique les graphes des fonctions f_0 , f_1 et f_2 .
- 3) Démontrer que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite monotone (on précisera le sens de monotonie), qui converge vers 0.
- 4) Démontrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$(n+1)u_n = \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{x^{n+1}}{(\sqrt{1+x})^3} dx.$$

- 5) En déduire un équivalent pour la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$.
- 6) Déterminer des nombres α_1 , α_2 et α_3 tels que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$(n+2)(n+1)u_n = \alpha_1(n+2) + \alpha_2 + \alpha_3 \int_0^1 \frac{x^{n+2}}{(\sqrt{1+x})^5} dx.$$

- 7) En déduire l'existence et la valeur de nombres α et β tels que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ admette le développement asymptotique :

$$u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{\alpha}{n} + \frac{\beta}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

- 8) Soit g une fonction de classe \mathcal{C}^∞ sur l'intervalle $[0, 1]$. On introduit la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad v_n = \int_0^1 x^n g(x) dx.$$

Démontrer que, pour tout entier naturel non nul k , la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ admet un développement asymptotique de la forme :

$$v_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{\beta_1}{n} + \frac{\beta_2}{n^2} + \cdots + \frac{\beta_k}{n^k} + o\left(\frac{1}{n^k}\right).$$

- 9) Exprimer les nombres β_1 et β_2 en fonction de g .
- 10) Soit h une fonction continue sur l'intervalle $[0, 1]$, soit la suite $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad w_n = n \int_0^1 x^n h(x) dx.$$

Démontrer que la suite $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ admet une limite finie et exprimer cette limite en fonction de h .

— FIN —