

凸函数

王正强

重庆邮电大学通信学院

1 基础知识

2 凸函数的定义与性质

3 保凸的运算

4 凸函数的推广

梯度

定义 (梯度)

给定函数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, 且 f 在点 x 的一个邻域内有意义, 若存在向量 $g \in \mathbb{R}^n$ 满足

$$\lim_{p \rightarrow 0} \frac{f(x+p) - f(x) - g^T p}{\|p\|} = 0,$$

其中 $\|\cdot\|$ 是任意的向量范数, 就称 f 在点 x 处可微 (或Fréchet 可微). 此时 g 称为 f 在点 x 处的梯度, 记作 $\nabla f(x)$. 如果对区域 D 上的每一个点 x 都有 $\nabla f(x)$ 存在, 则称 f 在 D 上可微.

若 f 在点 x 处的梯度存在, 在定义式中令 $p = \varepsilon e_i$, e_i 是第 i 个分量为 1 的单位向量, 可知 $\nabla f(x)$ 的第 i 个分量为 $\frac{\partial f(x)}{\partial x_i}$. 因此,

$$\nabla f(x) = \left[\frac{\partial f(x)}{\partial x_1}, \frac{\partial f(x)}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f(x)}{\partial x_n} \right]^T.$$

Hessian矩阵

定义 (Hessian矩阵)

如果函数 $f(x) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 在点 x 处的二阶偏导数 $\frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_i \partial x_j}$ $i, j = 1, 2, \dots, n$ 都存在, 则 f 在点 x 处的 *Hessian* 矩阵为:

$$\nabla^2 f(x) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_1 \partial x_2} & \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_1 \partial x_3} & \cdots & \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_2^2} & \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_2 \partial x_3} & \cdots & \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_2 \partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_n \partial x_1} & \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_n \partial x_2} & \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_n \partial x_3} & \cdots & \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_n^2} \end{bmatrix}$$

当 $\nabla^2 f(x)$ 在区域 D 上的每个点 x 处都存在时, 称 f 在 D 上二阶可微. 若 $\nabla^2 f(x)$ 在 D 上还连续, 则称 f 在 D 上二阶连续可微, 可以证明此时海瑟矩阵是一个对称矩阵.

矩阵变量函数的导数

多元函数梯度的定义可以推广到变量是矩阵的情形. 对于以 $m \times n$ 矩阵 X 为自变量的函数 $f(X)$, 若存在矩阵 $G \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 满足

$$\lim_{V \rightarrow 0} \frac{f(X+V) - f(X) - \langle G, V \rangle}{\|V\|} = 0,$$

其中 $\|\cdot\|$ 是任意矩阵范数, 就称矩阵变量函数 f 在 X 处 **Fréchet** 可微, 称 G 为 f 在 **Fréchet** 可微意义下的梯度. 令 $\frac{\partial f}{\partial x_{ij}}$ 表示 f 关于 x_{ij} 的偏导数. 矩阵变量函数 $f(X)$ 的梯度为

$$\nabla f(x) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_{11}} & \frac{\partial f}{\partial x_{12}} & \cdots & \frac{\partial f}{\partial x_{1n}} \\ \frac{\partial f}{\partial x_{21}} & \frac{\partial f}{\partial x_{22}} & \cdots & \frac{\partial f}{\partial x_{2n}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_{m1}} & \frac{\partial f}{\partial x_{m2}} & \cdots & \frac{\partial f}{\partial x_{mn}} \end{bmatrix}.$$

矩阵变量函数的导数

在实际应用中，矩阵Fréchet可微的定义和使用往往比较繁琐，为此我们需要介绍另一种定义——Gâteaux可微。

定义 (Gâteaux 可微)

设 $f(X)$ 为矩阵变量函数，如果对任意方向 $V \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ，存在矩阵 $G \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 满足

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(X + tV) - f(X) - t \langle G, V \rangle}{t} = 0,$$

则称 f 关于 X 是Gâteaux可微的。满足上式的 G 称为 f 在 X 处在Gâteaux可微意义下的梯度。

可以证明，当 f 是Fréchet可微函数时， f 也是Gâteaux可微的，且这两种意义下的梯度相等。

矩阵变量函数的导数

- 线性函数: $f(X) = \text{tr}(AX^T B)$, 其中 $A \in \mathbb{R}^{p \times n}$, $B \in \mathbb{R}^{m \times p}$, $X \in \mathbb{R}^{m \times n}$
对任意方向 $V \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 以及 $t \in \mathbb{R}$, 有

$$\begin{aligned}\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(X + tV) - f(X)}{t} &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\text{tr}(A(X + tV)^T B) - \text{tr}(AX^T B)}{t} \\ &= \text{tr}(AV^T B) = \langle BA, V \rangle.\end{aligned}$$

因此, $\nabla f(X) = BA$.

- 二次函数: $f(X, Y) = \frac{1}{2} \|XY - A\|_F^2$, 其中 $(X, Y) \in \mathbb{R}^{m \times p} \times \mathbb{R}^{p \times n}$
对变量 Y , 取任意方向 V 以及充分小的 $t \in \mathbb{R}$, 有

$$\begin{aligned}f(X, Y + tV) - f(X, Y) &= \frac{1}{2} \|X(Y + tV) - A\|_F^2 - \frac{1}{2} \|XY - A\|_F^2 \\ &= \langle tXV, XY - A \rangle + \frac{1}{2} t^2 \|XV\|_F^2 \\ &= t \langle V, X^T (XY - A) \rangle + \mathcal{O}(t^2).\end{aligned}$$

由定义可知 $\frac{\partial f}{\partial Y} = X^T (XY - A)$.

对变量 X , 同理可得 $\frac{\partial f}{\partial X} = (XY - A)Y^T$.

矩阵变量函数的导数

- *ln-det* 函数: $f(X) = \ln(\det(X))$, $X \in \mathcal{S}_{++}^n$, 给定 $X \succ 0$, 对任意方向 $V \in \mathcal{S}^n$ 以及 $t \in \mathbb{R}$, 我们有

$$\begin{aligned} f(X + tV) - f(X) &= \ln(\det(X + tV)) - \ln(\det(X)) \\ &= \ln(\det(X^{1/2}(I + tX^{-1/2}VX^{-1/2})X^{1/2})) - \ln(\det(X)) \\ &= \ln(\det(I + tX^{-1/2}VX^{-1/2})). \end{aligned}$$

由于 $X^{-1/2}VX^{-1/2}$ 是对称矩阵, 所以它可以正交对角化, 不妨设它的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 则

$$\begin{aligned} \ln(\det(I + tX^{-1/2}VX^{-1/2})) &= \ln \prod_{i=1}^n (1 + t\lambda_i) \\ &= \sum_{i=1}^n \ln(1 + t\lambda_i) = \sum_{i=1}^n t\lambda_i + \mathcal{O}(t^2) = t \operatorname{tr}(X^{-1/2}VX^{-1/2}) + \mathcal{O}(t^2) \\ &= t \langle (X^{-1})^T, V \rangle + \mathcal{O}(t^2). \end{aligned}$$

因此, 我们得到结论 $\nabla f(X) = (X^{-1})^T$.

广义实值函数与适当函数

定义 (广义实值函数)

令 $\overline{\mathbb{R}} \stackrel{\text{def}}{=} \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ 为广义实数空间, 则映射 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ 称为广义实值函数.

和数学分析一样, 我们规定

$$-\infty < a < +\infty, \quad \forall a \in \mathbb{R}$$

$$(+\infty) + (+\infty) = +\infty, \quad +\infty + a = +\infty, \quad \forall a \in \mathbb{R}.$$

定义 (适当函数)

给定广义实值函数 f 和非空集合 \mathcal{X} . 如果存在 $x \in \mathcal{X}$ 使得 $f(x) < +\infty$, 并且对任意的 $x \in \mathcal{X}$, 都有 $f(x) > -\infty$, 那么称函数 f 关于集合 \mathcal{X} 是适当的.

概括来说, 适当函数 f 的特点是“至少有一处取值不为正无穷”, 以及“处处取值不为负无穷”.

下水平集与上镜图

定义 (α -下水平集)

对于广义实值函数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$,

$$C_\alpha = \{x \mid f(x) \leq \alpha\}$$

称为 f 的 α -下水平集.

定义 (上镜图)

对于广义实值函数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$,

$$\text{epi } f = \{(x, t) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid f(x) \leq t\}$$

称为 f 的上镜图.

闭函数

定义 (闭函数)

设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ 为广义实值函数, 若 $\text{epi } f$ 为闭集, 则称 f 为闭函数.




Figure: 函数 f 和其上镜图 $\text{epi } f$

\mathbf{R} 上的例子

- 函数 $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = x \log x$, $\text{dom} f = \mathbf{R}_{++}$ 不是闭函数。
- 函数 $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$,

$$f(x) = \begin{cases} x \log x & x > 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

在 $\text{dom} f = \mathbf{R}_+$ 是闭函数。

- 函数 $f(x) = -\log x$, $\text{dom} f = \mathbf{R}_{++}$ 是闭函数。

下半连续函数

定义 (下半连续函数)

设广义实值函数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$, 若对任意的 $x \in \mathbb{R}^n$, 有

$$\liminf_{y \rightarrow x} f(y) \geq f(x),$$

则 $f(x)$ 为下半连续函数.




Figure: 下半连续函数 $f(x)$

闭函数与下半连续函数

虽然表面上看这两种函数的定义方式截然不同，但闭函数和下半连续函数是等价的。

定理

设广义实值函数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ ，则以下命题等价：

- 1 $f(x)$ 的任意 α -下水平集都是闭集；
- 2 $f(x)$ 是下半连续的；
- 3 $f(x)$ 是闭函数。

提纲

1 基础知识

2 凸函数的定义与性质

3 保凸的运算

4 凸函数的推广


凸函数的定义

定义 (凸函数)

$f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 为适当函数, 如果 $\text{dom } f$ 是凸集, 且

$$f(\theta x + (1 - \theta)y) \leq \theta f(x) + (1 - \theta)f(y)$$

对所有 $x, y \in \text{dom } f$, $0 \leq \theta \leq 1$ 都成立, 则称 f 是凸函数



- 若 f 是凸函数, 则 $-f$ 是凹函数
- 若对所有 $x, y \in \text{dom } f$, $x \neq y$, $0 < \theta < 1$, 有

$$f(\theta x + (1 - \theta)y) < \theta f(x) + (1 - \theta)f(y)$$

则称 f 是严格凸函数

凸函数判定定理

将函数限制在任意直线上，然后判断对应的一维函数是否是凸的。

定理

$f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 是凸函数，当且仅当对每个 $x \in \text{dom } f, v \in \mathbb{R}^n$ ，函数 $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是关于 t 的凸函数

$$g(t) = f(x + tv), \quad \text{dom } g = \{t | x + tv \in \text{dom } f\}$$

例： $f(X) = -\log \det X$ 是凸函数，其中 $\text{dom } f = \mathbb{S}_{++}^n$ 。任取 $X \succ 0$ 以及方向 $V \in \mathbb{S}^n$ ，将 f 限制在直线 $X + tV$ (t 满足 $X + tV \succ 0$) 上，那么

$$\begin{aligned} g(t) &= -\log \det(X + tV) = -\log \det X - \log \det(I + tX^{-1/2}VX^{-1/2}) \\ &= -\log \det X - \sum_{i=1}^n \log(1 + t\lambda_i) \end{aligned}$$

其中 λ_i 是 $X^{-1/2}VX^{-1/2}$ 第 i 个特征值。对每个 $X \succ 0$ 以及方向 V ， g 关于 t 是凸的，因此 f 是凸的。

凸函数判定定理

Proof.

必要性: 设 $f(x)$ 是凸函数, 要证 $g(t) = f(x + tv)$ 是凸函数. 先说明 $\text{dom}g$ 是凸集. 对任意的 $t_1, t_2 \in \text{dom}g$ 以及 $\theta \in (0, 1)$,

$$x + t_1v \in \text{dom}f, x + t_2v \in \text{dom}f$$

由 $\text{dom}f$ 是凸集可知 $x + (\theta t_1 + (1 - \theta)t_2)v \in \text{dom}f$,
这说明 $\theta t_1 + (1 - \theta)t_2 \in \text{dom}g$, 即 $\text{dom}g$ 是凸集. 此外, 我们有

$$\begin{aligned} g(\theta t_1 + (1 - \theta)t_2) &= f(x + (\theta t_1 + (1 - \theta)t_2)v) \\ &= f(\theta(x + t_1v) + (1 - \theta)(x + t_2v)) \\ &\leq \theta f(x + t_1v) + (1 - \theta)f(x + t_2v) \\ &= \theta g(t_1) + (1 - \theta)g(t_2). \end{aligned}$$

结合以上两点得到函数 $g(t)$ 是凸函数.

凸函数判定定理

Proof.

充分性:先说明 $\text{dom}f$ 是凸集, 取 $v = y - x$, 以及 $t_1 = 0, t_2 = 1$, 由 $\text{dom}g$ 是凸集可知 $\theta \cdot 0 + (1 - \theta) \cdot 1 \in \text{dom}g$, 即 $\theta x + (1 - \theta)y \in \text{dom}f$, 这说明 $\text{dom}f$ 是凸集. 再根据 $g(t) = f(x + tv)$ 的凸性, 我们有

$$\begin{aligned}g(1 - \theta) &= g(\theta t_1 + (1 - \theta)t_2) \\&\leq \theta g(t_1) + (1 - \theta)g(t_2) \\&= \theta g(0) + (1 - \theta)g(1) \\&= \theta f(x) + (1 - \theta)f(y).\end{aligned}$$

而等式左边有

$$g(1 - \theta) = f(x + (1 - \theta)(y - x)) = f(\theta x + (1 - \theta)y),$$

这说明 $f(x)$ 是凸函数.



一阶条件

Proof.

必要性：设 f 是凸函数，则对于任意的 $x, y \in \text{dom}f$ 以及 $t \in (0, 1)$ ，有

$$tf(y) + (1 - t)f(x) \geq f(x + t(y - x)).$$

将上式移项，两边同时除以 t ，注意 $t > 0$ ，则

$$f(y) - f(x) \geq \frac{f(x + t(y - x)) - f(x)}{t}.$$

令 $t \rightarrow 0$ ，由极限保号性可得

$$f(y) - f(x) \geq \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x + t(y - x)) - f(x)}{t} = \nabla f(x)^T(y - x).$$

这里最后一个等式成立是由于方向导数的性质。

一阶条件

Proof.

充分性：对任意的 $x, y \in \text{dom}f$ 以及任意的 $t \in (0, 1)$ ，定义 $z = tx + (1 - t)y$ ，应用两次一阶条件我们有

$$f(x) \geq f(z) + \nabla f(z)^T(x - z),$$

$$f(y) \geq f(z) + \nabla f(z)^T(y - z).$$

将上述第一个不等式两边同时乘 t ，第二个不等式两边同时乘 $1 - t$ ，相加得

$$tf(x) + (1 - t)f(y) \geq f(z) + 0.$$

这正是凸函数的定义，因此充分性成立。 □

梯度单调性

定理

设 f 为可微函数，则 f 为凸函数当且仅当 $\text{dom}f$ 为凸集且 ∇f 为单调映射，

$$(\nabla f(x) - \nabla f(y))^T(x - y) \geq 0, \quad \forall x, y \in \text{dom}f.$$

Proof.

必要性：若 f 可微且为凸函数，根据一阶条件，我们有

$$f(y) \geq f(x) + \nabla f(x)^T(y - x),$$

$$f(x) \geq f(y) + \nabla f(y)^T(x - y).$$

将两式不等号左右两边相加即可得到结论。

梯度单调性

Proof.

充分性：若 ∇f 为单调映射，构造一元辅助函数

$$g(t) = f(x + t(y - x)), \quad g'(t) = \nabla f(x + t(y - x))^T (y - x)$$

由 ∇f 的单调性可知 $g'(t) \geq g'(0), \forall t \geq 0$. 因此

$$\begin{aligned} f(y) &= g(1) = g(0) + \int_0^1 g'(t) dt \\ &\geq g(0) + g'(0) = f(x) + \nabla f(x)^T (y - x). \end{aligned}$$



例如： $f(x) = x^2, f(x, y) = x^2 + 4y^2$.

定理

函数 $f(x)$ 为凸函数当且仅当其上境图 $\text{epi}f$ 是凸集.

Proof.

必要性：若 f 为凸函数，则对任意 $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \text{epi}f, t \in [0, 1]$,

$$ty_1 + (1 - t)y_2 \geq tf(x_1) + (1 - t)f(x_2) \geq f(tx_1 + (1 - t)x_2),$$

故 $(tx_1 + (1 - t)x_2, ty_1 + (1 - t)y_2) \in \text{epi}f, t \in [0, 1]$.

充分性：若 $\text{epi}f$ 是凸集，则对任意 $x_1, x_2 \in \text{dom } f, t \in [0, 1]$,

$$(tx_1 + (1 - t)x_2, tf(x_1) + (1 - t)f(x_2)) \in \text{epi}f \Rightarrow \\ f(tx_1 + (1 - t)x_2) \leq tf(x_1) + (1 - t)f(x_2).$$



二阶条件

定理

二阶条件：设 f 为定义在凸集上的二阶连续可微函数

- f 是凸函数当且仅当

$$\nabla^2 f(x) \succeq 0 \quad \forall x \in \text{dom } f$$

- 如果 $\nabla^2 f(x) \succ 0 \quad \forall x \in \text{dom } f$ ，则 f 是严格凸函数

例：二次函数 $f(x) = (1/2)x^T P x + q^T x + r$ (其中 $P \in \mathbb{S}^n$)

$$\nabla f(x) = P x + q, \quad \nabla^2 f(x) = P$$

f 是凸函数当且仅当 $P \succeq 0$

注：在判断函数凸性和凹性时，利用一阶或二阶条件时， $\text{dom } f$ 是凸集这个前提条件必须满足。例如 $f(x) = 1/x^2$, $\text{dom } f = \{x \in \mathbb{R} | x \neq 0\}$

二阶条件

Proof.

必要性：反设 $f(x)$ 在点 x 处的海瑟矩阵 $\nabla^2 f(x) \not\geq 0$ ，即存在非零向量 $v \in \mathbb{R}^n$ 使得 $v^T \nabla^2 f(x) v < 0$ 。根据佩亚诺（Peano）余项的泰勒展开，

$$f(x + tv) = f(x) + t \nabla f(x)^T v + \frac{t^2}{2} v^T \nabla^2 f(x) v + o(t^2).$$

移项后等式两边同时除以 t^2 ，

$$\frac{f(x + tv) - f(x) - t \nabla f(x)^T v}{t^2} = \frac{1}{2} v^T \nabla^2 f(x) v + o(1).$$

当 t 充分小时，

$$\frac{f(x + tv) - f(x) - t \nabla f(x)^T v}{t^2} < 0,$$

这显然和一阶条件矛盾，因此必有 $\nabla^2 f(x) \succeq 0$ 成立。

二阶条件

Proof.

充分性：设 $f(x)$ 满足二阶条件 $\nabla^2 f(x) \succeq 0$ ，对任意 $x, y \in \text{dom} f$ ，根据泰勒展开，

$$f(y) = f(x) + \nabla f(x)^T(y - x) + \frac{1}{2}(y - x)^T \nabla^2 f(x + t(y - x))(y - x),$$

其中 $t \in (0, 1)$ 是和 x, y 有关的常数。由半正定性可知对任意 $x, y \in \text{dom} f$ 有

$$f(y) \geq f(x) + \nabla f(x)^T(y - x).$$

由凸函数判定的一阶条件知 f 为凸函数。进一步，若 $\nabla^2 f(x) \succ 0$ ，上式中不等号严格成立（ $x \neq y$ ）。利用一阶条件的充分性的证明过程可得 $f(x)$ 为严格凸函数。 □

功率控制问题

如下优化问题是否为凸优化问题(由于约束是凸集，只需要判断目标函数是否为凹函数)?

$$\text{maximize } \sum_{i=1}^n \frac{Lw_i h_i p_i}{\sum_{k \neq i} h_k p_k + Lh_i p_i + \sigma^2} \quad (1)$$

$$\text{subject to } \sum_{j=1}^n g_j p_j \leq T, \quad (2)$$

$$p_j \geq 0, j = 1, \dots, n. \quad (3)$$

问题(1)-(3) 中的优化变量为 p_1, \dots, p_n ，其中 $L > 1, T > 0, \sigma^2 > 0$ 和 $h_i > 0, g_i > 0$ 都是常数， n 为 $n \geq 2$ 的正整数。

问题来源：

Zhengqiang Wang, Lingge Jiang, Chen He. Optimal Price-Based Power Control Algorithm in Cognitive Radio Networks. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2014, 13(11):5909–5920, Nov. 2014.

功率控制问题


非凸优化问题！因为目标函数不是凹函数。

$$f(p_1, \dots, p_n) = \sum_{i=1}^n \frac{Lw_i h_i p_i}{\sum_{k \neq i} h_k p_k + Lh_i p_i + \sigma^2}$$

目标函数非凹函数，取一个反例。取 $n=2, L=2, h_1=1, h_2=1, w_1=1, w_2=1, \sigma^2=1$ ，此时目标函数

为：
$$f(p_1, p_2) = \frac{2p_1}{p_2 + 2p_1 + 1} + \frac{2p_2}{p_1 + 2p_2 + 1},$$

固定取 $p_2=1, f(p_1, 1) = \frac{2p_1}{2+2p_1} + \frac{2}{p_1+3}$



变量替换将非凸优化问题转化为凸优化问题

Lemma

Let $a_i = \frac{h_i p_i}{\sum_{j=1}^n h_j p_j + \sigma^2}$ ($i = 1, \dots, n$), the revenue of the PU satisfies the following equation:

$$\sum_{i=1}^n \frac{L w_i h_i p_i}{\sum_{k \neq i} h_k p_k + \sigma^2 + L h_i p_i} = \sum_{i=1}^n \frac{L w_i a_i}{((L-1)a_i + 1)} \quad (4)$$

and the transmit power of i -th SU satisfies the following equation:

$$p_i = \frac{\sigma^2 a_i}{\left(1 - \sum_{i=1}^n a_i\right) h_i}, \forall i \in \{1, \dots, n\}. \quad (5)$$

等价凸优化问题

Using lemma 1 and $\sum_{i=1}^n a_i = \sum_{i=1}^n h_i p_i / \left(\sum_{i=1}^n h_i p_i + \sigma^2 \right) < 1$, (1)-(3) are equivalent to the following problem:

$$\text{maximize } \sum_{i=1}^n \frac{L w_i a_i}{((L-1)a_i + 1)} \quad (6)$$

$$\text{subject to } \sigma^2 \sum_{i=1}^n \frac{g_i a_i}{h_i} + T \sum_{i=1}^n a_i \leq T, \quad (7)$$

$$a_i \geq 0, i = 1, \dots, n. \quad (8)$$

The optimization variables for (6)-(8) are a_1, \dots, a_n . The second derivative of the above optimization problem with respect to variable a_i is given by $-\frac{2Lw_i(L-1)}{(a_iL-a_i+1)^3} \cdot -\frac{2Lw_i(L-1)}{(a_iL-a_i+1)^3} < 0$ is valid because $L > 1$ and $a_i \geq 0$ are satisfied. The hessian matrix of the objective function is positive definite matrix. Therefore, (6)-(8) is a convex programming.

一元凸函数的例子

凸函数:

- 仿射函数: 对任意 $a, b \in \mathbb{R}$, $ax + b$ 是 \mathbb{R} 上的凸函数
- 指数函数: 对任意 $a \in \mathbb{R}$, e^{ax} 是 \mathbb{R} 上的凸函数
- 幂函数: 对 $\alpha \geq 1$ 或 $\alpha \leq 0$, x^α 是 \mathbb{R}_{++} 上的凸函数
- 绝对值的幂: 对 $p \geq 1$, $|x|^p$ 是 \mathbb{R} 上的凸函数
- 负熵: $x \log x$ 是 \mathbb{R}_{++} 上的凸函数

凹函数:

- 仿射函数: 对任意 $a, b \in \mathbb{R}$, $ax + b$ 是 \mathbb{R} 上的凹函数
- 幂函数: 对 $0 \leq \alpha \leq 1$, x^α 是 \mathbb{R}_{++} 上的凹函数
- 对数函数: $\log x$ 是 \mathbb{R}_{++} 上的凹函数

多元凸函数的例子

所有的仿射函数既是凸函数，又是凹函数。所有的范数都是凸函数。

欧氏空间 \mathbb{R}^n 中的例子

- 仿射函数: $f(x) = a^T x + b$
- 范数: $\|x\|_p = (\sum_{i=1}^n |x_i|^p)^{1/p}$ ($p \geq 1$) ; 特别地, $\|x\|_\infty = \max_k |x_k|$
- 最大值函数: $f(x) = \max\{x_1, \dots, x_n\}$ 在 \mathbf{R}^n 上是凸的。

矩阵空间 $\mathbb{R}^{m \times n}$ 中的例子

- 仿射函数:


$$f(X) = \text{tr}(A^T X) + b = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n A_{ij} X_{ij} + b$$

二阶条件的应用

最小二乘函数: $f(x) = \|Ax - b\|_2^2$

$$\nabla f(x) = 2A^T(Ax - b), \quad \nabla^2 f(x) = 2A^T A$$

对任意 A , f 都是凸函数



quadratic-over-linear 函数: $f(x, y) = x^2/y$

$$\nabla^2 f(x, y) = \frac{2}{y^3} \begin{bmatrix} y \\ -x \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y \\ -x \end{bmatrix}^T \succeq 0$$

是区域 $\{(x, y) \mid y > 0\}$ 上的凸函数。

log-sum-exp函数

log-sum-exp函数: $f(x) = \log(e^{x_1} + \dots + e^{x_n})$, $x \in R^n$ 是凸函数。

证明：观察 f 对各个分量的一二阶偏导数，

$$\text{知 } \frac{\partial f}{\partial x_i} = \frac{e^{x_i}}{e^{x_1} + \dots + e^{x_n}} \Rightarrow \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} \begin{cases} \frac{-e^{x_i} \cdot e^{x_j}}{(e^{x_1} + \dots + e^{x_n})^2}, & i \neq j \\ \frac{-e^{x_i} \cdot e^{x_i} + e^{x_i} \cdot (e^{x_1} + \dots + e^{x_n})}{(e^{x_1} + \dots + e^{x_n})^2}, & i = j \end{cases}$$

$$\text{令 } z = [e^{x_1}, \dots, e^{x_n}]^T, \text{ 则 } \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{-z_i z_j}{(1^T z)^2} (i \neq j), \frac{\partial^2 f}{\partial^2 x_i} = \frac{-z_i z_j + z_i 1^T z}{(1^T z)^2}$$

$$\nabla^2 f(x) = \frac{1}{1^T z} \text{diag}(z) - \frac{1}{(1^T z)^2} z z^T \quad (z_k = \exp x_k)$$

要证明 $\nabla^2 f(x) \succeq 0$ ，我们只需证明对任意 v , $v^T \nabla^2 f(x) v \geq 0$ ，即

$$v^T \nabla^2 f(x) v = \frac{(\sum_k z_k v_k^2)(\sum_k z_k) - (\sum_k v_k z_k)^2}{(\sum_k z_k)^2} \geq 0$$

由柯西不等式，得 $(\sum_k v_k z_k)^2 \leq (\sum_k z_k v_k^2)(\sum_k z_k)$ ，因此 f 是凸函数

几何平均

几何平均函数 $f(x) = (\prod_{i=1}^n x_i)^{1/n}$ 在定义域 $\text{dom} f = \mathbf{R}_{++}$ 是凹的。
其Hessian矩阵 $\nabla^2 f(x)$ 可以通过下面两个式子给出：

$$\frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_k^2} = -(n-1) \frac{(\prod_{i=1}^n x_i)^{1/n}}{n^2 x_k^2} \quad \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_k \partial x_l} = \frac{(\prod_{i=1}^n x_i)^{1/n}}{n^2 x_k x_l} \quad \forall k \neq l$$

因此 $\nabla^2 f(x)$ 具有如下表达式：

$$\nabla^2 f(x) = -\frac{\prod_{i=1}^n x_i^{1/n}}{n^2} (n \text{diag}(1/x_1^2, \dots, 1/x_n^2) - qq^T)$$

其中， $q_i = 1/x_i$ 。我们需要证明 $\nabla^2 f(x) \preceq 0$ ，即对任意向量 v ，有

$$v^T \nabla^2 f(x) v = -\frac{\prod_{i=1}^n x_i^{1/n}}{n^2} \left(n \sum_{i=1}^n v_i^2 / x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n v_i / x_i \right)^2 \right) \leq 0$$

这同样可以应用Cauchy-Schwarz不等式 $(a^T a)(b^T b) \geq (a^T b)^2$ 得到，
只需令向量 $a = 1$ ，向量 b 的分量 $b_i = v_i / x_i$ 。

下水平集(sublevel set)

定义

定义 集合

$$C_\alpha = \{x \in \text{dom}f \mid f(x) \leq \alpha\}$$

称为 f 的 α 下水平集。

定理

凸函数的任一下水平集均为凸集。

- 任一下水平集均为凸集的函数不一定为凸函数。

定理

凹函数的任一上水平集均为凸集。

定义

定义 函数 f 的 α -上水平集： $\{x \in \text{dom}f \mid f(x) \geq \alpha\}$

下水平集(sublevel set)

例3.3 $x \in \mathbf{R}_+^n$ 的几何均值和算术均值分别为:

$$G(x) = \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{1/n}, \quad A(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

在 G 中定义 $0^{1/n} = 0$ 。算术几何平均不等式表明 $G(x) \leq A(x)$ 。
假设 $0 \leq \alpha \leq 1$ ，并考虑该集合:

$$\{x \in \mathbf{R}_+^n \mid G(x) \geq \alpha A(x)\}$$

几何平均值大于等于因子 α 乘以算术平均值的向量的集合。这个集合是凸的，因为它是凹函数 $G(x) - \alpha A(x)$ 的 0-上水平集。事实上，这个集合是正齐次的，所以它是一个凸锥。

函数上境图(Epigraph)

定义

集合 $\text{epif} = \{(x, t) | x \in \text{dom } f, f(x) \leq t\}$ 为函数 f 的上境图。

- 定理：函数 f 为凸函数当且仅当 f 的上境图为凸集。
- 定理：函数 f 为凹函数当且仅当 f 的亚图为凸集

$$\text{hypof} = \{(x, t) | x \in \text{dom } f, f(x) \geq t\}$$

上述定理将凸函数与凸集联系起来。

函数上境图(Epigraph)

例3.4 矩阵分式函数。函数 $f: \mathbf{R}^n \times \mathbf{S}^n \rightarrow \mathbf{R}$ 定义为：

$$f(x, Y) = x^T Y^{-1} x$$

该函数在定义域 $f = \mathbf{R}^n \times \mathbf{S}_{++}^n$ 上是凸的。（这推广了线性函数上的二次函数 $f(x, y) = x^2/y$ ，其定义域为 $f = \mathbf{R} \times \mathbf{R}_{++}$ ）确定 f 的凸性的一个简单方法是通过其上境图：

$$\begin{aligned} \text{epi} f &= \{(x, Y, t) \mid Y \succ 0, x^T Y^{-1} x \leq t\} \\ &= \left\{ (x, Y, t) \mid \begin{bmatrix} Y & x \\ x^T & t \end{bmatrix} \succeq 0, Y \succ 0 \right\} \end{aligned}$$


通过舒尔补条件判断分块矩阵的半正定性（见附录A.5.5）。最后一个条件关于 (x, Y, t) 中的线性矩阵不等式，因此 $\text{epi} f$ 是凸的。

对于特殊情况 $n = 1$ ，矩阵分数函数化简为二次复线性函数 x^2/y ，相应的线性矩阵不等式表示为：

$$\begin{bmatrix} y & x \\ x & t \end{bmatrix} \succeq 0, \quad y > 0$$

函数上境图(Epigraph)

$f(x, y) = x^2/y$ 的图像



上镜图

关于凸函数的很多结果可以从几何的角度利用上镜图并结合凸集的一些结论来证明（或理解），作为一个例子，考虑凸函数的一阶条件：

$$f(y) \geq f(x) + \nabla f(x)^T(y - x)$$

其中函数 f 是凸的， $x, y \in \mathbf{dom} f$ 。我们可以利用 $\mathbf{epi} f$ 从几何角度理解上述基本不等式。如果 $(y, t) \in \mathbf{epi} f$ ，有

$$t \geq f(y) \geq f(x) + \nabla f(x)^T(y - x).$$


上式可以描述为

$$(y, t) \in \mathbf{epi} f \implies \begin{bmatrix} \nabla f(x) \\ -1 \end{bmatrix}^T \left(\begin{bmatrix} y \\ t \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} x \\ f(x) \end{bmatrix} \right) \leq 0.$$

这意味着法向量为 $(\nabla f(x), -1)$ 的超平面在边界点 $(x, f(x))$ 支撑着 $\mathbf{epi} f$ 。

函数上境图(Epigraph)

对于一个可微凸函数 f ，向量 $(\nabla f(x), -1)$ 定义了一个对于 $f(x)$ 在 x 处的上境图的支撑超平面。



Jensen不等式及其扩展

Jensen不等式: 设 f 是凸函数, 则对于 $0 \leq \theta \leq 1$,

$$f(\theta x + (1 - \theta)y) \leq \theta f(x) + (1 - \theta)f(y)$$

概率**Jensen** 不等式: 设 f 是凸函数, 则对任意随机变量 z

$$f(\mathbf{E}z) \leq \mathbf{E}f(z)$$

基础Jensen不等式可以视为概率Jensen 不等式在两点分布下的特殊情况

$$\text{prob}(z = x) = \theta, \quad \text{prob}(z = y) = 1 - \theta$$

Jensen不等式极其扩展

Jensen不等式扩展至更多点的凸组合。

- f 为凸函数，则有

$$f(\theta_1 x_1 + \dots + \theta_n x_n) \leq \theta_1 f(x_1) + \dots + \theta_n f(x_n)$$

其中 $0 \leq \theta_i \leq 1, \theta_1 + \dots + \theta_n = 1$ 。

- Jensen不等式的积分形式：

$$f(\mathbb{E}x) = f\left(\int_S p(x)xdx\right) \leq \int_S p(x)f(x)dx = \mathbb{E}f(x)$$

其中 $\int_S p(x)dx = 1, p(x) \geq 0$ 。

不等式

- 算术几何平均不等式:

$$\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}, a, b \geq 0.$$

- Hölder不等式:

$$\sum_{i=1}^n x_i y_i \leq \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^n |y_i|^q \right)^{\frac{1}{q}}, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1, p > 1$$

提纲

1 基础知识

2 凸函数的定义与性质

3 保凸的运算

4 凸函数的推广

保凸的运算

验证一个函数 f 是凸函数的方法：

- ① 用定义验证（通常将函数限制在一条直线上）
- ② 利用一阶条件、二阶条件
- ③ 直接研究 f 的上镜图 $\text{epi } f$
- ④ 说明 f 可由简单的凸函数通过一些保凸的运算得到
 - 非负加权和
 - 与仿射函数的复合
 - 逐点取最大值
 - 与标量、向量函数的复合
 - 取下确界
 - 透视函数

- 凸函数的非负加权和

$$f(x) = \omega_1 f_1(x) + \cdots + \omega_n f_n(x), \quad \omega_i \geq 0, i = 1, \cdots, n.$$

- 凸函数与仿射变换的复合

$$g(x) = f(Ax + b), \quad A \in R^{n \times m}, b \in R^n,$$

$$\text{dom}f = \{x \mid Ax + b \in \text{dom}f\}$$

- 凸函数的逐点最大值

$$f(x) = \max(f_1(x), \dots, f_n(x))$$

$$g(x) = \sup_{y \in \mathcal{A}} f(x, y)$$

例3.5 分段线性函数。函数

$$f(x) = \max \{a_1^T x + b_1, \dots, a_L^T x + b_L\}$$

定义一个分段线性(或者实际上是仿射)函数(有 L 个或更少的区域)。该函数是凸的, 因为它是仿射函数的点向最大值。

反过来也可以证明:任何具有 L 或更少区域的分段线性凸函数都可以用这种形式表示。

保凸运算

例3.6: 最大 r 个分量之和。

对于任意 $x \in R^n$, 用 $x_{[i]}$ 表示 x 中第 i 大的分量, 即将 x 的分量按照非升序进行排列得到下式:

$$x_{[1]} \geq \cdots \geq x_{[n]}$$

则对 x 的最大 r 个分量进行求和所得的函数

$$f(x) = \sum_{i=1}^r x_{[i]}$$

是凸函数。

$$f(x) = \sum_{i=1}^r x_{[i]} = \max \{x_{i_1} + \cdots + x_{i_r} \mid 1 \leq i_1 \leq \cdots \leq i_r\}$$

逐点取上界

若对每个 $y \in \mathcal{A}$, $f(x, y)$ 是关于 x 的凸函数, 则

$$g(x) = \sup_{y \in \mathcal{A}} f(x, y)$$

是凸函数

例子

- 集合 C 的支撑函数: $S_C(x) = \sup_{y \in C} y^T x$ 是凸函数
- 集合 C 点到给定点 x 的最远距离:

$$f(x) = \sup_{y \in C} \|x - y\|$$

- 对称矩阵 $X \in \mathbb{S}^n$ 的最大特征值

$$\lambda_{\max}(X) = \sup_{\|y\|_2=1} y^T X y$$

- 实对称矩阵的最大特征值 $f(X) = \lambda_{\max}(X)$, $X \in S^m$ 是一个凸函数。
利用 $f(X) = \sup \{y^T X y \mid \|y\|_2 = 1\}$

保凸运算

例3.11 矩阵范数。考虑函数 $f(X) = \|X\|_2$ ，其定义域为 $\text{dom } f = \mathbf{R}^{p \times q}$ ，其中 $\|\cdot\|_2$ 表示谱范数或者最大奇值。函数 f 可以表述为

$$f(X) = \sup \{u^T X v \mid \|u\|_2 = 1, \|v\|_2 = 1\}$$

由于它是 X 的一族线性函数的逐点上确界，所以是凸函数。

作为一个推广，假设 $\|\cdot\|_a$ 和 $\|\cdot\|_b$ 分别是 \mathbf{R}^p 和 \mathbf{R}^q 上的范数，定义矩阵 $X \in \mathbf{R}^{p \times q}$ 的诱导范数为

$$\|X\|_{a,b} = \sup_{v \neq 0} \frac{\|Xv\|_a}{\|v\|_b}.$$

(当两个范数都取Euclid范数时，上述定义范数即为谱范数。) 诱导范数可以写成

$$\|X\|_{a,b} = \sup \{\|Xv\|_a \mid \|v\|_b = 1\} = \sup \{u^T X v \mid \|u\|_{a^*} = 1, \|v\|_b = 1\}$$

其中 $\|\cdot\|_{a^*}$ 是 $\|\cdot\|_a$ 的对偶范数，在此我们利用了

$$\|z\|_a = \sup \{u^T z \mid \|u\|_{a^*} = 1\}.$$

因此 $\|X\|_{a,b}$ 可以表示成 X 的一系列线性函数的上确界，它是凸函数。

- 复合运算

$g : \mathcal{R}^n \rightarrow \mathcal{R}^k, h : \mathcal{R}^k \rightarrow \mathcal{R}$, 定义复合函

数 $f = h \circ g : \mathcal{R}^n \rightarrow \mathcal{R}$

$f(x) = h(g(x)), \text{dom } f = \{x \in \text{dom } g | g(x) \in \text{dom } h\}$

- 最小值算子

$g(x) = \inf_{y \in C} f(x, y)$, 其中 f 关于 (x, y) 是凸的。

保凸运算 (标量复合)

标量函数 $\mathbf{k} = \mathbf{1}$ 情况, 利用函数 \mathbf{f} 的二阶导数:

- 如果 h 是凸函数且非减, g 是凸函数, 则 f 是凸函数
- 如果 h 是凸函数且非增, g 是凹函数, 则 f 是凸函数
- 如果 h 是凹函数且非减, g 是凹函数, 则 f 是凹函数
- 如果 h 是凹函数且非增, g 是凸函数, 则 f 是凹函数

标量复合

如果 $n > L$, 同时不再假设函数 h 和 g 可微或者 $\text{dom } g = \text{dom } h = R^n$, $\text{dom } h = R$, 类似如下结论成立:

- 如果 h 是凸函数且 \tilde{h} 非减, g 是凸函数, 则 f 是凸函数
- 如果 h 是凸函数且 \tilde{h} 非增, g 是凹函数, 则 f 是凸函数
- 如果 h 是凹函数且 \tilde{h} 非减, g 是凹函数, 则 f 是凹函数
- 如果 h 是凹函数且 \tilde{h} 非增, g 是凸函数, 则 f 是凹函数

简单函数复合例子

- 如果 g 是凸函数, 则 $\exp(g(x))$ 是凸函数。
- 如果 g 是凹函数且大于零, 则 $\log(g(x))$ 是凹函数。
- 如果 g 是凹函数且大于零, 则 $1/g(x)$ 是凸函数。
- 如果 g 是凸函数且不小于零, $p \geq 1$, $g^p(x)$ 是凸函数。
- 如果 g 是凸函数, 则 $-\log(-g(x))$ 在 $\{x|g(x) < 0\}$ 上是凸函。

标量复合

例子，复合定理中 h 需要满足的条件




图3.7 左。函数 x^2 ，其定义域为 \mathbf{R}_+ ，在其定义域内是凸且非减的，但是其扩展值延伸不是非减的。右。函数 $\max\{x, 0\}^2$ ，其定义域为 \mathbf{R} ，函数是凸函数，且其扩展值延伸是非减的。

- 函数 $h(x) = x^{1/2}$ ，定义域为 $\text{dom } h = \mathbf{R}_+$ ，其为凹函数且 \tilde{h} 非减。
- 函数 $h(x) = x^{3/2}$ ，定义域为 $\text{dom } h = \mathbf{R}_+$ ，其为凸函数，但是不满足 \tilde{h} 非减的条件。例如， $\tilde{h}(-1) = \infty$ 但 $\tilde{h}(1) = 1$ 。
- 当 $x \geq 0$ 时， $h(x) = x^{3/2}$ ，当 $x < 0$ 时 $h(x) = 0$ ，定义域为 $\text{dom } h = \mathbf{R}$ ， h 是凸函数且满足 \tilde{h} 非减的条件。

矢量复合

复合 $g: \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^k$ 和 $h: \mathbf{R}^k \rightarrow \mathbf{R}$:

$$f(x) = h(g(x)) = h(g_1(x), g_2(x), \dots, g_k(x))$$

f 是凸的

如果 g_i 凸面的 h 凸面的 \tilde{h} 在每个自变量中不减少

如果 g_i 凹面的 h 凸面的 \tilde{h} 在每个自变量中不增加

证明 (对于 $n = 1$, 可微分 g, h)

$$f''(x) = g'(x)^T \nabla^2 h(g(x)) g'(x) + \nabla h(g(x))^T g''(x)$$

示例

- $\sum_{i=1}^m \log g_i(x)$ 如果 g_i 是凹的和正的
- $\log \sum_{i=1}^m \exp g_i(x)$ 是凸的, 如果 g_i 是凸的

矢量复合的例子

- 如果 h 是凸函数且在每维分量上 h 非减, g_i 是凸函数, 则 f 是凸函数;
- 如果 h 是凸函数且在每维分量上 h 非增, g_i 是凹函数, 则 f 是凸函数;
- 如果 h 是凹函数且在每维分量上 h 非减, g_i 是凹函数, 则 f 是凹函数。

例3.14 矢量复合的例子。

- 令 $h(z) = z_{[1]} + \cdots + z_{[r]}$, 即对 $z \in \mathbf{R}^k$ 的前 r 大分量进行求和。则 h 是凸函数且在每一维分量上非减。假设 g_1, \cdots, g_k 是 \mathbf{R}^n 上的凸函数, 则复合函数 $f = h \circ g$, 即最大 r 个 g_i 函数的逐点和, 是凸函数。
- 函数 $h(z) = \log \left(\sum_{i=1}^k e^{z_i} \right)$ 是凸函数且在每一维分量上非减, 因此只要 g_i 是凸函数, $\log \left(\sum_{i=1}^k e^{g_i} \right)$ 就是凸函数。

矢量复合的例子

- 对 $0 < p \leq 1$, 定义在 \mathbf{R}_+^k 上的函数 $h(z) = \left(\sum_{i=1}^k z_i^p\right)^{1/p}$ 是凹的, 且其扩展值延伸(当 $z \not\geq 0$ 时为 $-\infty$) 在每维分量上非减, 则若 g_i 是凹函数且非负, $f(x) = \left(\sum_{i=1}^k g_i(x)^p\right)^{1/p}$ 是凹函数。

- 设 $p \geq 1$, g_1, \dots, g_k 是凸函数且非负。则函数 $\left(\sum_{i=1}^k g_i(x)^p\right)^{1/p}$ 是凸函数。为了说明这一点, 考虑函数 $h: \mathbf{R}^k \rightarrow \mathbf{R}$

$$h(z) = \left(\sum_{i=1}^k \max\{z_i, 0\}^p\right)^{1/p}$$

其中 $\text{dom } h = \mathbf{R}^k$, 因此 $h = \tilde{h}$ 。由函数 h 是凸函数且非减可知 $h(g(x))$ 关于 x 是凸函数。对 $z \succeq 0$, 我们

有 $h(z) = \left(\sum_{i=1}^k z_i^p\right)^{1/p}$, 所以 $\left(\sum_{i=1}^k g_i(x)^p\right)^{1/p}$ 是凸函数。

矢量复合的例子

- 几何平均函数 $h(z) = \left(\prod_{i=1}^k z_i\right)^{1/k}$, 定义域为 \mathbf{R}_+^k , 它是凹函数, 且其扩展值延伸在每维分量上非减。因此若 g_1, \dots, g_k 是非负凹函数, 它们的几何平均 $\left(\prod_{i=1}^k g_i\right)^{1/k}$ 也是非负凹函数。
- 设 $p \geq 1, g_1, \dots, g_k$ 是凸函数且非负。则函数 $\left(\sum_{i=1}^k g_i(x)^p\right)^{1/p}$ 是凸函数。为了说明这一点, 考虑函数 $h: \mathbf{R}^k \rightarrow \mathbf{R}$

$$h(z) = \left(\sum_{i=1}^k \max\{z_i, 0\}^p\right)^{1/p}$$

其中 $\text{dom } h = \mathbf{R}^k$, 因此 $h = \tilde{h}$ 。由函数 h 是凸函数且非减可知 $h(g(x))$ 关于 x 是凸函数。对 $z \succeq 0$, 我们

有 $h(z) = \left(\sum_{i=1}^k z_i^p\right)^{1/p}$, 所以 $\left(\sum_{i=1}^k g_i(x)^p\right)^{1/p}$ 是凸函数。

矢量复合的例子

- 几何平均函数 $h(z) = \left(\prod_{i=1}^k z_i\right)^{1/k}$, 定义域为 \mathbf{R}_+^k , 它是凹函数, 且其扩展值延伸在每维分量上非减。因此若 g_1, \dots, g_k 是非负凹函数, 它们的几何平均 $\left(\prod_{i=1}^k g_i\right)^{1/k}$ 也是非负凹函数。

最小化

如果函数 $f(x, y)$ 是关于 (x, y) 的凸函数, 集合 C 是一个非空凸集, 定义函数:

$$g(x) = \inf_{y \in C} f(x, y)$$

是凸函数

example:

$f(x, y) = x^T A x + 2x^T B y + y^T C y$, 其中:

$$\begin{bmatrix} A & B \\ B^T & C \end{bmatrix} \succeq 0, \quad C \succ 0$$

最小化 y 得到 $g(x) = \inf_y f(x, y) = x^T (A - B C^{-1} B^T) x$, g 是凸函数, 因此Schur补: $A - B C^{-1} B^T \succeq 0$

若 S 是凸集 则到某一集合的距离: $\text{dist}(x, S) = \inf_{y \in S} \|x - y\|$ 是凸函数

透视函数

凸函数的透视运算保凸：

$$g(x, t) = tf(x/t)$$

其定义域: $\text{dom } g = \{(x, t) \mid \frac{x}{t} \in \text{dom } f, t > 0\}$

f 是凸函数, 则 g 也是凸函数;

f 是凹函数, 则 g 也是凹函数。

$$(x, t, s) \in \text{epi } g \iff tf(x/t) \leq s$$

$$\iff f(x/t) \leq s/t$$

$$\iff (x/t, s/t) \in \text{epi } f.$$

例3.18 Euclid范数的平方. \mathbf{R}^n 上的凸函数 $f(x) = x^T x$ 的透视函数由下式给出:

$$g(x, t) = t(x/t)^T(x/t) = \frac{x^T x}{t}$$

当 $t > 0$ 时它关于 (x, t) 是凸函数。

我们可以利用其他方法导出 g 的凸性, 首先, 将 g 表示为一系列二次-线性分式 x_i^2/t 的和, 在§3.1.5中, 我们可以将 g 表述为一种特殊的矩阵分式函数 $x^T(tI)^{-1}x$, 由此导出凸性(见例3.4)。

透视函数

例3.19 负对数。考虑函数 \mathbf{R}_{++} 上的凸函数 $f(x) = -\log x$ 。其透视函数为：

$$g(x, t) = -t \log(x/t) = t \log(t/x) = t \log t - t \log x,$$
在 \mathbf{R}_{++}^2 上它是凸函数。函数 g 称为关于 t 和 x 的相对熵。
当 $x = 1$ 时， g 即为负熵函数。

基于 g 的凸性。我们可以得到一些有趣的相关函数的凸性或凹性。首先，定义两个向量 $u, v \in \mathbf{R}_{++}^n$ 的相对熵。

$$\sum_{i=1}^n u_i \log(u_i/v_i)$$
我们可以利用其他方法导出 g 的凸性，首先，将 g 表示为一系列二次-线性分式 x_i^2/t 的和，在§3.1.5中，我们可以将 g 表述为一种特殊的矩阵分式函数 $x^T(tI)^{-1}x$ ，由此导出凸性(见例3.4)。
由于它是一系列 u_i, v_i 的相对熵和，因此 (u, v) 是凸函数。

透视函数

另一个密切相关的函数是向量 $u, v \in \mathbf{R}_{++}^n$ 之间的 Kullback-Leibler 散度，其形式为：

$$D_{\text{kl}}(u, v) = \sum (u_i \log(u_i/v_i) - u_i + v_i)$$

因为它是 (u, v) 的相对熵和线性函数的和，所以它也是凸函数。Kullback-Leibler 散度总是满足 $D_{\text{kl}}(u, v) \geq 0$ ，当且仅

当 $u = v$ 时， $D_{\text{kl}}(u, v) = 0$ ，因此 Kullback-Leibler 散度可以用来衡量两个正向量之间的偏差；见习题 3.13。（注意到当 u 和 v 都是概率向量，即 $\mathbf{1}^T u = \mathbf{1}^T v = 1$ 时，相对熵和 Kullback-Leibler 散度是等价的。）

例 3.20 设 $f: \mathbf{R}^m \rightarrow \mathbf{R}$ 是凸函数， $A \in \mathbf{R}^{m \times n}$, $b \in \mathbf{R}^m$, $c \in \mathbf{R}^n$, and $d \in \mathbf{R}$ 。我们定义：

$$g(x) = (c^T x + d) f((Ax + b)/(c^T x + d))$$

其中：

$$\text{dom } g = \{x \mid c^T x + d > 0, (Ax + b)/(c^T x + d) \in \text{dom } f\}$$


其中 g 是凸的。

共轭函数(conjugate function)

定义

设函数 $f: \mathcal{R}^n \rightarrow \mathcal{R}$, 其共轭函数 $f^*: \mathcal{R}^n \rightarrow \mathcal{R}$, 定义为:

$$f^*(y) = \sup_{x \in \text{dom}_f} (y^T x - f(x))$$



函数 $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 以及某一 $y \in \mathbf{R}$ 。共轭函数 $f^*(y)$ 是线性函数 yx 和 $f(x)$ 之间的最大差值, 如果 f 可微, 在满足 $f'(x) = y$ 的点处的差值最大 x 。

共轭函数(conjugate function)

共轭函数：

$$f(x) = ax + b, f^*(a) = -b, \quad \text{dom } f^* = \{a\}$$

$$f(x) = e^x, f^*(y) = y \log(y) - y (y \geq 0)$$

$$f(x) = x \log x, f^*(y) = e^{y-1}, \text{dom } f^* = \mathbb{R}$$

$$f(x) = \frac{1}{x}, \quad x \in \mathbb{R}_{++}, f^*(y) = -2(-y)^{1/2}, \text{dom } f^* = -\mathbb{R}_+$$

$$f(x) = -\log(x), \quad x \in \mathbb{R}_{++}, f^*(y) = -\log(-y) - 1, y < 0.$$

共轭函数(conjugate function)

例3.22 严格凸的二次函数。考虑函数 $f(x) = \frac{1}{2}x^T Qx$, $Q \in \mathbf{S}_{++}^n$ 。对所有 x, y 的函数 $y^T x - \frac{1}{2}x^T Qx$ 都有上界并在 $x = Q^{-1}y$ 处达到上确界, 因此:

$$f^*(y) = \frac{1}{2}y^T Q^{-1}y$$

例3.24 示性函数。设 I_S 是某个集合 $S \subseteq \mathbf{R}^n$ (不一定是凸集)的示性函数, 即当 x 在 $\text{dom } I_S = S$ 内时, $I_S(x) = 0$ 示性函数的共轭函数为

$$I_S^*(y) = \sup_{x \in S} y^T x,$$

它是集合 S 的支撑函数。

共轭函数(conjugate function)

例3.23 对数-行列式。我们考虑 \mathbf{S}_{++}^n 上定义的函数 $f(X) = \log \det X^{-1}$ 。其共轭函数定义为：

$$f^*(Y) = \sup_{X \succ 0} (\operatorname{tr}(YX) + \log \det X),$$

其中 $\operatorname{tr}(YX)$ 是 \mathbf{S}^n 上的标准内积。首先我们说明只有当 $Y \prec 0$ 时， $\operatorname{tr}(YX) + \log \det X$ 才有上界。如果 $Y \not\prec 0$ ，则 Y 有特征向量 v ， $\|v\|_2 = 1$ 且对应的特征值 $\lambda \geq 0$ 。令 $X = I + tvv^T$ 我们有：

$\operatorname{tr}(YX) + \log \det X = \operatorname{tr} Y + t\lambda + \log \det(I + tvv^T) = \operatorname{tr} Y + t\lambda + \log(1 + t)$ ，当 $t \rightarrow \infty$ 时，上式无界。接下来考虑 $Y \prec 0$ 的情形。为了追求最大值，令对 X 的偏导为零，则：

$$\nabla_X (\operatorname{tr}(YX) + \log \det X) = Y + X^{-1} = 0$$

(见S A.4.1)，得到 $X = -Y^{-1}$ (X 是正定的)。因此

$$f^*(Y) = \log \det(-Y)^{-1} - n$$

其定义域为 $\operatorname{dom} f^* = -\mathbf{S}_{++}^n$ 。

共轭函数(conjugate function)

例3.25 指数和对数函数。为了得到指数和的对数函

数 $f(x) = \log(\sum_{i=1}^n e^{x_i})$ 的对数函数,

首先考察 y 取何值时 $y^T x - f(x)$ 的最大值可以得到。对 x 求导, 令其为零, 我们可以得到如下条件:

$$y_i = \frac{e^{x_i}}{\sum_{j=1}^n e^{x_j}}, \quad i = 1, \dots, n.$$

当且仅当 $y \succeq 0$ 以及 $1^T y = 1$ 时上述方程有解。将 y_i 的表达式代入 $y^T x - f(x)$ 我们可以得到 $f^*(y) = \sum_{i=1}^n y_i \log y_i$ 。

根据前面的约定, $0 \log 0$ 等于0, 因此只要满足 $y \succeq 0$ 以及 $1^T y = 1$, 即使当 y 的某些分量为0时, f^* 的表达式仍然正确。

事实上 f^* 的定义域即为 $1^T y = 1, y \succeq 0$ 。为了说明这一点, 假设 y 的某个分量是负的, 比如说 $y_k < 0$, 令 $x_k = -t, x_i = 0, i \neq k$, 令 t 趋向于无穷, $y^T x - f(x)$ 无上界。

共轭函数(conjugate function)

如果 $y \succeq 0$ 但是 $1^T y \neq 1$, 我们令 $x = t1$, 可以得到:

$$y^T x - f(x) = t1^T y - t - \log n.$$

若 $1^T y > 1$, 当 $t \rightarrow \infty$ 时上述表达式无界; 当 $1^T y < 1$, 若 $t \rightarrow -\infty$ 时其无界。总之,

$$f^*(y) = \begin{cases} \sum_{i=1}^n y_i \log y_i & \text{如果 } y \succeq 0 \text{ 且 } 1^T y = 1 \\ \infty & \text{其他情况} \end{cases}$$

换言之, 指数和的对数函数的共轭函数是概率单纯形内的负熵函数

提纲

1 基础知识

2 凸函数的定义与性质

3 保凸的运算


4 凸函数的推广

拟凸函数

$f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 称为拟凸的, 如果 $\text{dom } f$ 是凸集, 并且下水平集

$$S_\alpha = \{x \in \text{dom } f | f(x) \leq \alpha\}$$

对任意 α 都是凸的



- 若 f 是拟凸的, 则称 $-f$ 是拟凹的
- 若 f 既是拟凸的, 又是拟凹的, 则称 f 是拟线性的

拟凸、凹函数的例子

- $\sqrt{|x|}$ 是 \mathbb{R} 上的拟凸函数
- $\text{ceil}(x) = \inf\{z \in \mathbb{Z} | z \geq x\}$ 是拟线性的
- $\log x$ 是 \mathbb{R}_{++} 上的拟线性函数
- $f(x_1, x_2) = x_1 x_2$ 是 \mathbb{R}_{++}^2 上的拟凹函数
- 分式线性函数

$$f(x) = \frac{a^T x + b}{c^T x + d}, \quad \text{dom } f = \{x | c^T x + d > 0\}$$

是拟线性的

- 距离比值函数

$$f(x) = \frac{\|x - a\|_2}{\|x - b\|_2}, \quad \text{dom } f = \{x | \|x - a\|_2 \leq \|x - b\|_2\}$$

是拟凸的


拟凸函数的性质

类**Jensen**不等式: 对拟凸函数 f

$$0 \leq \theta \leq 1 \implies f(\theta x + (1 - \theta)y) \leq \max\{f(x), f(y)\}$$

一阶条件: 定义在凸集上的可微函数 f 是拟凸的, 当且仅当

$$f(y) \leq f(x) \implies \nabla f(x)^T (y - x) \leq 0$$



注: 拟凸函数的和不一定是拟凸函数

对数凸函数

如果正值函数 f 满足 $\log f$ 是凸函数, 则 f 称为对数凸函数, 即

$$f(\theta x + (1 - \theta)y) \leq f(x)^\theta f(y)^{1-\theta} \quad \text{for } 0 \leq \theta \leq 1.$$

如果 $\log f$ 是凹函数, 则 f 称为对数凹函数,

- 幂函数: 当 $a \leq 0$ 时, x^a 是 \mathbb{R}_{++} 上的对数凸函数; 当 $a \geq 0$, x^a 是 \mathbb{R}_{++} 上的对数凹函数
- 许多常见的概率密度函数是对数凹函数, 例如正态分布

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n \det \Sigma}} e^{-\frac{1}{2}(x-\bar{x})^T \Sigma^{-1}(x-\bar{x})}$$

- 高斯分布的累计分布函数 Φ 是对数凹函数

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-u^2/2} du$$

对数凸、凹函数的性质

- 定义在凸集上的二阶可微函数 f 是对数凹的，当且仅当

$$f(x)\nabla^2 f(x) \preceq \nabla f(x)\nabla f(x)^T$$

对任意 $x \in \text{dom } f$ 成立

- 对数凹函数的乘积仍为对数凹函数
- 对数凹函数的和不一定为对数凹函数
- 若 $f: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ 是对数凹函数，那么

$$g(x) = \int f(x, y) dy$$

是对数凹函数