

数理逻辑

郑为杰

e-mail: zhengweijie@hit.edu.cn

哈尔滨工业大学（深圳）计算机学院

2023年12月



自然演绎系统ND的语言部分

字母表是集合：

$$\Sigma = \{ (,), \neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow, p, q, r, p_1, p_2, p_3, \dots \}$$

注释：

- (1) 三个部分构成：助记符 + 联结词 + $Atom(L^p)$ 。
- (2) $\{p, q, r, p_1, p_2, \dots\}$ 就是 $Atom(L^p)$ 。
- (3) $\{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ 是联结词。
- (4) $\{(,)\}$ 是助记符。目的是体现公式的层次感。



自然演绎系统ND的语言部分

字母表： $\Sigma = \{ (,), \neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow, p, q, r, p_1, p_2, p_3, \dots \}$

助记符+完备联结词组+ $Atom(L^p)$

ND的公式（递归定义）：

- (1) $p, q, r, p_1, p_2, p_3, \dots$ 为（原子）公式。
- (2) 如果 A 、 B 是公式，那么 $\neg A$ 、 $A \wedge B$ 、 $A \vee B$ 、 $A \rightarrow B$ 、 $A \leftrightarrow B$ 也是公式。
- (3) 只有 (1) 和 (2) 确定的 Σ^* 的字符串才是公式。在不产生歧义的情况下，公式中最外层的括号可以省略。

自然演绎系统ND中的公理

公理模式：

$$\Gamma \cup \{A\} \vdash A \text{ (}\epsilon\text{)}$$

注释：

- (1) ND中只有这一条公理
- (2) Γ 代表的是ND中的公式集合
- (3) A 代表的是ND中的公式
- (4) 该公理实际上表示了一个公理模板



自然演绎系统ND的推理规则

推理规则：共有14条

推理规则1：假设引入规则，出自重言式 $B \rightarrow (A \rightarrow B)$

$$\frac{\Gamma \vdash B}{\Gamma \cup \{A\} \vdash B} (+)$$

证明(PC证明):

- 由 $\Gamma \vdash B$ ，则可得 Γ 为前提对 $A \rightarrow B$ 的如下演绎序列：

$$B, B \rightarrow (A \rightarrow B), A \rightarrow B$$

- 从而 $\Gamma \vdash A \rightarrow B$ ，再由演绎定理知 $\Gamma; A \vdash B$ 。



自然演绎系统ND的推理规则

推理规则：共有14条

推理规则2：假设消除规则，出自重言式 $\neg A \rightarrow (A \rightarrow B)$

$$\frac{\Gamma; A \vdash B, \quad \Gamma; \neg A \vdash B}{\Gamma \vdash B} \quad (-)$$

证明(PC证明):

- 由 $\Gamma; A \vdash B, \quad \Gamma; \neg A \vdash B$ ，根据演绎定理知： $\Gamma \vdash A \rightarrow B, \quad \Gamma \vdash \neg A \rightarrow B$
- 可构造以 Γ 为前提的如下演绎序列：
 - (1) $A \rightarrow B$ 已知条件
 - (2) $(A \rightarrow B) \rightarrow (\neg B \rightarrow \neg A)$ 定理13
 - (3) $\neg B \rightarrow \neg A$ (1) 和 (2) 用rmf分离规则
 - (4) $(\neg A \rightarrow B) \rightarrow (\neg B \rightarrow A)$ 定理14
 - (5) $\neg A \rightarrow B$ 已知条件
 - (6) $\neg B \rightarrow A$ (5) 和 (4) 用rmf分离规则
 - (7) $(\neg B \rightarrow A) \rightarrow ((\neg B \rightarrow \neg A) \rightarrow B)$ 定理16
 - (8) $(\neg B \rightarrow \neg A) \rightarrow B$ (6) 和 (7) 用rmf分离规则
 - (9) B (3) 和 (8) 用rmf分离规则
- 从上述演绎序列可知 $\Gamma \vdash B$

自然演绎系统ND的推理规则

推理规则：共有14条

推理规则3：析取引入规则，出自重言式 $A \rightarrow A \vee B, B \rightarrow A \vee B$

$$\frac{\Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash A \vee B}, \quad \frac{\Gamma \vdash B}{\Gamma \vdash A \vee B} \quad (V+)$$

证明(PC证明):

- 由 $\Gamma \vdash A$ 可以得到以 Γ 为前提的如下演绎序列:

$$A, A \rightarrow A \vee B, A \vee B$$

- 从上述演绎序列可知 $\Gamma \vdash A \vee B$

- 由 $\Gamma \vdash B$ 可以得到以 Γ 为前提的如下演绎序列:

$$B, B \rightarrow A \vee B, A \vee B$$

- 从上述演绎序列可知 $\Gamma \vdash A \vee B$

自然演绎系统ND的推理规则

推理规则：共有14条

推理规则4：析取消除规则，出自重言式 $(A \vee B) \wedge (A \rightarrow C) \wedge (B \rightarrow C) \rightarrow C$

$$\frac{\Gamma; A \vdash C, \quad \Gamma; B \vdash C, \quad \Gamma \vdash A \vee B}{\Gamma \vdash C} \quad (V-)$$

证明(PC证明):

- 由 $\Gamma; A \vdash C$ 和 $\Gamma; B \vdash C$ ，根据演绎定理知： $\Gamma \vdash A \rightarrow C$ ， $\Gamma \vdash B \rightarrow C$
- 可以构造以 Γ 为前提的如下演绎序列：
 - (1) $(A \rightarrow C) \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow (A \vee B \rightarrow C))$ 定理22二难推理
 - (2) $A \rightarrow C$ 已知条件
 - (3) $(B \rightarrow C) \rightarrow (A \vee B \rightarrow C)$ (2) 和 (1) 用 \rightarrow 分离规则
 - (4) $B \rightarrow C$ 已知条件
 - (5) $A \vee B \rightarrow C$ (4) 和 (3) 用 \rightarrow 分离规则
 - (6) $A \vee B$ 已知条件
 - (7) C (6) 和 (5) 用 \rightarrow 分离规则
- 从上述演绎序列可知 $\Gamma \vdash C$

自然演绎系统ND的推理规则

推理规则：共有14条

推理规则5：合取引入规则，出自重言式 $A \rightarrow (B \rightarrow A \wedge B)$

$$\frac{\Gamma \vdash A, \quad \Gamma \vdash B}{\Gamma \vdash A \wedge B} \quad (\wedge +)$$

证明(PC证明):

- 由 $\Gamma \vdash A$ 、 $\Gamma \vdash B$ ，可以构造以 Γ 为前提的如下演绎序列：

- (1) A 已知条件
- (2) B 已知条件
- (3) $A \rightarrow (B \rightarrow A \wedge B)$ 定理26
- (4) $B \rightarrow A \wedge B$ (1) 和 (3) 用 \rightarrow 分离规则
- (5) $A \wedge B$ (2) 和 (4) 用 \rightarrow 分离规则

- 从上述演绎序列可知 $\Gamma \vdash A \wedge B$

自然演绎系统ND的推理规则

推理规则：共有14条

推理规则6：合取消除规则，出自重言式 $A \wedge B \rightarrow A, A \wedge B \rightarrow B$)

$$\frac{\Gamma \vdash A \wedge B}{\Gamma \vdash A}, \quad \frac{\Gamma \vdash A \wedge B}{\Gamma \vdash B} \quad (\wedge -)$$

证明(PC证明):

- 由 $\Gamma \vdash A \wedge B$ 可以构造以 Γ 为前提的如下演绎序列：
 - (1) $A \wedge B$ 已知条件
 - (2) $A \wedge B \rightarrow A$ 定理24
 - (3) A (1) 和 (2) 用 \wedge 分离规则
- 从上述演绎序列可知 $\Gamma \vdash A$
- 由 $\Gamma \vdash A \wedge B$ 也可以构造以 Γ 为前提的如下演绎序列：
 - (1) $A \wedge B$ 已知条件
 - (2) $A \wedge B \rightarrow B$ 定理25
 - (3) B (1) 和 (2) 用 \wedge 分离规则
- 从上述演绎序列可知 $\Gamma \vdash B$

自然演绎系统ND的推理规则

推理规则：共有14条

推理规则7：蕴含引入规则

$$\frac{\Gamma; A \vdash B}{\Gamma \vdash A \rightarrow B} \quad (\rightarrow +)$$

证明(PC证明)：

由 $\Gamma; A \vdash B$ 根据演绎定理知 $\Gamma \vdash A \rightarrow B$ 。



自然演绎系统ND的推理规则

推理规则：共有14条

推理规则8：蕴含消除规则

$$\frac{\Gamma \vdash A, \quad \Gamma \vdash A \rightarrow B}{\Gamma \vdash B} \quad (\rightarrow -)$$

证明(PC证明):

- 由 $\Gamma \vdash A$ 、 $\Gamma \vdash A \rightarrow B$ 可以构造以 Γ 为前提的如下演绎序列：

(1) A 已知条件

(2) $A \rightarrow B$ 已知条件

(3) B (1) 和 (2) 用 \rightarrow 分离规则

- 从上述演绎序列可知 $\Gamma \vdash B$

自然演绎系统ND的推理规则

推理规则：共有14条

推理规则9: \neg 引入规则

$$\frac{\Gamma; A \vdash B, \quad \Gamma; A \vdash \neg B}{\Gamma \vdash \neg A} \quad (\neg +)$$

证明(PC证明):

- 由 $\Gamma; A \vdash B$, $\Gamma; A \vdash \neg B$ 根据演绎定理知: $\Gamma \vdash A \rightarrow B$, $\Gamma \vdash A \rightarrow \neg B$
- 可以构造以 Γ 为前提的如下演绎序列:
 - (1) $A \rightarrow B$ 已知条件
 - (2) $A \rightarrow \neg B$ 已知条件
 - (3) $(A \rightarrow B) \rightarrow ((A \rightarrow \neg B) \rightarrow \neg A)$ 定理17
 - (4) $(A \rightarrow \neg B) \rightarrow \neg A$ (1) 和 (3) 用 \rightarrow 分离规则
 - (5) $\neg A$ (2) 和 (4) 用 \rightarrow 分离规则
- 从上述演绎序列可知 $\Gamma \vdash \neg A$

自然演绎系统ND的推理规则

推理规则：共有14条

推理规则10： \neg 消除规则，出自重言式 $A \rightarrow (\neg A \rightarrow B)$

$$\frac{\Gamma \vdash A, \quad \Gamma \vdash \neg A}{\Gamma \vdash B} (\neg -)$$

证明(PC证明):

- 由 $\Gamma \vdash A, \Gamma \vdash \neg A$ ，构造以 Γ 为前提的如下演绎序列：

(1) A 已知条件

(2) $\neg A$ 已知条件

(3) $A \rightarrow (\neg A \rightarrow B)$ 定理7

(4) $\neg A \rightarrow B$ (1) 和 (3) 用 \rightarrow 分离规则

(5) B (2) 和 (4) 用 \rightarrow 分离规则

- 从上述演绎序列可知 $\Gamma \vdash B$

自然演绎系统ND的推理规则

推理规则：共有14条

推理规则11： $\neg\neg$ 引入规则，出自重言式 $A \rightarrow \neg\neg A$

$$\frac{\Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash \neg\neg A} (\neg\neg+)$$

证明(PC证明):

- 由 $\Gamma \vdash A$ 构造以 Γ 为前提的如下演绎序列：
 - (1) A 已知条件
 - (2) $A \rightarrow \neg\neg A$ 定理12
 - (3) $\neg\neg A$ (1) 和 (2) 用 \rightarrow 分离规则
- 从上述演绎序列可知 $\Gamma \vdash \neg\neg A$

自然演绎系统ND的推理规则

推理规则：共有14条

推理规则12: $\neg\neg$ 消除规则，出自重言式 $\neg\neg A \rightarrow A$

$$\frac{\Gamma \vdash \neg\neg A}{\Gamma \vdash A} (\neg\neg-)$$

证明(PC证明):

- 由 $\Gamma \vdash \neg\neg A$ 构造以 Γ 为前提的如下演绎序列:

(1) $\neg\neg A$ 已知条件

(2) $\neg\neg A \rightarrow A$ 定理10

(3) A (1) 和 (2) 用 \rightarrow 分离规则

- 从上述演绎序列可知 $\Gamma \vdash A$

自然演绎系统ND的推理规则

推理规则：共有14条

推理规则13： 等价引入规则，出自 \leftrightarrow 的定义

$$\frac{\Gamma \vdash A \rightarrow B, \Gamma \vdash B \rightarrow A}{\Gamma \vdash A \leftrightarrow B} (\leftrightarrow +)$$

证明：根据 \leftrightarrow 的定义而得



自然演绎系统ND的推理规则

推理规则：共有14条

推理规则14： 等价消除规则，出自 \leftrightarrow 的定义

$$\frac{\Gamma \vdash A \leftrightarrow B}{\Gamma \vdash A \rightarrow B}, \quad \frac{\Gamma \vdash A \leftrightarrow B}{\Gamma \vdash B \rightarrow A} \quad (\leftrightarrow -)$$

证明：根据 \leftrightarrow 的定义而得



自然演绎系统ND的推理规则

公理模式: $\Gamma \cup \{A\} \vdash A$ (ϵ)

推理规则1: 假设引入规则, $\frac{\Gamma \vdash B}{\Gamma \cup \{A\} \vdash B}$ (+)

推理规则2: 假设消除规则, $\frac{\Gamma; A \vdash B, \quad \Gamma; \neg A \vdash B}{\Gamma \vdash B}$ (-)

推理规则3: 析取引入规则, $\frac{\Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash A \vee B}, \quad \frac{\Gamma \vdash B}{\Gamma \vdash A \vee B}$ ($V+$)

推理规则4: 析取消除规则, $\frac{\Gamma; A \vdash C, \quad \Gamma; B \vdash C, \quad \Gamma \vdash A \vee B}{\Gamma \vdash C}$ ($V-$)

推理规则5: 合取引入规则, $\frac{\Gamma \vdash A, \quad \Gamma \vdash B}{\Gamma \vdash A \wedge B}$ ($\wedge +$)

推理规则6: 合取消除规则, $\frac{\Gamma \vdash A \wedge B}{\Gamma \vdash A}, \quad \frac{\Gamma \vdash A \wedge B}{\Gamma \vdash B}$ ($\wedge -$)

自然演绎系统ND的推理规则

推理规则7: \rightarrow 引入规则, $\frac{\Gamma; A \vdash B}{\Gamma \vdash A \rightarrow B} (\rightarrow +)$

推理规则8: \rightarrow 消除规则, $\frac{\Gamma \vdash A, \Gamma \vdash A \rightarrow B}{\Gamma \vdash B} (\rightarrow -)$

推理规则9: \neg 引入规则, $\frac{\Gamma; A \vdash B, \Gamma; A \vdash \neg B}{\Gamma \vdash \neg A} (\neg +)$

推理规则10: \neg 消除规则, $\frac{\Gamma \vdash A, \Gamma \vdash \neg A}{\Gamma \vdash B} (\neg -)$

推理规则11: $\neg\neg$ 引入规则, $\frac{\Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash \neg\neg A} (\neg\neg +)$

推理规则12: $\neg\neg$ 消除规则, $\frac{\Gamma \vdash \neg\neg A}{\Gamma \vdash A} (\neg\neg -)$

推理规则13: \leftrightarrow 引入规则, $\frac{\Gamma \vdash A \rightarrow B, \Gamma \vdash B \rightarrow A}{\Gamma \vdash A \leftrightarrow B} (\leftrightarrow +)$

推理规则14: \leftrightarrow 消除规则, $\frac{\Gamma \vdash A \leftrightarrow B}{\Gamma \vdash A \rightarrow B}, \frac{\Gamma \vdash A \leftrightarrow B}{\Gamma \vdash B \rightarrow A} (\leftrightarrow -)$

自然演绎系统ND的演绎和定理

演绎结果:在 ND 系统中称 A 为 Γ 的演绎结果, 记为 $\Gamma \vdash_{ND} A$, 如果存在一个序列:

$$\Gamma_1 \vdash A_1, \Gamma_2 \vdash A_2, \dots, \Gamma_m \vdash A_m (= \Gamma \vdash A)$$

对任意的 $i = 1, 2, \dots, m$, $\Gamma_i \vdash A_i$ 都满足下列情况之一:

- $\Gamma_i \vdash A_i$ 公理
- $\Gamma_i \vdash A_i$ 是 $\Gamma_j \vdash A_j$ ($j < i$)
- $\Gamma_i \vdash A_i$ 是 $\Gamma_{j_1} \vdash A_{j_1}, \Gamma_{j_2} \vdash A_{j_2}, \dots, \Gamma_{j_k} \vdash A_{j_k}$ ($j_1, j_2, \dots, j_k < i$)使用推理规则导出

特别地, 称 A 为 ND 的定理, 如果 $\Gamma \vdash A$, 并且 $\Gamma = \emptyset$, 即 $\vdash A$ 。

自然演绎系统ND的基本定理

定理1: $\vdash_{ND} A \vee \neg A$

定理2: $\vdash_{ND} \neg(A \vee B) \leftrightarrow \neg A \wedge \neg B$

定理3: $\vdash_{ND} \neg(A \wedge B) \leftrightarrow \neg A \vee \neg B$

定理4: $\neg A \rightarrow B \vdash \neg A \wedge \neg B$

定理5: $A \rightarrow B \vdash \neg A \vee B$

定理6: $\vdash A \wedge (B \vee C) \leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$

定理7: PC的公理是ND的定理, 即

(1) $\vdash_{ND} A \rightarrow (B \rightarrow A)$

(2) $\vdash_{ND} (A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C))$

(3) $\vdash_{ND} (\neg A \rightarrow \neg B) \rightarrow (B \rightarrow A)$

定理1

定理1: $\vdash_{ND} A \vee \neg A$

证明:

1. $A \vdash A$ (ϵ)
2. $A \vdash A \vee \neg A$ $(1)(V+)$
3. $\neg A \vdash \neg A$ (ϵ)
4. $\neg A \vdash A \vee \neg A$ $(3)(V+)$
5. $\vdash A \vee \neg A$ $(2)(4)(-)$



定理2

定理2: $\vdash_{ND} \neg(A \vee B) \leftrightarrow \neg A \wedge \neg B$

证明: 先证 $\vdash \neg(A \vee B) \rightarrow \neg A \wedge \neg B$

1. $\neg(A \vee B), A \vdash A$ (E)
2. $\neg(A \vee B), A \vdash A \vee B$ (1)(V+)
3. $\neg(A \vee B), A \vdash \neg(A \vee B)$ (E)
4. $\neg(A \vee B) \vdash \neg A$ (2)(3)($\neg+$)
5. $\neg(A \vee B), B \vdash B$ (E)
6. $\neg(A \vee B), B \vdash A \vee B$ (5)(V+)
7. $\neg(A \vee B), B \vdash \neg(A \vee B)$ (E)
8. $\neg(A \vee B) \vdash \neg B$ (6)(7)($\neg+$)
9. $\neg(A \vee B) \vdash \neg A \wedge \neg B$ (4)(8)($\wedge+$)
10. $\vdash \neg(A \vee B) \rightarrow \neg A \wedge \neg B$ (9)($\rightarrow+$)

定理2

定理2: $\vdash_{ND} \neg(A \vee B) \leftrightarrow \neg A \wedge \neg B$

证明: 再证 $\vdash \neg A \wedge \neg B \rightarrow \neg(A \vee B)$

11. $\neg A \wedge \neg B, A \vee B, A \vdash A$ (\in)

12. $\neg A \wedge \neg B, A \vee B, A \vdash \neg A \wedge \neg B$ (\in)

13. $\neg A \wedge \neg B, A \vee B, A \vdash \neg A$ (12)($\wedge -$)

14. $\neg A \wedge \neg B, A \vee B, A \vdash A \wedge \neg A$ (11)(13)($\wedge +$)

15. $\neg A \wedge \neg B, A \vee B, B \vdash B$ (\in)

16. $\neg A \wedge \neg B, A \vee B, B \vdash \neg A \wedge \neg B$ (\in)

17. $\neg A \wedge \neg B, A \vee B, B \vdash \neg B$ (16)($\wedge -$)

18. $\neg A \wedge \neg B, A \vee B, B \vdash A \wedge \neg A$ (15)(17)($\neg -$)

19. $\neg A \wedge \neg B, A \vee B \vdash A \vee B$ (\in)

20. $\neg A \wedge \neg B, A \vee B \vdash A \wedge \neg A$ (14)(18)(19)($\vee -$)

21. $\neg A \wedge \neg B, A \vee B \vdash A$ (20)($\wedge -$)

22. $\neg A \wedge \neg B, A \vee B \vdash \neg A$ (20)($\wedge -$)

23. $\neg A \wedge \neg B \vdash \neg(A \vee B)$ (21)(22)($\neg +$)

24. $\vdash \neg A \wedge \neg B \rightarrow \neg(A \vee B)$ (24)($\rightarrow +$)

25. $\vdash \neg(A \vee B) \leftrightarrow \neg A \wedge \neg B$ (10)(24)($\leftrightarrow +$)

定理3

定理3: $\vdash_{ND} \neg(A \wedge B) \leftrightarrow \neg A \vee \neg B$

证明: 先证 $\vdash \neg(A \wedge B) \rightarrow \neg A \vee \neg B$

$$(1) \neg(A \wedge B), \neg A \vdash \neg A (\epsilon)$$

$$(2) \neg(A \wedge B), \neg A \vdash \neg A \vee \neg B \quad (1)(\vee +)$$

$$(3) \neg(A \wedge B), A, B \vdash A (\epsilon)$$

$$(4) \neg(A \wedge B), A, B \vdash B \quad (\epsilon)$$

$$(5) \neg(A \wedge B), A, B \vdash A \wedge B \quad (3)(4)(\wedge +)$$

$$(6) \neg(A \wedge B), A, B \vdash \neg(A \wedge B) \quad (\epsilon)$$

$$(7) \neg(A \wedge B), A \vdash \neg B \quad (5)(6)(\neg +)$$

$$(8) \neg(A \wedge B), A \vdash \neg A \vee \neg B \quad (7)(\vee +)$$

$$(9) \neg(A \wedge B) \vdash \neg A \vee \neg B \quad (8)(2)(-)$$

$$(10) \vdash \neg(A \wedge B) \rightarrow \neg A \vee \neg B \quad (9)(\rightarrow +)$$

定理3

定理3: $\vdash_{ND} \neg(A \wedge B) \leftrightarrow \neg A \vee \neg B$

证明: 再证 $\vdash \neg A \vee \neg B \rightarrow \neg(A \wedge B)$

- (11) $\neg A \vee \neg B, A \wedge B, \neg A \vdash A \wedge B$ (\in)
- (12) $\neg A \vee \neg B, A \wedge B, \neg A \vdash A$ (11)($\wedge -$)
- (13) $\neg A \vee \neg B, A \wedge B, \neg A \vdash \neg A$ (\in)
- (14) $\neg A \vee \neg B, A \wedge B, \neg A \vdash A \wedge \neg A$ (12)(13)($\wedge +$)
- (15) $\neg A \vee \neg B, A \wedge B, \neg B \vdash A \wedge B$ (\in)
- (16) $\neg A \vee \neg B, A \wedge B, \neg B \vdash B$ (15)($\wedge -$)
- (17) $\neg A \vee \neg B, A \wedge B, \neg B \vdash \neg B$ (\in)
- (18) $\neg A \vee \neg B, A \wedge B, \neg B \vdash A \wedge \neg A$ (16)(17)($\neg -$)
- (19) $\neg A \vee \neg B, A \wedge B \vdash \neg A \vee \neg B$ (\in)
- (20) $\neg A \vee \neg B, A \wedge B \vdash A \wedge \neg A$ (14)(18)(19)($\vee -$)
- (21) $\neg A \vee \neg B, A \wedge B \vdash A$ (20)($\wedge -$)
- (22) $\neg A \vee \neg B, A \wedge B \vdash \neg A$ (20)($\wedge -$)
- (23) $\neg A \vee \neg B \vdash \neg(A \wedge B)$ (21)(22)($\neg +$)
- (24) $\vdash \neg A \vee \neg B \rightarrow \neg(A \wedge B)$ (23)($\rightarrow +$)
- (25) $\vdash \neg(A \wedge B) \leftrightarrow \neg A \vee \neg B$ (10)(24)($\leftrightarrow +$)

定理4

定理4: $\neg A \rightarrow B \vdash \neg A \vee B$

证明: 先证 $\neg A \rightarrow B \vdash_{ND} A \vee B$

1: $\neg A \rightarrow B, A \vdash A$ (ϵ)

2: $\neg A \rightarrow B, A \vdash A \vee B$ (1)($\vee +$)

3: $\neg A \rightarrow B, \neg A \vdash \neg A$ (ϵ)

4: $\neg A \rightarrow B, \neg A \vdash \neg A \rightarrow B$ (ϵ)

5: $\neg A \rightarrow B, \neg A \vdash B$ (3)(4)($\rightarrow -$)

6: $\neg A \rightarrow B, \neg A \vdash A \vee B$ (5)($\vee +$)

7: $\neg A \rightarrow B \vdash A \vee B$ (2)(6)($-$)



定理4

定理4: $\neg A \rightarrow B \vdash \neg A \vee B$

证明: 再证 $A \vee B \vdash_{ND} \neg A \rightarrow B$

1: $A \vee B, \neg A, A \vdash A \quad (\epsilon)$

2: $A \vee B, \neg A, A \vdash \neg A \quad (\epsilon)$

3: $A \vee B, \neg A, A \vdash B \quad (1)(2)(\neg\neg)$

4: $A \vee B, \neg A, B \vdash B \quad (\epsilon)$

5: $A \vee B, \neg A \vdash A \vee B \quad (\epsilon)$

6: $A \vee B, \neg A \vdash B \quad (3)(4)(5)(\vee -)$

7: $A \vee B \vdash \neg A \rightarrow B \quad (6)(\rightarrow +)$



定理5

定理5: $A \rightarrow B \vdash \neg A \vee B$

证明: 先证 $A \rightarrow B \vdash \neg A \vee B$

- (1) $A \rightarrow B, \neg A \vdash \neg A$ (ϵ)
- (2) $A \rightarrow B, \neg A \vdash \neg A \vee B$ (1) $(\vee +)$
- (3) $A \rightarrow B, A \vdash A$ (ϵ)
- (4) $A \rightarrow B, A \vdash A \rightarrow B$ (ϵ)
- (5) $A \rightarrow B, A \vdash B$ (3) (4) $(\rightarrow -)$
- (6) $A \rightarrow B, A \vdash \neg A \vee B$ (5) $(\vee +)$
- (7) $A \rightarrow B \vdash \neg A \vee B$ (6) (2) $(-)$

定理5

定理5: $A \rightarrow B \vdash \neg \neg A \vee B$

证明: 再证 $\neg A \vee B \vdash A \rightarrow B$

$$(1) \neg A \vee B, A, \neg A \vdash A \quad (\epsilon)$$

$$(2) \neg A \vee B, A, \neg A \vdash \neg A \quad (\epsilon)$$

$$(3) \neg A \vee B, A, \neg A \vdash B \quad (1) \quad (2) \quad (\neg -)$$

$$(4) \neg A \vee B, A, B \vdash B \quad (\epsilon)$$

$$(5) \neg A \vee B, A \vdash \neg A \vee B \quad (\epsilon)$$

$$(6) \neg A \vee B, A \vdash B \quad (3) \quad (4) \quad (5) \quad (\vee -)$$

$$(7) \neg A \vee B \vdash A \rightarrow B \quad (6) \quad (\rightarrow +)$$

$$(8) A \rightarrow B \vdash \neg \neg A \vee B$$

定理6

定理6: $\vdash A \wedge (B \vee C) \leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$

证明: 先证 $\vdash A \wedge (B \vee C) \rightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$

1: $A \wedge (B \vee C), B \vdash B$ (\in)

2: $A \wedge (B \vee C), B \vdash A \wedge (B \vee C)$ (\in)

3: $A \wedge (B \vee C), B \vdash A$ (2)($\wedge -$)

4: $A \wedge (B \vee C), B \vdash A \wedge B$ (3)(1)($\wedge +$)

5: $A \wedge (B \vee C), B \vdash (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$ (4)($\vee +$)

6: $A \wedge (B \vee C), C \vdash C$ (\in)

7: $A \wedge (B \vee C), C \vdash A \wedge (B \vee C)$ (\in)

8: $A \wedge (B \vee C), C \vdash A$ (7)($\wedge -$)

9: $A \wedge (B \vee C), C \vdash A \wedge C$ (6)(8)($\wedge +$)

10: $A \wedge (B \vee C), C \vdash (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$ (9)($\vee +$)

11: $A \wedge (B \vee C) \vdash A \wedge (B \vee C)$ (\in)

12: $A \wedge (B \vee C) \vdash B \vee C$ (11)($\wedge -$)

13: $A \wedge (B \vee C) \vdash (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$ (5)(10)(12)($\vee -$)

14: $\vdash A \wedge (B \vee C) \rightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$ (13)($\rightarrow +$)

定理6

定理6: $\vdash A \wedge (B \vee C) \leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$

证明: 再证 $\vdash (A \wedge B) \vee (A \wedge C) \rightarrow A \wedge (B \vee C)$

15: $(A \wedge B) \vee (A \wedge C), A \wedge B \vdash A$ (ϵ)之上做($\wedge -$)

16: $(A \wedge B) \vee (A \wedge C), A \wedge B \vdash B$ (ϵ)之上做($\wedge -$)

17: $(A \wedge B) \vee (A \wedge C), A \wedge B \vdash B \vee C$ (16)($\vee +$)

18: $(A \wedge B) \vee (A \wedge C), A \wedge B \vdash A \wedge (B \vee C)$ (15)(17)($\wedge +$)

19: $(A \wedge B) \vee (A \wedge C), A \wedge C \vdash A$ (ϵ)之上做($\wedge -$)

20: $(A \wedge B) \vee (A \wedge C), A \wedge C \vdash C$ (ϵ)之上做($\wedge -$)

21: $(A \wedge B) \vee (A \wedge C), A \wedge C \vdash B \vee C$ (20)($\vee +$)

22: $(A \wedge B) \vee (A \wedge C), A \wedge C \vdash A \wedge (B \vee C)$ (19)(21)($\wedge +$)

23: $(A \wedge B) \vee (A \wedge C) \vdash (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$ (ϵ)

24: $(A \wedge B) \vee (A \wedge C) \vdash A \wedge (B \vee C)$ (18)(22)(23)($\vee -$)

25: $\vdash (A \wedge B) \vee (A \wedge C) \rightarrow A \wedge (B \vee C)$ (24)($\rightarrow +$)

26: $\vdash (A \wedge B) \vee (A \wedge C) \leftrightarrow A \wedge (B \vee C)$ (14)(25)($\leftrightarrow +$)

定理7

定理7: PC的公理是ND的定理, 即

$$(1) \vdash_{ND} A \rightarrow (B \rightarrow A)$$

$$(2) \vdash_{ND} (A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C))$$

$$(3) \vdash_{ND} (\neg A \rightarrow \neg B) \rightarrow (B \rightarrow A)$$

$$(1) \vdash A \rightarrow (B \rightarrow A)$$

证明:

$$1: A, B \vdash A \quad (\in)$$

$$2: A \vdash B \rightarrow A \quad (1)(\rightarrow +)$$

$$3: \vdash A \rightarrow (B \rightarrow A) \quad (2)(\rightarrow +)$$

定理7

$$(2) \vdash (A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C))$$

证明:

$$1: A \rightarrow (B \rightarrow C), A \rightarrow B, A \vdash A \quad (\epsilon)$$

$$2: A \rightarrow (B \rightarrow C), A \rightarrow B, A \vdash A \rightarrow B \quad (\epsilon)$$

$$3: A \rightarrow (B \rightarrow C), A \rightarrow B, A \vdash A \rightarrow (B \rightarrow C) \quad (\epsilon)$$

$$4: A \rightarrow (B \rightarrow C), A \rightarrow B, A \vdash B \quad (1)(2)(\rightarrow -)$$

$$5: A \rightarrow (B \rightarrow C), A \rightarrow B, A \vdash B \rightarrow C \quad (1)(3)(\rightarrow -)$$

$$6: A \rightarrow (B \rightarrow C), A \rightarrow B, A \vdash C \quad (4)(5)(\rightarrow -)$$

$$7: A \rightarrow (B \rightarrow C), A \rightarrow B \vdash A \rightarrow C \quad (6)(\rightarrow +)$$

$$8: A \rightarrow (B \rightarrow C) \vdash (A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C) \quad (7)(\rightarrow +)$$

$$9: \vdash (A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C)) \quad (8)(\rightarrow +)$$

定理7

(3) $\vdash (\neg A \rightarrow \neg B) \rightarrow (B \rightarrow A)$

证明:

1: $\neg A \rightarrow \neg B, B, \neg A \vdash B$ (\in)

2: $\neg A \rightarrow \neg B, B, \neg A \vdash \neg A$ (\in)

3: $\neg A \rightarrow \neg B, B, \neg A \vdash \neg A \rightarrow \neg B$ (\in)

4: $\neg A \rightarrow \neg B, B, \neg A \vdash \neg B$ (2)(3)($\rightarrow -$)

5: $\neg A \rightarrow \neg B, B \vdash \neg\neg A$ (1)(4)($\neg +$)

6: $\neg A \rightarrow \neg B, B \vdash A$ (5)($\neg\neg -$)

7: $\neg A \rightarrow \neg B \vdash B \rightarrow A$ (6)($\rightarrow +$)

8: $\vdash (\neg A \rightarrow \neg B) \rightarrow (B \rightarrow A)$ (7)($\rightarrow +$)

自然演绎系统ND的基本定理

定理1: $\vdash_{ND} A \vee \neg A$ ✓

定理2: $\vdash_{ND} \neg(A \vee B) \leftrightarrow \neg A \wedge \neg B$ ✓

定理3: $\vdash_{ND} \neg(A \wedge B) \leftrightarrow \neg A \vee \neg B$ ✓

定理4: $\neg A \rightarrow B \vdash \neg A \vee B$ ✓

定理5: $A \rightarrow B \vdash \neg A \vee B$ ✓

定理6: $\vdash A \wedge (B \vee C) \leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$ ✓

定理7: PC的公理是ND的定理, 即 ✓

(1) $\vdash_{ND} A \rightarrow (B \rightarrow A)$

(2) $\vdash_{ND} (A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C))$

(3) $\vdash_{ND} (\neg A \rightarrow \neg B) \rightarrow (B \rightarrow A)$