

根据《地理标志产品保护规定》，我局组织了对邵东玉竹地理标志产品保护申请的审查。审查合格，现批准自即日起对邵东玉竹实施地理标志产品保护。

一、保护范围

邵东玉竹地理标志产品保护范围以湖南省邵东县人民政府《关于界定邵东玉竹地理标志产品保护范围的通知》（邵政函[2005]71 号）提出的范围为准，为湖南省邵东县的黑田铺乡、团山镇、砂石镇、斫曹乡、流光岭镇、仙槎桥镇、双凤乡、魏家桥镇、廉桥镇、黄陂桥乡、流泽镇、周官桥乡、九龙岭镇、界岭乡、两市镇等 15 个乡镇现辖行政区域。

二、质量技术要求

（一）保护品种。

猪屎尾参。

（二）栽培管理。

1. 立地条件：

选择海拔 200m 至 600m 间的向阳山坡或平地栽种。土壤应为黄、红色砂壤土，呈微酸性（PH 值 5.2 至 6.8），有机质含量 $\geq 1.2\%$ ，忌在土质粘重、地势低洼、易积水的地块栽培，忌连作，忌当风之地。前作最好是禾本科或豆科作物，新区最少 3 至 5 年轮作 1 次，老区 7 至 8 年轮作 1 次。在玉竹地的四周不能烧砖瓦。

2. 繁殖方法：

（1）地下根茎繁殖法：选择当年生的地下根茎，顶芽粗壮，无病斑、虫伤和机械损伤，个体大小均匀，重量在 10g 以上，带有部分须根的新鲜根茎作种苗。一般每 667m² 需种苗 400 至 500kg。

（2）种苗处理：玉竹种根茎选好后，在播种前进行 1 次药剂消毒处理。

3. 栽种：

（1）栽种时间：在 8 月下旬至 9 月中旬栽种最好。

（2）合理密植：栽植密度以行株距 30cm \times 8.3cm 为宜。

（3）播种深度：一般以 6 至 7cm 为好。

4. 田间管理：

（1）栽种至萌芽期的管理：一般 8 月至次年 3 月雨水较少，冬季气温低，要用稻草、枯枝落叶等覆盖，盖 6 至 7cm 厚。用有机肥作覆盖材料在畦面铺施 1 层。

（2）第 1 个生长年的管理：3 月出苗后，严防人畜入地。当新苗长到 7 至 10cm 时可追 1 次提苗肥，可用复合肥，不要施用碳铵。冬季倒苗后，扯除杂草，再面施 1 层土杂肥或者复合肥，再加盖 5 至 6cm 厚稻草或枯枝落叶，或就地取挖心土培蔸。

（3）第 2 个生长年的管理：春季出苗后，抓紧追施一次腐熟的人畜粪肥。第 2 年玉竹苗较密，阴蔽度好，可抑制部分杂草生长，发现杂草要及时扯除。

（4）采用间套作或轮作模式

（三）质量特色。

1. 外观：玉竹条呈长圆柱形，略扁，少有分枝，长 8 至 20cm，直径 1.2 至 1.6cm，表面黄白色、金黄色或黄棕色，半透明，具有纵皱及微隆起的环节，节上残留白色圆点状须根痕，一端较疏，一端较密，茎痕处较细呈结节状，质略柔润，断面黄白色，微透明，富糖性，味甜，香味浓，嚼之有粘性。玉竹片肉质白色，无外皮，或有少许外皮，片宽 6mm 至 15mm。

2. 理化指标：水分 $\leq 18.5\%$ ；粘多糖 $\geq 10.0\%$ 。

三、专用标志使用

邵东玉竹地理标志产品保护范围内的生产者，可向邵东县质量技术监督局提出使用“地理标志产品专用标志”的申请，由国家质检总局公告批准。

自本公告发布之日起，各地质检部门开始对邵东玉竹实施地理标志产品保护措施。

特此公告。

二〇〇五年十二月二十八日