

2006 年第 209 号

关于批准对禹白附 实施地理标志产品保护的公告

根据《地理标志产品保护规定》，我局组织了对禹白附地理标志产品保护申请的审查。经审查合格，现批准自即日起对禹白附实施地理标志产品保护。

一、保护范围

禹白附地理标志产品保护范围以河南省禹州市人民政府《关于确定禹南星、禹白芷、禹白附原产地域产品保护范围的通知》（禹政[2004]106 号）提出的范围为准，为河南省禹州市的古城镇、郭连乡、山货乡、褚河乡、火龙镇、顺店镇、花石乡、梁北镇、范坡乡、小吕乡、张得乡、方岗乡、鸿畅镇、朱阁乡、无梁镇、颍川办事处、韩城办事处、钧台办事处、夏都办事处等 19 个乡镇办现辖行政区域。

二、质量技术要求

（一）种名。

白附（*Typhonium giganteum* Engl）。

（二）立地条件。

海拔 150m 至 400m，土质为褐土类、潮褐土亚类、潮垆土属的潮垆土、浅位黑煤土和深位黑煤土潮垆土，潮黄土属的黄土和沙黄土。pH 值 7 至 8，有机质含量 $\geq 1.2\%$ 。

（三）栽培管理。

以块茎为主，种子为副。块茎应选上年新鲜块茎，种子应选当年新种子，发芽率 $\geq 75\%$ 。

1. 块茎繁殖：

（1）种植：4 月下旬至 5 月上旬，将禹白附块茎按大、中、小分开，按行距 20cm、株距 10cm 栽种，芽嘴向上，深度 7cm 至 10cm。用种量 300 kg 至 750kg，最大密度控制在 500000 万株/ha。

（2）施肥：施入腐熟堆肥或厩肥 37500kg/ha 至 75000kg/ha。6 月出苗后，追施腐熟人畜粪尿 2250kg/ha；8 月上旬施入尿素 300kg/ha，过磷酸钙 600kg/ha。

（3）灌溉排水：土壤含水量要求 18%至 20%，低于 18%时应及时灌溉（有条件的可采用喷灌或滴灌）。切忌中午或午后浇水。若遇暴雨或雨后猛晴，及时用井水冲浇 1 次。雨季若遇积水应及时排出，防止田间积水。

2. 种子繁殖：禹白附采用块茎繁殖 3 至 5 年后，为了恢复种性，须采用种子繁殖 1 年。

（1）播种：春播于 3 至 4 月，秋播在 9 月下旬至 10 月上旬。选用当年产新种子，发芽率 $\geq 75\%$ 。采用条播，按行距 15 cm 至 20cm，沟深 4cm 至 5cm，将种子均匀撒入沟中，覆盖 1cm 细土，略加镇压，再均匀施入腐熟厩肥 15000kg/ha。播种量为 7.5kg/ha 至 15kg/ha。

（2）间苗定苗：秋播的当年不间苗，第二年苗高 3cm 至 5cm 时进行间苗，每隔 5cm 保留 1 株，苗高 10cm 时定苗，株距为 10cm，呈三角形错开。

（3）中耕除草：定苗前除草用手拔或用浅锄，定苗时可边除草、边松土、边定苗，以后逐渐加深，次数依土壤干湿度和杂草生产情况而定，松土时不能伤及主根。

（4）追肥：秋播的当年不施肥，来年追肥 2 次。第 1 次在定苗后，施用腐熟稀人粪尿 15000kg/ha；第 2 次封垅前，施用腐熟厩肥或堆肥 22500 至 45000kg/ha，过磷酸钙 180kg/ha，氯化钾 75kg/ha。

（5）灌溉排水：苗期要求土壤含水量为 18%至 22%，播种后若土壤干燥，应立即浇水。如遇雨季，田间积水，应及时开沟排水，以防积水烂根及病害发生。

3. 采收与加工：茎繁殖的当年收获，种子繁殖的 2 至 3 年后收获。霜降 3 至 5 天后挖出块茎，去掉泥土、残茎及须根，用竹刀挖出芽头除去粗皮，放入水中洗净、置太阳光下晒至水分含量至 11%至 14%待用。

（四）质量特色。

块茎多呈卵圆形或椭圆形，表皮白色或黄白色，形如蚕茧，或似小芋艿而色黄白，长 2cm 至 5cm，直径 1cm 至 3cm，外表稍粗糙，具环纹及多数小麻点状的根痕。顶端多带有茎痕或芽痕，有的中部缢缩。质坚而硬，断面类白色，富有粉性。无臭味淡有针刺舌的辛辣感。

三、专用标志使用

禹白附地理标志产品保护范围内的生产者，可向河南省禹州市质量技术监督局提出使用“地理标志产品专用标志”的申请，由国家质检总局公告批准。

自本公告发布之日起，各地质检部门开始对禹白附实施地理标志产品保护措施。

特此公告。

二〇〇六年十二月二十八日

