

Metrische Räume

NORM

- **Definition:** Abbildung $\|\cdot\| : V \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ sodass $\forall v, w \in V, \lambda \in \mathbb{R}$:
 - *Definitheit:* $\|v\| = 0 \Leftrightarrow v = 0$
 - *Absolute Homogenität:* $\|\lambda v\| = |\lambda| \cdot \|v\|$
 - *Dreiecksungleichung:* $\|v + w\| \leq \|v\| + \|w\|$(\mathbb{R} -Vektorraum V)

METRIK

- **Definition:** $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ (Menge X) sodass $\forall x, y, z \in X$:
 - *Positivität:* $d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$
 - *Symmetrie:* $d(x, y) = d(y, x)$
 - *Dreiecksungleichung:* $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$
- **Wichtige Metriken:**
 - *Triviale Metrik:* $d(x, y) := \begin{cases} 0, & x = y \\ 1, & x \neq y \end{cases}$
 - *Euklidische Metrik:* $X = \mathbb{R}^n, d_e(x, y) := \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2} = \|x - y\|$
 - *Induzierte Metrik:* $d(v, w) := \|v - w\|$ (Norm $\|\cdot\|$)
 - *Winkelmetrik:* $d_W(x, y) := \arccos(\langle x, y \rangle)$
- **Pseudometrik:** Metrik, aber $d(x, y) = 0 \Rightarrow x = y$ gilt nicht
- **Metrischer Raum:** (X, d) (Menge X , Metrik d auf X)

KONSTRUKTIONEN

- **Einheitssphäre:** $S_1^n := \{x \in \mathbb{R}^{n+1} : \|x\| = 1\}$ n -te Einheitssphäre
- **Abgeschlossener Ball:** abgeschlossener r -Ball um x
 $B_r(x) := \{y \in X : d(x, y) \leq r\}$
- **Offener Ball:** offener r -Ball um x
 $B_r(x) := \{y \in X : d(x, y) < r\}$
- **Abstandserhaltende Abbildung:** $f : X \rightarrow Y$ sodass
 $\forall x, y \in X : d_Y(f(x), f(y)) = d_X(x, y)$.
(metrische Räume $(X, d_X), (Y, d_Y)$)
- **Isometrie:** bijektive abstandserhaltende Abbildung
 $\rightarrow X, Y$ isometrisch $\Leftrightarrow \exists$ Isometrie $f : (X, d_X) \rightarrow (Y, d_Y)$

Längenmetriken

GRAPHEN

- **Graph:** $G = (E, K)$
 - Eckenmenge E
 - Kantenmenge $K \subseteq \{\{u, v\} : u \neq v \in E\}$
- **Erreichbarkeit:** $p, q \in E$ erreichbar $\Leftrightarrow \exists$ Kantenzug zwischen p und q
- **Zusammenhängend** \Leftrightarrow alle Ecken von beliebiger, fester Ecke aus erreichbar
 $\rightarrow d(p, q) =$ kürzester Kantenzug zwischen p und q definiert Metrik

EUKLIDISCHE METRIK

- **Kurvenmenge:** $\Omega_{pq}(X \subseteq \mathbb{R}^n)$ Menge stetig db Kurven zwischen p und q
- **Euklidische Länge:** $L_{\text{euk}}(c) = \int_a^b \|c'(t)\| dt$ ($c \in \Omega_{pq}(\mathbb{R}^2)$)
 - unabhängig von Kurvenparametrisierung
 - invariant unter Translationen, Drehungen, Spiegelungen
- **Euklidische Metrik** auf \mathbb{R}^2 -Kurven: $d_{\text{euk}}(p, q) := \inf L_{\text{euk}}(c)$
($p, q \in \mathbb{R}^2, c \in$ Menge der stetig differenzierbaren Kurven zwischen p und q)
 $\rightarrow (\mathbb{R}^2, d_{\text{euk}}) = (\mathbb{R}^2, d_e)$

SPHÄRISCHE GEOMETRIE

- **Sphärische Länge:** $L_S(c) := \int_a^b \|c'(t)\| dt = \int_a^b \sqrt{x_1'^2 + x_2'^2 + x_3'^2} dt$
(für $c : [a, b] \ni t \mapsto (x_1(t), x_2(t), x_3(t)) \in S_R^2 \subset \mathbb{R}^3$)
 - invariant unter \mathbb{R}^2 -Rotationen
- **Großkreis:** Schnitt von S_R^2 und und 2-dimensionalen UVR des \mathbb{R}^2
- **Sphärenmetrik:** $d_S(p, q) := \inf L_S(c)$ ($c \in \Omega_{pq}(S_R^2)$)
 - Großkreise sind kürzeste Verbindungskurven zwischen Punkten in S_R^2
 - (S_R^2, d_S) ist metrischer Raum und isometrisch zu $(S_R^2, R * d_W)$

Grundbegriffe allg. Topologie

TOPOLOGISCHE RÄUME

- **Topologie:** $\mathcal{O} \subseteq \mathcal{P}(X)$ (Menge X) sodass
 - $X, \emptyset \in \mathcal{O}$
 - Durchschnitte *endlich* & Vereinigungen *beliebig* vieler Mengen aus \mathcal{O} in \mathcal{O}
- **Topologischer Raum:** (X, \mathcal{O})
 - *Offene Teilmengen* von X : Elemente von \mathcal{O}
 - *Abgeschlossene Teilmengen* $A \subset X$: $X \setminus A$ offen
- **Wichtige Topologien:**
 - *Triviale Topologie:* $\mathcal{O}_{\text{trivial}} := \{X, \emptyset\}$
 - *Diskrete Topologie:* $\mathcal{O}_{\text{diskret}} := \mathcal{P}(X)$
 - *Standard-Topologie* auf \mathbb{R} : $\mathcal{O}_s := \{I \subset \mathbb{R} : I = \text{Vereinigung offener Intervalle}\}$
 - *Zariski-Topologie:* $\mathcal{O}_Z := \{O \subset \mathbb{R} : O = \mathbb{R} \setminus E, E \subset \mathbb{R} \text{ endlich}\} \cup \{\emptyset\}$
 - *Induzierte Topologie* (Metrik):
 - $U \subset X$ *d-offen* $\Leftrightarrow \forall p \in U \exists \varepsilon = \varepsilon(p) > 0 : B_\varepsilon(p) \subset U$
 - *d-offene* Mengen bilden *induzierte Topologie*
 - *Teilraum-Topologie:* $\mathcal{O}_Y := \{U \subseteq Y : \exists V \in \mathcal{O}_X : U = V \cap Y\}$
(Topologischer Raum (X, \mathcal{O}_X) , Teilmenge $Y \subseteq X$)
 - *Produkttopologie:* Topologische Räume $(X, \mathcal{O}_X), (Y, \mathcal{O}_Y)$
 $W \subseteq X \times Y$ *offen* in *Produkttopologie* $\Leftrightarrow \forall (x, y) \in W \exists$ Umgebung U von x in X und V von y in Y , sodass $U \times V \subseteq W$
 - *Quotiententopologie:* (X, \mathcal{O}) topologischer Raum, $\pi : X \ni x \mapsto [x] \in X/\sim$
kanonische Projektion
 $\rightarrow U \subset X/\sim$ ist offen $\Leftrightarrow \pi^{-1}(U)$ ist offen in X .
- **Basis** für Topologie \mathcal{O} : $\mathcal{B} \subset \mathcal{O}$ sodass für jede offene Menge $\emptyset \neq V \in \mathcal{O}$ gilt
 $V = \bigcup_{i \in I} V_i, \quad V_i \in \mathcal{B}$
- **Umgebung** $U \subset X$ von $A \subset X$, falls $\exists O \in \mathcal{O} : A \subset O \subset U$
(Topologischer Raum (X, \mathcal{O}))
- **Innerer, äußerer Punkt** $p \in X$ von $A \subset X$, falls A (bzw. $X \setminus A$) Umgebung von $\{p\}$ ist
 \rightarrow *Inneres* von $A \subset X$: Menge $\overset{\circ}{A}$ der inneren Punkte von A
- **Abgeschlossene Hülle** von A : Menge $\bar{A} \subset X$, die *nicht* äußere Punkte sind
- **Triangulierbar:** falls \exists Simplicialkomplex K und Homö $K \rightarrow X$
 - $\chi(X) := \chi(K)$

HAUSDORFFSCHES TRENNUNGSAXIOM

- **Hausdorffsch** (top. Raum (X, \mathcal{O})): $\forall p \neq q \in X \exists U \ni p, V \ni q : U \cap V = \emptyset$
(Umgebungen U, V)
- **Hausdorffsche Räume:**
 - Metrische Räume (über Dreiecks-Ugl.)
 - $(\mathbb{R}, \mathcal{O}_s)$, weil \mathcal{O}_s von Metrik induziert wird
 - Teilraum von Hausdorff-Raum
 - Produkt von Hausdorff-Räumen bzgl. Produkttopologie

STETIGKEIT

- **Stetigkeit** (zwischen top. Räumen $(X, \mathcal{O}_X), (Y, \mathcal{O}_Y)$): $f : X \rightarrow Y$ stetig falls Urbilder offener Mengen in Y offen sind in X
- **Homöomorphismus** (zw. top. Räumen): $f : X \rightarrow Y$ bijektiv mit f, f^{-1} stetig
 $\rightarrow X, Y$ *homöomorph*, falls \exists Homö $f : X \rightarrow Y$ (schreibe $X \cong Y$)
 - *Homöomorphismengruppe:* Identität, Verkettungen, Inverse von Homö sind Homö
 \rightarrow Gruppe
- **Wichtige Homöomorphismen:**
 - $[0, 1] \cong [a, b]$ ($a < b \in \mathbb{R}$)
 - $S^n \setminus \{(0, \dots, 0, 1)\} \cong \mathbb{R}^n$ (also S^n ohne “Nordpol”)

ZUSAMMENHANG

- **Definition:** (X, \mathcal{O}) zusammenhängend, falls \emptyset und X die einzigen offen-abgeschlossenen Teilmengen sind
 $\Leftrightarrow X$ ist *nicht* disjunkte Vereinigung von 2 offenen, nichtleeren Mengen
- **Eigenschaften:**
 - A zusammenhängend $\Rightarrow \bar{A}$ ist zusammenhängend
 - A, B zusammenhängend, $A \cap B \neq \emptyset \Rightarrow A \cup B$ zusammenhängend

ZUSAMMENHANGSKOMPONENTE

- **Definition:** $Z(x) =$ Vereinigung aller zusammenhängender Teilmengen, die x enthalten
- **Eigenschaften:**
 - $Z(X) =$ disjunkte Zerlegung von X
 - Elemente von $Z(X) =$ zusammenhängend

WEG-ZUSAMMENHANG

- **Definition:** (X, O) weg-zusammenhängend
 $\Leftrightarrow \forall p, q \in X \exists \text{Weg } \alpha : [0, 1] \rightarrow X : \alpha(0) = p \wedge \alpha(1) = q$
- **Eigenschaften:**
 - X weg-zusammenhängend $\Rightarrow X$ zusammenhängend
 - Stetige Bilder von (weg-)zusammenhängenden Räumen sind es auch
 - Ein (nicht) zusammenhängender Raum kann nur zu einem (nicht) zusammenhängenden Raum homöomorph sein

KOMPAKTHEIT

- **Definition:** (X, O) kompakt \Leftrightarrow jede offene X -Überdeckung besitzt *endliche* Teilüberdeckung:
$$X = \bigcup_{i \in I} U_i, \ U_i \text{ offen} \Rightarrow \exists i_1, \dots, i_k \in I : X = U_{i_1} \cup \dots \cup U_{i_k}$$
- **Lokal kompakt:** Jeder Punkt von X besitzt kompakte Umgebung
- **Eigenschaften:**
 - Man kann von lokale auf globale Eigenschaften schließen $\rightarrow X$ kompakt, $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ lokal beschränkt $\Rightarrow f$ beschränkt
 - Stetige Bilder kompakter Räume sind kompakt
 - Abgeschlossene Teilräume kompakter Räume sind kompakt
 - Produkte kompakter Räume sind kompakt
 - Kompakte Mengen in Hausdorff-Räumen sind abgeschlossen

Spezielle Topologien

TOPOLOGISCHE MANNIGFALTIGKEIT

- **Definition:** topologischer Raum M mit
 1. *lokal euklidisch:* $\forall p \in M \exists$ offene Umgebung U von p und Homöomorphismus $\varphi : U \rightarrow \varphi(U) \subset \mathbb{R}^n$ mit festem n
 \rightarrow **Karte** (φ, U)
 \rightarrow **Atlas** $\mathcal{A} = \{(\varphi_\alpha, U_\alpha) : \alpha \in A\}$ (mit $\bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha = M$)
 2. M ist hausdorffsch
 3. M -Topologie besitzt abzählbare Basis
- **Eigenschaften:**
 - **Dimension** der Mannigfaltigkeit $= n$
 - **Geschlecht** der Mannigfaltigkeit $=$ Anzahl
 - Offene Teilmengen einer Mannigfaltigkeit sind auch Mannigfaltigkeiten
- **Produkt-Mannigfaltigkeit:** Produkt zweier MF ist auch MF
 - Dimension Produkt-MF = Summe der Dimensionen der beiden MF

DIFFERENZIERBARE MANNIGFALTIGKEIT

- **Kartenwechsel:** Homöomorphismus
$$\underbrace{\psi \circ \varphi^{-1} : \varphi(D) \rightarrow \psi(D)}_{\subset \mathbb{R}^n} \quad (\text{topologische MF } M, p \in M)$$
- C^∞ -**Atlas** \mathcal{A} von M : alle mögl Kartenwechsel sind C^∞ -Abbildungen (\mathbb{R}^n)
- C^∞ -**Struktur:** maximaler C^∞ -Atlas für topologische MF
- **Differenzierbare Mannigfaltigkeit:** topologische MF mit C^∞ -Struktur
 - *orientierbar*, falls \exists Atlas S , sodass alle Kartenwechsel positive Funktionsdeterminante haben
- **Punkt-Differenzierbarkeit:** $F : M^m \rightarrow N^n$ differenzierbar in $p \in M$, falls
$$\underbrace{\psi \circ F \circ \varphi^{-1} : \varphi(U) \rightarrow \psi(V)}_{\subset \mathbb{R}^n} \text{ ist } C^\infty \text{ in } \varphi(p)$$

(M^m, N^n d-bare M; F stetig; $(U, \varphi), (V, \psi)$ Karten um p und $F(p)$)
- **Differenzierbarkeit:** F differenzierbar, falls F in allen $p \in M$ d-bar ist
- **Difféomorphismus** zwischen dMF: F bijektiv, F d-bar, F^{-1} d-bar
- **Fläche:** 2-dimensionale MF
- **Produkt-Mannigfaltigkeit:** M^m, N^n dMFen $\rightarrow M \times N$ ist $(m+n)$ -dim dMF
- **Lie-Gruppe:** Gruppe mit C^∞ -Mannigfaltigkeitsstruktur, sodass
 $G \times G \rightarrow G, (g, h) \mapsto gh^{-1}$ in C^∞ ist
 - Abgeschlossene Untergruppen von Lie-Gruppen sind auch Lie-Gruppen

SIMPLIZIALKOMPLEXE

- **Simplex** (k -dimensional): konvexe Hülle von $k + 1$ Punkten in \mathbb{R}^n :
$$s(v_0, \dots, v_k) = \left\{ \sum_{i=0}^n \lambda_i v_i : \forall \lambda_i \geq 0, \sum_{i=0}^k \lambda_i = 1 \right\}$$

($v_0 - v_1, \dots, v_0 - v_k$ linear unabhängig)
- **Teilsimplex, Seite:** konvexe Hülle einer Teilmenge von $\{v_0, \dots, v_k\}$
- **Simplizialkomplex:** endliche Menge K von Simplexes in \mathbb{R}^n , sodass
 1. Für jeden Simplex enthält K auch alle Teilsimplices
 2. Durchschnitt zweier Simplexes ist \emptyset oder gemeinsamer Teilsimplex
 - *Dimension:* maximale Dimension seiner Simplexes
 - *Euler-Charakteristik:* $\chi(K) = \sum_{i=0}^k (-1)^i \alpha_i$ ($\alpha_i = \#i$ -Simplexes in K)

- **Endlicher Graph:** endlicher, 0- oder 1-dimensionaler Simplicialkomplex
 - *zusammenhängend:* $\forall p, p' \in G \exists p = p_0, p_1, \dots, p_n = p',$ sodass p_{i-1} und p_i durch Kante verbunden sind
 - *Baum:* zusammenhängender Graph T , sodass für jeden 1-Simplex $s \in T : T \setminus \overset{*}{s}$ ist nicht zusammenhängend ($\overset{*}{s}$ = Kante ohne Endpkte, offener 1-Simplex)
- **Euler-Charakteristik:** $\chi(G) = \# \text{Ecken} - \# \text{Kanten}$
 - *Baum:* $\chi(T) = 1$
 - *Zusammenhängender Graph:* $\chi(G) = 1 - n$ ($n = \#$ Kanten, die man aus G entfernen kann, sodass G zusammenhängend bleibt)
- **Spannender Baum** (von zusammenhängendem Graph): Komplement aller Kanten, die man entfernen kann, sodass G zusammenhängend bleibt
- **Ebener Graph:** realisiert durch Punkte und Geraden in \mathbb{R}^2 , sodass Kanten sich nicht schneiden
 - *Seiten:* Zusammenhangskomponenten von $\mathbb{R}^2 \setminus G$
- **Planarer Graph:** Graph, der isomorph zu einem ebenen Graphen ist
- **Euler-Formel:** für zusammenhängende, ebene Graphen G gilt:
$$\chi(G) = e(G) - k(G) + s(G) = 2$$
- **Polyeder:** $P \subset \mathbb{R}^3$ mit
 1. P ist Durchschnitt endlich vieler affiner Halbräume von \mathbb{R}^3
(affine Halbräume gegeben durch $a_i x + b_i y + c_i z \geq d_i, i = 1, \dots, k$)
 2. P ist beschränkt und nicht in einer Ebene enthalten
 - *Rand:* Gegeben durch (Seiten-)Flächen, Kanten und Ecken
 - *1-Skelett:* Menge der Ecken und Kanten, ist Graph in \mathbb{R}^3
 - *Schlegel-Diagramm:* Projektion von Punkt nahe bei einem Seitenmittelpunkt auf geeignete Ebene; 1-Skelett \rightarrow ebener Graph
 - *Eulersche Polyeder-Formel:* $e(P) - k(P) - s(P) = 2$
 - *regulär:* falls
 1. alle Seitenflächen kongruente reguläre n -Ecke sind und
 2. in jeder Ecke m solcher n -Ecke zusammentreffen

VERKLEBEN

- **Verklebung:** X, Y topologische Räume, $A \subset X$ Teilraum, $f : A \rightarrow Y$. Äquivalenzrelation auf $X \sqcup Y$ via f :
$$x \sim x' \stackrel{\text{Def}}{\Leftrightarrow} \begin{cases} x = x' \\ \text{oder } f(x) = x' \ (x \in A) \\ \text{oder } f(x') = x \ (x' \in A) \\ \text{oder } f(x) = f(x') \ (x, x' \in A) \end{cases}$$

 \Rightarrow Quotientenraum $X \cup_f Y = X \sqcup Y / \sim$ ist *Verklebung* von X an Y via f
- **Selbstverklebung:** Topologischer Raum X , Teilraum $A \subset X, f : A \rightarrow X, X_f := X / \sim$ mit Äquivalenzrelation wie oben

Flächengeometrie

REGULÄRE \mathbb{R}^3 -FLÄCHEN

- **Reguläre Fläche:** $S \subset \mathbb{R}^3$ (mit Teilraum-Topologie von \mathbb{R}^3), falls $\forall p \in S$ eine Umgebung V von p und ex. eine Abbildung
$$\underbrace{F : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow V \cap S}_{\text{offen}} \subset \mathbb{R}^3$$

$$(u, v) \mapsto (x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \quad \text{mit}$$
 1. F ist differenzierbarer Homöomorphismus
 2. das Differenzial (Jacobi-Matrix) von F ,
$$dF_q : \mathbb{R}^2 \supseteq T_q U \rightarrow T_{F(q)} \mathbb{R}^3$$

ist injektiv (hat Rang 2) ($\forall q \in U$)
- **Lokale Parametrisierung** von reg. Fläche S : F von der regulären Fläche
- **Vektorprodukt:** $a \wedge b = (a_2 b_3 - a_3 b_2, a_3 b_1 - a_1 b_3, a_1 b_2 - a_2 b_1)$
 - $(a \wedge b) \perp a, \ (a \wedge b) \perp b$
 - $\|a \wedge b\| = \|a\| * \|b\| * \sin \alpha$
- **Tangentialraum** in $p \in \mathbb{R}^3$: affiner Unterraum $T_p \mathbb{R}^3 = \{p\} \times \mathbb{R}^3$
- **Tangentialebene** für $p = x(u, v) \in S$ (reguläre Fläche):
$$T_p S = dx_{(u,v)}(T_{(u,v)} \mathbb{R}^2) = \{p\} \times [x_u(u, v), x_v(u, v)] \subset T_p \mathbb{R}^3$$

ERSTE FUNDAMENTALFORM

- **Erste Fundamentalform** einer regulären Fläche S :
$$\begin{pmatrix} E(u, v) & F(u, v) \\ F(u, v) & G(u, v) \end{pmatrix} \quad \text{mit}$$
$$E(u, v) = \langle x_u(u, v), x_u(u, v) \rangle$$
$$F(u, v) = \langle x_u(u, v), x_v(u, v) \rangle$$
$$G(u, v) = \langle x_v(u, v), x_v(u, v) \rangle$$
- **Längen:** Flächenkurve $x : [\alpha, \beta] \ni t \mapsto x(u(t), v(t)) =: c(t) \in S$.
$$L(c) = \int_\alpha^\beta \sqrt{E(u, v)(u')^2 + F(u, v)2u'v' + G(u, v)(v')^2} dt$$

- **Winkel:** Flächenkurven

$$c_1 : (-\varepsilon, \varepsilon) \ni t \mapsto (u_1(t), v_1(t)) \in S,$$

$$c_2 : (-\varepsilon, \varepsilon) \ni t \mapsto (u_2(t), v_2(t)) \in S,$$

$$c_1(0) = c_2(0). \cos \angle(c_1'(0), c_2'(0)) =$$

$$\frac{Eu_1'u_2' + F(u_1'v_2' + v_1'u_2') + Gv_1'v_2'}{\sqrt{Eu_1'^2 + 2Fu_1'v_1' + Gv_1'^2} \sqrt{Eu_2'^2 + 2Fu_2'v_2' + Gv_2'^2}}$$

- **Flächeninhalt** von $x(U) \subset S \subset \mathbb{R}^2$:

$$A(x(U)) = \iint_U \sqrt{\det I} \, dudv$$

(LOKALE) FLÄCHENISOMETRIEN

- **Reguläre Fläche = metrischer Raum:** Längenmetrik auf S durch

$$d_S(p, q) = \inf L(c)$$

- **(Flächen-)Isometrie** $f : S \rightarrow \tilde{S}$, falls

1. f ist Diffeomorphismus und

2. $\forall (c : I \rightarrow S) : L(f \circ c) = L(c)$ (“ f ist längenerhaltend”)

- **Lokale Isometrie** $f : S \rightarrow \tilde{S}$, falls $\forall p \in S \ni$ offene Umgebungen A von p und B von $f(p)$, sodass f Isometrie von A nach B ist

- **Kriterium lokale Isometrie:** $x : U \rightarrow x(U) \subset S, \tilde{x} : U \rightarrow \tilde{x}(U) \subset \tilde{S}$ sodass

$$\forall (u, v) \in U : \left(\begin{smallmatrix} E & F \\ F & G \end{smallmatrix} \right) (u, v) = \left(\begin{smallmatrix} \tilde{E} & \tilde{F} \\ \tilde{F} & \tilde{G} \end{smallmatrix} \right) (u, v),$$

so sind $x(U)$ und $\tilde{x}(U)$ isometrisch

ZWEITE FUNDAMENTALFORM

- **Normalenvektor:** für Parametrisierung $x : U \ni (u, v) \mapsto x(u, v) \in S$

$$n(p) = n(x(u, v)) = n(u, v) = \frac{x_u(u, v) \wedge x_v(u, v)}{\|x_u(u, v) \wedge x_v(u, v)\|}$$

ist Einheitsvektor senkrecht zu $T_p S$ ($\forall p \in x(U) \subset S$)

- **Zweite Fundamentalform** für Parametrisierung $x : U \rightarrow S$:

$$\left(\begin{smallmatrix} L(u, v) & M(u, v) \\ M(u, v) & N(u, v) \end{smallmatrix} \right) := \left(\begin{smallmatrix} \langle x_{uu}, n \rangle & \langle x_{uv}, n \rangle \\ \langle x_{vu}, n \rangle & \langle x_{vv}, n \rangle \end{smallmatrix} \right)$$

GAUSS-KRÜMMUNG

- **Gauß-Krümmung:** $K : S \ni p \mapsto K(p) = \frac{\det II_p}{\det I_p}$

◦ K ist Größe der inneren Geometrie von S

- **Bertrand-Puiseux** ($p \in S$): Für hinreichend kleine $r > 0$ ist

$$S_r(p) = \{q \in S : d(p, q) = r\}$$

eine geschlossene, d-bare Kurve, Länge $L(S_r(p))$. Dann gilt:

$$K(p) = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{3}{\pi r^3} (2\pi r - L(S_r(p)))$$

GAUSS-BONNET — LOKAL

- **Kovariante Ableitung** von a nach u :

$$D_u a = a_u - \langle n, a_u \rangle n \quad (= a_u + \langle n_u, a \rangle n)$$

(lok Parametrisierung $x : U \rightarrow S$, tangentiales Vektorfeld $a : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ auf S)

\Rightarrow Komponente von a_u in Tangentialrichtung

- **Geodätische Krümmung** $\kappa_g(s)$: Krümmung der in Tangentialebene projizierten Kurve

$$c''(s) = 0 * c'(s) + \kappa_g(s)(n(s) \wedge c'(s)) + \alpha(s)n(s)$$

- **Satz von Gauß-Bonnet — lokal:**

$$\int_{\delta G} \kappa_g(s) ds + \iint_G K dA = 2\pi \quad \text{mit}$$

1. S reguläre Fläche

2. $x : U \rightarrow S$ lokale Parametrisierung

3. $G \subseteq x(U) \subset S$ einfach zusammenhängendes Gebiet mit d-barem Rand δG

4. $s \mapsto (u(s), v(s))$ beschreibe $x^{-1}(\delta G) \subset U$

- **Geodätische:** Flächenkurve mit $\kappa_g = 0$ (“Gerade” auf krummer Fläche)

GAUSS-BONNET — MIT ECKEN

$$\iint_G K dA + \int_{\delta G} \kappa_g ds = \pi(2 - m) + \sum_{i=1}^m \alpha_i$$

(Ecken $1, \dots, m$ mit Innenwinkel α_i)

GAUSS-BONNET — GLOBAL

- **Klassifikationssatz für 2-MF:** Kompakte randlose 2-MF ist homöomorph zu
 1. einer Sphäre S^2 oder
 2. einer zusammenhängenden Summe von g Tori (falls M orientierbar) oder
 3. einer zusammenhängenden Summe von g projektiven Ebenen (sonst)

- **Geschlecht:** g von oben

- **Euler-Charakteristik** von M -Triangulierung:

$$\chi_T(M) = \# \text{Ecken} - \# \text{Kanten} + \# \text{Flächen}$$

◦ $\chi(M) = \chi_T(M)$ unabhängig von Triangulierung

$$\circ \chi_T(M) = 2 - 2g$$

- **Globaler Satz von Gauß-Bonnet:**

$$\iint_S K dA = 2\pi \chi(S)$$

($S \subset \mathbb{R}^3$ kompakte randlose orientierbare Fläche)

Hyperbolische Ebene

OBERE HALBEBENE

- **Definition:** $H^2 = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_2 > 0\}$

- **Punkte:** Elemente in H^2

- **Geraden:** Halbkreise mit Zentrum auf x_1 -Achse + Parallelen zur x_2 -Achse

RIEMANNSCHE METRIK

- **Tangentialraum:** $T_p M =$ Menge von Äq-Klassen von db Kurven durch $p \in M$

- **Riemannsche Metrik** auf d-barer MF: Familie von Skalarprodukten $\langle \cdot, \cdot \rangle_p$ auf $T_p M$, die d-bar von p abhängt

EBENE HYPERBOLISCHE GEOMETRIE

- **Modell:** $H^2 = \{z \in \mathbb{C} : \text{Im}(z) > 0\}$ mit hyperbolischer riemannscher Metrik

$$g_{ij} = \begin{pmatrix} 1/y^2 & 0 \\ 0 & 1/y^2 \end{pmatrix}$$

- **Hyperbolische Länge** (mit $c(t) = z(t) = x(t) + iy(t)$):

$$L_h(c) = \int_a^b \|c'\|_H dt = \int_a^b \frac{\sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}}{y(t)} dt = \int_a^b \frac{|z'(t)|}{y(t)}$$

- **Möbius-Transformation** von $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \text{SL}(n, \mathbb{R})$:

$$T_A : H^2 \ni z \mapsto \frac{az + b}{cz + d} \in H^2$$

◦ hyperbolische Länge einer d-baren H^2 -Kurve ist invariant unter MT

- **Hyperbolische Längenmetrik:** (Ω_{pq} stückw. db Kurven in H^2 zw p und q)

$$d_h(p, q) = \inf_{c \in \Omega} L_k(c)$$

◦ (H^2, d_h) ist metrischer Raum

◦ Möbius-Transformationen $\{T_A : A \in \text{SL}(2, \mathbb{R})\}$ sind Isom. von (H^2, d_h)

◦ (H^2, d_h) ist *homogen*: $\forall p, q \in H^2 \ni \text{Iso } T_A : T_A(p) = q$

◦ Streckungen sind Isometrien in H^2 (mit $A = \begin{pmatrix} \sqrt{\lambda} & 0 \\ 0 & 1/\sqrt{\lambda} \end{pmatrix}$)
 $\Rightarrow d_h(z, w) = d_h(\lambda z, \lambda w)$

GEODÄTISCHE

- **Geodätische** zw Punkten in H^2, d_h : parametrisierte Halbkreise und Geraden orthogonal zur reellen Achse \Rightarrow Halbkreise haben Zentrum auf reeller Achse

$\Rightarrow \forall p, q \in H^2$ können durch eindeutige Geodätische verbunden werden;

$d_h(p, q) = \text{hyp. Länge dieser Geodätischen}$

GAUSS-BONNET

- **Hyperbolischer Flächeninhalt** für $A \subset H^2$:

$$\mu(a) = \iint_A \sqrt{\det(g_{ij}(z))} dx dy = \iint_A \frac{1}{y^2} dx dy \leq x$$

◦ Flächeninhalt invariant unter Isometrien (also Möbius-Transformationen)

- **Hyperbolisches Polygon** mit n Seiten: Abgeschlossene Teilmenge von

$$\bar{H}^2 = H^2 \cup (\mathbb{R} \cup \{\infty\})$$

◦ *Seiten:* geodätische Segmente, die Polygon begrenzen

◦ *Ecken:* Stelle, an der sich genau zwei Seiten schneiden

- **Hyperbolische Winkelmessung:** wie im Euklidischen

- **Gauß-Bonnet:** Flächeninhalt eines hyp. Δ ist durch Winkel vollständig bestimmt: $\mu(\Delta) = \pi - \alpha - \beta - \gamma \leq \pi$

KRÜMMUNG

- **Einheitsscheibe:** $D^2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1\} = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$

◦ *Metrik* auf D^2 mit $M : H^2 \ni z \mapsto \frac{iz+1}{z+i} \in D^2$ durch

$$d_h^*(z, w) = d_h(M^{-1}(z), M^{-1}(w))$$

- **Krümmung** für Längenraum:

$$K(p) = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{3}{\pi \rho^3} (2\pi \rho - L(S_\rho(0)))$$

◦ Krümmung von D^2 (und damit auch H^2) ist konstant -1 (nutzt

$L_{h^*}(S_\rho(0)) = 2\pi \sinh(\rho)$ für hyp. Kreis mit Radius ρ , Zentrum 0)