




เรื่องต้องรู้...

การติดเชื้อ

HIV


เชื้อ HIV ติดทางใด

การติดเชื้อที่พบบ่อยที่สุด คือ การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันทางอื่น ๆ ได้แก่ การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน และการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกในครรภ์



การอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อ HIV มีโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อ HIV หรือไม่

เชื้อ HIV ไม่สามารถติดต่อกันได้ทางลมหายใจ การสัมผัสทางกาย รวมถึงเหงื่อ น้ำตา น้ำลาย จึงไม่ติดต่อผ่านการใช้ชีวิตประจำวันร่วมกันโดยปกติ



ควรตรวจหาเชื้อ HIV ได้เมื่อไหร่

แนะนำให้ตรวจหลังมีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันประมาณ 2 สัปดาห์ และยืนยันอีกครั้งที่ 1 เดือนขึ้นไป



หากผลเลือดบวก ต้องทำอย่างไรต่อ

ควรตรวจเลือดซ้ำอีกครั้งเพื่อยืนยันผล พร้อมตรวจหาค่า CD4 เพื่อดูปริมาณภูมิคุ้มกันในร่างกาย และพบแพทย์เพื่อพิจารณาเริ่มยาต้าน HIV โดยเร็วที่สุดหากไม่มีข้อห้าม นอกจากนี้แนะนำให้ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ ร่วมด้วย ซึ่งจำเป็นในการวางแผนการรักษาต่อไป

