


การมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก (ANAL SEX)

- ความเสี่ยงเนื้อเยื่อบริเวณเยื่อบุลำไส้ตรงและทวารหนักมีความบอบบาง ขาดความยืดหยุ่น และไม่มีสารหล่อลื่นตามธรรมชาติเหมือนช่องคลอด จึงเกิดบาดแผลฉีกขาดขนาดเล็กได้ง่ายมาก ทำให้ช่องทางนี้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ HIV สูงที่สุด นอกจากนี้ยังเสี่ยงต่อโรคหนองใน ซิฟิลิส เริม และไวรัสตับอักเสบบีด้วย

วิธีป้องกัน




สวม ถุงยางอนามัย ทุกครั้ง



ต้องใช้ควบคู่กับ สารหล่อลื่นสูตรน้ำ หรือสูตรซิลิโคน เสมอ เพื่อลดการเสียดสี ป้องกันอาการบาดเจ็บ และป้องกันไม่ให้ถุงยางฉีกขาด



ข้อควรระวัง ห้ามใช้สารหล่อลื่นที่มีส่วนผสมของน้ำมัน (เช่น วาสลีน, เบบี้ออยล์, น้ำมันมะพร้าว, โลชั่นทาผิว) เด็ดขาด เพราะน้ำมันจะไปละลายยางพารา ทำให้ถุงยางอนามัยเสื่อมสภาพและแตกในเวลาเพียงไม่กี่นาที




การมีเพศสัมพันธ์ทางปาก (ORAL SEX)



- แม้โอกาสติดเชื้อ HIV จะต่ำกว่าช่องทางอื่น แต่มีความเสี่ยงสูงในการติดโรคอื่นๆ เช่น เริม (HERPES), หนองในแท้ และหนองในเทียม, ซิฟิลิส, และเชื้อ HPV

วิธีป้องกัน



สวม ถุงยางอนามัย เมื่อทำออรัลเซ็กส์ให้กับอวัยวะเพศชาย



ใช้แผ่นยางอนามัย เมื่อทำออรัลเซ็กส์ให้กับอวัยวะเพศหญิงหรือทวารหนัก (หากไม่มีแผ่นยาง สามารถนำถุงยางอนามัยมาตัดส่วนหัวทิ้งแล้วผ่าตามแนวยาวเพื่อกางเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมแทนได้)

