

ยาคุมกำเนิด

ฉุกเฉิน

กินอย่างไร ?

เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ภายหลังจาก
การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกัน



ช่วยป้องกันการตั้งครรภ์
หากกินยาภายในระยะเวลา
ที่กำหนดตามชนิดของยา

เหมาะกับใคร ?

- มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน
- ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
- เมื่อวิธีคุมกำเนิดที่ใช้ผิดพลาด เช่น
ถุงยางอนามัยฉีกขาดหรือเลื่อนหลุด,
ห่วงอนามัยหลุด เป็นต้น

อาการข้างเคียง !

บางรายอาจมีเลือดกะปริดกะปรอย
นาน 1-2 วัน หลังกินยาคุมกำเนิดหลังร่วมเพศ

ผลข้างเคียงที่อาจพบได้
หลังจากกินยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน

- คลื่นไส้
- ปวดท้อง
- อ่อนเพลีย
- ปวดศีรษะ
- คัดตึงเต้านม
- อาเจียน

สิทธิฟรี

- หญิงวัยเจริญพันธุ์
- รับได้ ไม่เกิน 2 แผง /คน/ปี

ขอรับผ่าน **แอปเป๋าตัง**



แอปเป๋าตัง > กระเป๋าสุขภาพ > สิทธิประโยชน์
> การคุมกำเนิด > ยาเม็ดการคุมกำเนิดฉุกเฉิน
> ค้นหาหน่วยบริการ > โทรนัดหมายเพื่อรับยา

ข้อควรจำ

ไม่ควรกินยาคุมกำเนิดฉุกเฉินเป็นประจำ

