

完整140条与续跑：当前结论

已完成140/140，合格事件15,049。续跑快照：29条新运行+12条复用。

参数—观测响应成立；患者双模式恢复尚未成立。


左移0.75mm改善TA参与和顺序，但TB跨杆时差仍约35ms，患者约1ms。
EE×EI组合从漏招募走向过度招募，值得在中间区间补点，并跨网络复测。
扩大core可降低部分训练分数，但不能由此认定两模式恢复。

每条线固定网络和噪声；每点为60秒运行统计。标签比例与模式内分布分开。
患者黑底为真实STFT，模型为发放包络；原生场GIF另列，15行按杆固定。

下一批：18条件×3网络×2新噪声=108条，当前续跑结束后自动接上。
保持既定阈值、噪声和loss定义；不自动冻结模型或进入Fig5。


完整数值、前提和来源：同目录scientific_report.md与逐运行CSV。

圆核：连接参数有相互作用，TB 时差尚未恢复



固定同一网络2511和核位置；颜色=核内EI倍率，横轴=向外EE倍率，线型/点形=噪声。每点为独立60秒运行的统计。
时差：每事件两杆内参与触点质心中位数之差，再取该类事件中位数；负值表示SCL较早。
患者参考来自完整自然比例FIT。连线表示参数响应，不代表单个事件轨迹；只有一张网络，尚不能称为全局效应。









左核椭圆4:1：连接参数有相互作用，TB 时差尚未恢复



固定同一网络2511和核位置；颜色=核内EI倍率，横轴=向外EE倍率，线型/点形=噪声。每点为独立60秒运行的统计。
时差：每事件两杆内参与触点质心中位数之差，再取该类事件中位数；负值表示SCL较早。
患者参考来自完整自然比例FIT。连线表示参数响应，不代表单个事件轨迹；只有一张网络，尚不能称为全局效应。


在向外EE增强25%的圓核工作点附近，左移有局部改善；TB仍有缺口

● 噪声847101 ▲ 噪声847102 患者FIT参考



同一网络2511、两次噪声分别配对；y、半径、阈值和连接参数不变，但平移会改变实际成员与邻接。
顺序误差：两触点共同参与时，先后概率与患者之差的绝对值，再在可比较触点对上等权平均；0只表示该摘要完全匹配。
这些是开发数据中的响应，不是已确认的最优位置。下一批将用两张新网络和两条新噪声复测左移及直接对照。


完整新拓扑确认：扩大半径的收益依赖阈值总量，仍不能等同于传播恢复




原140条中的4个确认单元，全部完成后纳入；每条线固定网络和噪声。横轴是离散干预，不是连续梯度。
半径扩大同时改变易激神经元数、随机输入支持和连接分块；匹配阈值降低总量仍未匹配随机输入总量。
少数模式事件数较少的运行仅显示观测支持，不把未出现或不稳定摘要直接判为机制不可能。

圆核：向外E→E增强25%，左核向左移动0.75mm
模型示例来自原合格孤立窗；固定15行：SCL9-6，然后ICL11-1，未参与触点保留原位
各例仅平移时间零点；浅灰=记录窗外，深灰=未参与；无时间拉伸


患者 TA · Fig2C 事件 6344
真实 STFT 幅度




模型 TA · 噪声 847101
发放密度包络；事件 182, n=68




模型 TA · 噪声 847102
发放密度包络；事件 35, n=76



患者 TB · Fig2C 事件 937
真实 STFT 幅度



模型 TB · 噪声 847101
发放密度包络；事件 138, n=72



模型 TB · 噪声 847102
发放密度包络；事件 102, n=66

