

# Organizační úvod

*Poznámka*

## 1 Úvod

### Definice 1.1 (Diferenciální rovnice)

Diferenciální rovnice je rovnice, která obsahuje derivaci.

*Poznámka* (Motivace)

Fyzika (např. pružina:  $m \cdot \ddot{x} = -k \cdot x$ ), ekonomie (např. rovnice majetku?:  $k' = \alpha \cdot k - c(t)$ ), biologie (např. model dravec-kořist:  $d' = \alpha \cdot d \cdot k - \beta \cdot d \wedge k' = \gamma \cdot k - \delta \cdot d \cdot k$ ).

*Poznámka* (Co nás zajímá na DR)

Přesné řešení (často neumíme spočítat), existence a jednoznačnost řešení, jaké vlastnosti má řešení.

*Poznámka* (Předpoklady)

$\Omega \subset \mathbb{R}^{n+1}$  otevřená,  $(x, t) \in \Omega \subset \mathbb{R}^n \times I$ ,  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ ,  $x' = f(x, t)$ .  $I \subset \mathbb{R}$ .

### Definice 1.2 (Obyčejná diferenciální rovnice, řešení)

Obyčejná diferenciální rovnice je rovnice  $x' = f(x, t)$  z předchozí poznámky.

Funkce  $x : I \rightarrow \mathbb{R}^n$  je řešení DR, jestliže

- $\forall t \in I : (x(t), t) \in \Omega$ ,
- $\forall t \in I$  existuje vlastní derivace  $x'(t)$ ,
- $\forall t \in I$  platí  $x'(t) = f(x(t), t)$ .

┌  
*Poznámka*

└ První dvě podmínky jsou jen existenční podmínky k rovnici ve třetím bodě.

Typicky má DR nekonečně mnoho řešení, přidáváme proto počáteční podmínku  $(x_0, t_0) \in \Omega$ ,  $t_0 \in I$ .

### Lemma 1.1

Nechť  $\Omega \subset \mathbb{R}^{n+1}$  otevřená,  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$  spojitá a  $x : I \rightarrow \mathbb{R}^n$  spojitou a takovou, že graf  $x$  ( $\{(x(t), t) | t \in I\}$ ) leží v  $\Omega$ . Pak následující tvrzení jsou ekvivalentní:

- $x$  je řešení DR s počáteční podmínkou  $x(t_0) = x_0$ ;
- $x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(x(s), s) ds \quad \forall t \in I$ .

┌

Důkaz

„ $\implies$ “:  $x$  a  $f$  je spojitá, tedy  $x' = f(x(t), t)$  je spojitá, tj.  $x \in C^1(I) \implies \int_{t_0}^t x'(s) ds = x(t) - x(t_0)$ .

„ $\impliedby$ “: jelikož  $f$  i  $s$  je spojitá, tak integral je diferencovatelný a  $x(t)$  je spojitá, tedy

$$x'(t) = 0 + f(x(t), t) \wedge x(t_0) = t_0 + 0.$$

└

□

### Věta 1.2 (Peanova věta o lokální existenci)

Nechť  $\Omega \subset \mathbb{R}^{n+1}$  otevřená,  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$  spojitá a  $(x_0, t_0) \in \Omega$ . Potom  $\exists \delta > 0$  a funkce  $x : B(t_0, \delta) \rightarrow \mathbb{R}^n$  taková, která je řešením DR a splňuje počáteční podmínku. (Stačí spojitá  $f$  a kompaktní  $\Omega$ .)

### **Tvrzení 1.3** (Pomocné tvrzení)

Pokud  $\Omega = \mathbb{R}^{n+1}$  a  $f$  je omezená na  $\Omega$ , pak  $\forall T$  existuje řešení DR  $x$  na  $[t_0 - T, t_0 + T]$  splňující počáteční podmínku.

┌

*Důkaz*

Když  $x_\lambda$  je definována na  $[t_0 - \lambda, t]$ , pak pravá strana má smysl  $\forall t \in [t_0, t_0 + \lambda]$  tím pádem pravá strana integrálního tvaru má smysl  $\forall t \in [t_0, t_0 + \lambda]$ , tím pádem definujeme  $x_\lambda$  na  $[t_0 - \lambda, t_0 + \lambda]$ .

Nyní definujme  $M := \{x_n|_{[t_0, t_0+T]}\}_{n=1}^\infty$  a ověříme, že  $M$  splňuje podmínky Arzela-Ascoliho věty:

$$|x_\lambda(t)| \leq |x_0| + \int_{t_0}^t |f(x_\lambda(s - \lambda))| ds \leq |x_0| + \|f\|_\infty \cdot |t - t_0| \leq |x_0| + \|f\|_\infty \cdot T,$$

$$|x_\lambda(t) - x_\lambda(\tau)| = \left| \int_\tau^t f(x_\lambda(s - \lambda), s) ds \right| \leq \|f\|_\infty \cdot |t - \tau|.$$

Podle AA věty tedy existuje podposloupnost  $M$ , která konverguje stejnoměrně. Limitu si označme  $x$ , podposloupnost  $x_{n_k}$ .

Chceme dokázat, že  $x$  je řešení DR: TODO!!!

$$\lambda_k := \frac{1?}{n_k}$$

└

□

┌

*Důkaz*

Pro  $\overline{K_1} \subset K_2$ ,  $\overline{K_2} \subset \Omega$ ,  $(x_0, t_0) \in K$ ,  $K_1$  a  $K_2$  kompaktní definujeme

$$\varphi(x, t) = \begin{cases} 1, & (x, t) \in K_1, \\ 0, & (x, t) \in \Omega \setminus \overline{K_2}, \end{cases}$$

kterou spojitě dodefinujeme, a

$$\tilde{f}(x, t) = \begin{cases} f(x, t) \cdot \varphi(x, t), & (x, t) \in \Omega \\ 0, & (x, t) \in \mathbb{R}^{n+1} \setminus \Omega. \end{cases}$$

Dle prvního kroku (TODO?)  $\exists \tilde{x}(t)$ ,  $t \in [t_0 - T, t_0 + T]$ ,  $\tilde{x}'(t) = \tilde{f}(\tilde{x}(t), t)$ ,  $\tilde{x}(t_0) = x_0$ .  
 $\tilde{x}$  je spojitá funkce  $\implies \exists \delta > 0$  tak, že graf funkce  $\tilde{x}|_{[t_0-\delta, t_0+\delta]}$  leží v  $K_1$ . Na  $K$  je  $\tilde{f} = f$ ,  
tedy  $\tilde{x}'(t) = f(\tilde{x}(t), t)$ ,  $t \in [t_0 - \delta, t_0 + \delta]$ . □

└

## **1.1 Jednoznačnost řešení**

**Definice 1.3** (Lokální jednoznačnost, globální jednoznačnost)

Řekneme, že DR má vlastnost

- lokální jednoznačnosti, jestliže platí: Máme-li řešení  $(x, I), (y, J)$  a  $t_0 \in I \cap J, x(t_0) = y(t_0)$  pak  $\exists \delta > 0 \forall t \in (t_0 - \delta, t_0 + \delta), x(t) = y(t)$ ,
- globální jednoznačnosti, jestliže platí: Máme-li řešení  $(x, I), (y, J)$  a  $t_0 \in I \cap J, x(t_0) = y(t_0)$ , pak  $\forall t \in I \cap J : x(t) = y(t)$ .

**Tvrzení 1.4**

*Globální jednoznačnost je ekvivalentní lokální jednoznačnosti.*

┌

*Důkaz*

„ $\implies$ “ je triviální. „ $\impliedby$ “: Pro spor předpokládejme  $\exists t_1 \in I \cap J, x(t_1) \neq y(t_1)$ . BÚNO  $t_1 > t_0$ . Definujme

$$M := \{T \in I \cap J, t > t_0, x(t) \neq y(t)\} \neq \emptyset, \quad t_2 = \inf M.$$

Víme  $x(t_2) = \lim_{t \rightarrow t_2^-} x(t) = \lim_{t \rightarrow t_2^-} y(t) = y(t_2)$ . Podíváme se lokální jednoznačností na bod  $t_2$ . Tam existuje  $\sigma > 0$  tak, že  $\forall t \in (t_2 - \sigma, t_2 + \sigma) : x(t) = y(t)$ .  $\nmid$  □

└

**Definice 1.4** (Lokálně lipschitzovská)

Řekneme, že funkce  $f = (x, t)$  je lokálně lipschitzovská v  $\Omega$  vzhledem k  $x$ , jestliže

$$\forall (x_0, t_0) \in \Omega \exists \delta > 0 \exists L > 0 \forall t \in \mathcal{U}_\delta(t_0) \forall x, y \in \mathcal{U}_\delta(x_0) : |f(x, t) - f(y, t)| \leq L \cdot |x - y|$$

**Věta 1.5** (Peanova věta o jednoznačnosti)

*Buď  $f$  lokálně lipschitzovská v  $\Omega$  vzhledem k  $x$ , pak DR má v  $\Omega$  vlastnost lokální jednoznačnosti.*

┌

*Důkaz*

Ať  $x(t), y(t)$  jsou řešení.  $x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(x(s), s) ds, y(t) = y_0 + \int_{t_0}^t f(y(s), s) ds$ .  $x(t) - y(t) = \int_{t_0}^t (f(x(s), s) - f(y(s), s)) ds$ . Vezmeme  $\sigma > 0$ . Grafy  $x|_{[t-\sigma, t]}, y|_{[t-\delta, t+\delta]}$  leží v  $\delta$ -okolí  $(x_0, t_0)$ .

$$\forall s \in [t - \sigma, t_0 + \sigma] : |f(x(s), s) - f(y(s), s)| \leq L \cdot |x(s) - y(s)|.$$

$$\begin{aligned} |x(t) - y(t)| &\leq \int_{t_0}^t |f(x(s), s) - f(y(s), s)| ds \leq \int_{t_0}^t L \cdot |x(s) - y(s)| ds, \quad t \in [t_0 - \sigma, t_0 + \sigma] \\ &\leq L \max_{s \in [t-\sigma, t+\sigma]} |x(s) - y(s)| \cdot \sigma \end{aligned}$$

└

□

*Důsledek*

Jestliže  $f$  je lokálně lipschitzovská v  $\Omega$  vzhledem k  $x$  a  $(x_0, t_0) \in \Omega$ , pak

$$\exists \delta > 0 \exists ! x : (t_0 - \delta, t_0 + \delta) \rightarrow \mathbb{R}^n \text{ řešení DR s počáteční podmínkou } x(t_0) = x_0.$$

┌

*Důkaz*

Peanova věta o jednoznačnosti.

□

## **Tvrzení 1.6**

Pokud  $\frac{\partial f}{\partial x_j}$  jsou spojité v  $\Omega$ ,  $j \in [n]$ , pak  $f$  je lokálně lipschitzovská v  $\Omega$  vzhledem k  $x$ .

┌

*Důkaz*

$$h(s) := f(x + s(y - x), t), s \in [0, 1], h(0) = f(x, t), h(1) = f(y, t).$$

$$h(1) - h(0) = \int_0^1 h'(s) ds = \int_0^1 \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x + s(y - x)) \cdot (y_i - x_i) ds$$

$$\forall (x_0, t_0) \in \Omega \exists \mathcal{U}(x_0) \exists \mathcal{U}(t_0) M = \overline{\mathcal{U}(x_0)} \times \overline{\mathcal{U}(t_0)} \subset \Omega,$$

$M$  je kompaktní, tedy  $\exists K > 0 \forall (x, t) \in M : \left| \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) \right| \leq K$ . Tedy

$$|h(1) - h(0)| \leq \int_0^1 \sum_{i=1}^n \left| \frac{\partial f}{\partial x_i} \right| \cdot |(x + s(y - x))_i - x_i| ds \leq nK \cdot \max |y_i - x_i| \leq nK |x - y|.$$

└

□

## **2 Maximální řešení**

**Definice 2.1** (Prodloužení řešení, maximální řešení)

Řešení  $(\tilde{x}, \tilde{I})$  je prodloužením řešení  $(x, I)$ , jestliže  $\tilde{I} \supset I$  a  $\forall t \in I : x(t) = \tilde{x}(t)$ .

Řešení je maximální, pokud neexistuje netriviální prodloužení.

**Věta 2.1** (O maximálním prodloužení)

Každé řešení  $(x, I)$  má alespoň jedno maximální prodloužení.

┌ *Důkaz*

Ať  $M$  je množina všech prodloužení  $(x, I)$ . Řekněme, že  $(\tilde{x}, \tilde{I}) \leq (\hat{x}, \hat{I})$  právě tehdy, když  $(\hat{x}, \hat{I})$  je prodloužení  $(\tilde{x}, \tilde{I})$ .

Ať  $N \subset M$  je řetězec (množina, na které je  $\leq$  lineární). Označme  $I_0 = \bigcup_{(\tilde{x}, \tilde{I}) \in N} \tilde{I}$  a definujme  $x : I_0 \rightarrow \mathbb{R}^n$  z toho, že  $t \in I_0 \implies \exists (\tilde{x}, \tilde{I}) \in N, t \in \tilde{I}$ , jako  $x(t) = \tilde{x}(t)$ .

└ Z Zornova lemmatu pak vyplývá, že existuje maximální řešení. □

## Lemma 2.2

$(x, I)$  řeší DR,  $I = (a, b)$ ,  $b \in \mathbb{R} \cup \infty$ . Pak řešení  $x$  lze prodloužit za bod  $b$ , když zároveň

- $b < \infty$ ;
- $\exists \lim_{t \rightarrow b} x(t) = x_0 \in \mathbb{R}$ ;
- $(x_0, b \in \Omega)$ .

┌ *Důkaz*

„ $\implies$ “ zřejmě, „ $\impliedby$ “: Uvažujme DR s počáteční podmínkou  $x(b) = x_0$ . Dle Peanovy věty  $\exists \tilde{x} : (b - \delta, b + \delta) \rightarrow \mathbb{R}^n$ .  $x_1(t) = x(t)$ , pokud  $t \in (a, b)$ ,  $\tilde{x}(t)$  jinak.  $x_1$  tedy splňuje DR na  $(a, b)$  a  $(b, b + \delta)$ . Zbývá ověřit, že  $x'_1(b) = f(x_1(b), b)$ :

- $x_1$  je spojitá v  $b$ , neboť  $\lim_{t \rightarrow b^-} x_1(t) = x_0 = \lim_{t \rightarrow b^+} x_1(t) = \tilde{x}(t)$ .
- $\exists \lim_{t \rightarrow b^-} x'_1(t) = \lim_{t \rightarrow b^-} f(x(t), t) = f(x(b), b) = f(x_0, b)$ .
- $\exists \lim_{t \rightarrow b^+} x'_1(t) = \lim_{t \rightarrow b^+} f(\tilde{x}(t), t) = f(\tilde{x}(b), b) = f(x_0, b)$ .

└ □

## Věta 2.3 (O opuštění kompaktu)

Bud'  $(x, I)$  maximální řešení DR. Nechť  $K \subset \Omega$  kompaktní a  $\exists t_0 : (x(t_0), t_0) \in K$ . Pak  $\exists t_1 > t_0, t_1 \in I$ , že  $(x(t_1), t_1) \in \Omega \setminus K$ .  $\exists t_2 \in I_2, t_2 < t_0$ , že  $(x(t_2), t_2) \in \Omega \setminus K$ .

┌ *Důkaz*

Pro spor předpokládejme, že  $\forall t_1 > t_0, t_1 \in I : (x(t_1), t_1) \in K$ . Podle předchozí věty stačí dokázat  $b < \infty$  (kdyby ne, tak  $K$  není kompaktní),  $\{t_k\}_{k=1}^{\infty} \nearrow b$ ,  $\{(x(t_k), t_k)\}_{k=1}^{\infty} \subset K$  vybereme konvergentní podposloupnost  $(x(t_{k_n}), t_{k_n}) \rightarrow (x_0, t_0)$ . Následně ověříme BC podmínku: víme  $x(s) - x(t) = x'(\xi)(s - t)$ ,  $\xi \in (s, t)$ , tedy

$$|x(s) - x(t)| \leq |x'(\xi)| \cdot |s - t| = |f(x(\xi), \xi)| \cdot |s - t| \leq C \cdot |s - t|.$$

└ Zřejmě  $(x_0, b) \in K \subset \Omega$ , protože z kompaktního se nedá vykonvergovat. □

### 3 Závislost řešení na počáteční podmínce

#### Definice 3.1

Buď  $f$  v  $\Omega$  lokálně Lipschitzovská vzhledem k  $x_0$ . Řešící funkcí (DR) nazveme funkci  $\varphi : G \subset \mathbb{R}^{n+2} \rightarrow \mathbb{R}^n : (t, t_0, x_0) \mapsto x(t)$ , kde  $x$  je maximální řešení odpovídající DR s počáteční podmínkou  $x(t_0) = x_0$ .

#### Věta 3.1 (Granwallovo Lemma)

Nechť  $g, w : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$ ,  $g(t), w(t) \geq 0$ ,  $\forall t \in I_0$ . Nechť  $t_0 \in I$ ,  $K \geq 0$  a  $\forall t \in I : w(t) \leq K + \left| \int_{t_0}^t w(s)g(s)ds \right|$ . Potom

$$w(t) \leq K \cdot \exp \left( \left| \int_{t_0}^t g(s)ds \right| \right).$$

┌ *Důkaz*

BÚNO  $t > t_0$ . Vezmeme  $\varepsilon > 0$ . Definujeme  $\Phi(t) = K + \varepsilon + \int_{t_0}^t w(s)g(s)ds$ .  $\Phi'(t) = w(t) \cdot g(t)$ .

$$\Phi'(t) \leq g(t) \left( K + \int_{t_0}^t w(s)g(s)ds \right) \leq g(t)\Phi(t), \quad \forall t \in (t_0, \sup I).$$

$$\forall t \in (t_0, \sup I) : \Phi(t) \geq 0. \quad \frac{\Phi'(t)}{\Phi(t)} \leq g(t), \quad \int_{t_0}^t \frac{\Phi'(s)}{\Phi(s)} ds \leq \int_{t_0}^t g(s)ds.$$

$$\Phi(t_0) = K + \varepsilon, \quad \frac{\Phi(t)}{K + \varepsilon} \leq \exp \left( \int_{t_0}^t g(s)ds \right),$$

$$\Phi(t) \leq (K + \varepsilon) \exp \left( \int_{t_0}^t g(s)ds \right) \quad \forall \varepsilon > 0 \implies \Phi(t) \leq K \cdot \exp \left( \int_{t_0}^t g(s)ds \right).$$

└ □

### Důsledek

Nechť  $f$  je globálně  $L$ -lipschitzovská v první souřadnici. Nechť  $x$  a  $y$  jsou řešení DR na intervalu  $I$  s počáteční podmínkou  $x(t_0) = x_0$ ,  $y(t_0) = y_0$ . Potom

$$|x(t) - y(t)| \leq |x_0 - y_0| \cdot e^{L \cdot |t - t_0|}.$$

┌

Důkaz

$$\begin{aligned} x'(t) &= f(x(t), t), & y'(t) &= f(y(t), t). \\ x(t) &= x_0 + \int_{t_0}^t f(x(s), s) ds, & y(t) &= y_0 + \int_{t_0}^t f(y(s), s) ds, \\ x(t) - y(t) &= x_0 - y_0 + \int_{t_0}^t (f(x(s), s) - f(y(s), s)) ds, \\ |x(t) - y(t)| &\leq |x_0 - y_0| + \left| \int_{t_0}^t L \cdot (x(s) - y(s)) ds \right|, \end{aligned}$$

└ Z Granwallova lemmatu potom  $|x(t) - y(t)| \leq |x_0 - y_0| \cdot \exp(L \cdot |t - t_0|)$ . □

### Věta 3.2

Buď  $G$  množina z definice řešící funkce,  $f$  lokálně lipschitzovská na  $G$ . Pak  $G \subset \mathbb{R}^{n+2}$  otevřená a  $\varphi$  je spojitá v  $G$ .

┌

Důkaz

Vezmeme  $(t, t_0, x_0) \in G$ . Buď  $x$  maximální řešení DR s počáteční podmínkou  $x(t_0) = x_0$ .  $\mathcal{D}_x \supset [t_0, t]$ . BÚNO  $t > t_0$ .

$$K_\delta := \{(y, s) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid s \in [t_0 - \delta, t_0 + \delta], |y - x(s)| \leq \delta\}.$$

Vezmeme  $\varepsilon > 0$ . Vezmeme  $y_0 \in \mathbb{R}^n, s_0 \in \mathbb{R}, |y_0 - x_0| < \varepsilon, |t_0 - s_0| < \varepsilon$ . Definujeme  $y$  maximální řešení splňující  $y(s_0) = y_0$ . Co znamená, že  $(\tilde{t}, s_0, y_0) \in G$ ?  $\mathcal{D}_y \supset [s_0, \tilde{t}]$ . Potřebujeme dokázat, že  $y$  je definováno na  $K_\delta$ . Odhadneme

$$|y(s_0) - x(s_0)| \leq |y(s_0) - x(t_0)| + |x(t_0) - x(s_0)| = |y_0 - x_0| + |x(t_0) - x(s_0)| \leq \varepsilon + c_0 |t_0 - s_0| \leq \varepsilon \cdot (1 + c_0)$$

$$s \geq t_0 : |x(s) - y(s)| \leq |x(s_0) - y(s_0)| e^{L|s - s_0|} \leq \varepsilon(1 + c_0) e^{L|s - s_0|}.$$

Máme, že  $\forall s > t_0 : |x(s) - y(s)| \leq \frac{\delta}{2}$ , tedy  $y$  neopustí  $K_\delta$  přes hranici  $\implies y$  existuje až do času  $t + \delta_0$ , tj.  $G$  je otevřená.

Nyní „ $\Phi$  je spojitá“:  $(t, t_0, x_0), (s, s_0, y_0) \in G$ :

$$|\varphi(t, t_0, x_0) - \varphi(s, s_0, y_0)| = |x(t) - y(s)| \leq |x(t) - x(s)| + |x(s) - y(s)| \leq c_0 |t - s| + |x(s_0) - y(s_0)| e^{L|s - s_0|} \leq T$$

└

□