

Příklad (5)

Find all distributions U on \mathbb{R} satisfying $\sin \cdot U = 0$.

└

Řešení

Nejprve dokážeme, že „ $\text{supp } U \subseteq \{k \cdot \pi \mid k \in \mathbb{Z}\} =: \pi\mathbb{Z}$ “: Máme-li $f \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ takovou, že $\text{supp } \varphi \subset (a, b)$ pro nějaký interval $[a, b] \cap \pi\mathbb{Z} = \emptyset$. Potom definujeme

$$\psi(x) = \begin{cases} 0, & x \notin (a, b) \\ \frac{\varphi(x)}{\sin(x)}, & x \in (a, b) \end{cases}.$$

Potom ψ je zřejmě dobře definované, neboť $\sin(x) \neq 0$ pro žádné $x \in (a, b)$. Navíc podíl dvou C^∞ funkcí, kde jmenovatel nenabývá nuly, je C^∞ funkce, a zřejmě každá derivace bude mít support uvnitř (a, b) . Tedy $\psi \in C^\infty$. Tudíž dostáváme, co jsme chtěli dokázat:

$$0 = (\sin \cdot U)(\psi) = U(\sin \cdot \psi) = U(\varphi).$$

Nyní mějme $\varepsilon < 1/4$ hladké jádro h_ε a definujme $\xi_k = \chi_{B(k \cdot \pi, \varepsilon)} * h_\varepsilon$ a pro libovolné $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ definujme $\varphi_k = \xi_k \cdot \varphi$. Potom $\text{supp } \varphi_k \subset B(k \cdot \pi, 1/2)$ a $\text{supp } (\varphi - \sum_{k=-\infty}^{\infty} \varphi_k) \cap \pi\mathbb{Z} = \emptyset$ (v sumě je pouze konečně mnoho nenulových prvků, protože $\text{supp } \varphi$ je kompaktní). Tedy (s použitím linearity U):

$$U(\varphi) = U\left(\left(\varphi - \sum_{k=-\infty}^{\infty} \varphi_k\right) + \sum_{k=-\infty}^{\infty} \varphi_k\right) = U\left(\varphi - \sum_{k=-\infty}^{\infty} \varphi_k\right) + \sum_{k=-\infty}^{\infty} U(\varphi_k).$$

První člen napravo je nulový z Větičky 12 bod c), druhý „člen“ pak má pro každé k tvar $U(\varphi_k) = \sum_{\alpha, |\alpha| \leq N_k} c_{k,\alpha} D^\alpha \Lambda_{\delta_{k \cdot \pi}}$ pro $c_{k,\alpha} \in \mathbb{R}$ a nějaké $N_k \in \mathbb{N}_0$, neboť buď je $k \cdot \pi \in \text{supp } U$ a pak je $\text{supp } U|_{B(k \cdot \pi, 1/2)} = \{k \cdot \pi\}$, tedy použijeme Větičku 12 bod e), nebo je $k \cdot \pi \notin \text{supp } U$ a pak je $U|_{B(k \cdot \pi, 1/2)} = 0$ (to nám přidává všechna $c_{k,\alpha} = 0$).

Tedy všechna taková U jsou přesně

$$U = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \sum_{\alpha, |\alpha| \leq N_k} c_{k,\alpha} D^\alpha \Lambda_{\delta_{k \cdot \pi}},$$

kde pro všechna k je $N_k \in \mathbb{N}_0$ a pro všechna $|\alpha| \leq N_k$ pak $c_{k,\alpha} \in \mathbb{R}$. $U \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ máme z toho, že $U|_{\mathcal{D}_K(\mathbb{R})}$ je spojitá (Tvzení 6 bod (3) a uzavřenost $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ na sčítání).

└

Find all distributions V on \mathbb{R} satisfying $\sin \cdot V = \Lambda_1$.

Řešení

Jsou-li V_1 a V_2 takové distribuce, pak $\sin \cdot (V_1 - V_2) = \sin \cdot V_1 - \sin \cdot V_2 = \Lambda_1 - \Lambda_1 = 0$. Tedy všechna taková V se liší právě o řešení předchozí části.

Tedy hledáme jedno řešení. Ukážeme, že jedno takové řešení je

$$\Lambda(\varphi) = \lim_{n \rightarrow \infty} \Lambda_n(\varphi) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R} \setminus (\pi\mathbb{Z} + B(\mathbf{o}, \frac{1}{n}))} \frac{\varphi(x)}{\sin(x)} dx, \quad \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

Z TODO(název věty) nám stačí ukázat, že Λ_n jsou distribuce a že $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \Lambda_n(\varphi) \neq \pm\infty$ pro každé φ . To, že je $\Lambda_n = \Lambda_{\frac{1}{\sin}}$ je distribuce je jasné, neboť $\frac{1}{\sin}$ je lokálně integrovatelná, neboť je dokonce omezená, na $\mathbb{R} \setminus (\pi\mathbb{Z} + B(\mathbf{o}, \frac{1}{n}))$.

BÚNO $\text{supp } \varphi \subset (-\frac{3}{4}\pi, \frac{3}{4}\pi)$, protože jinak použijeme na všechny nenulové funkce $\varphi_k = \varphi(\chi_{\{k \cdot \pi\} + (\frac{1}{2}\pi, \frac{3}{2}\pi)}) * h_{\frac{1}{4}\pi}$ a na $\varphi - \sum_{k \in \mathbb{Z}} \varphi_k$. Potom z definice derivace $\varphi'(0)$, která existuje z hladkosti φ , $\exists \varepsilon > 0$ a $C_1 = 2\varphi'(0)$, že $\varphi(x)$ je mezi 0 a $\varphi(0) + C_2 \cdot x$ na intervalu $(-\varepsilon, \varepsilon)$. Navíc můžeme z definice derivace $\sin'(0) = 1$ (-1 v případě lichých k) zvolit ε takové, aby i $|\sin(x)| > \frac{|x|}{2}$ na intervalu $(-\varepsilon, \varepsilon)$. Nechť $m > n > \frac{1}{\varepsilon}$, potom

$$\begin{aligned} |\Lambda_n(\varphi) - \Lambda_m(\varphi)| &= \left| \int_{\mathbb{R} \setminus (\pi\mathbb{Z} + B(\mathbf{o}, \frac{1}{n}))} \frac{\varphi(x)}{\sin(x)} dx - \int_{\mathbb{R} \setminus (\pi\mathbb{Z} + B(\mathbf{o}, \frac{1}{m}))} \frac{\varphi(x)}{\sin(x)} dx \right| = \\ &= \left| \int_{-\frac{1}{n}}^{-\frac{1}{m}} \frac{\varphi(x)}{\sin(x)} dx + \int_{\frac{1}{m}}^{\frac{1}{n}} \frac{\varphi(x)}{\sin(x)} dx \right| = \\ &= \left| \underbrace{\int_{-\frac{1}{n}}^{-\frac{1}{m}} \frac{\varphi(0)}{\sin(x)} dx + \int_{\frac{1}{m}}^{\frac{1}{n}} \frac{\varphi(0)}{\sin(x)} dx}_{=0} + \int_{-\frac{1}{n}}^{-\frac{1}{m}} \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{\sin(x)} dx + \int_{\frac{1}{m}}^{\frac{1}{n}} \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{\sin(x)} dx \right| \end{aligned}$$