

Organizační úvod

Poznámka

Podmínkou zápočtu je splnění 1 domácí práce a 1 písemného testu. Není potřeba docházka.

Bude moodle (přístup dají cvičící). Budou tam poznámky k přednášce, cvičebnice a bude se tam odevzdávat domácí práce.

Je dobré umět míru.

1 Úvod

Poznámka

Pravděpodobnost popisuje modely popisující náhodné jevy.

Statistika se pak snaží popsat reálné věci za pomoci těchto modelů.

Poznámka (Historie)

Klasická pravděpodobnost navazuje na dílo Kolmogorova, který popisoval axiomatickou pravděpodobnost.

2 Pravděpodobnostní prostor

Definice 2.1 (Pravděpodobnostní prostor, pravděpodobnost)

Pravděpodobnostní prostor je trojice (Ω, \mathcal{A}, P) , kde Ω je neprázdná množina, \mathcal{A} je σ -algebra a P je pravděpodobnost.

Pravděpodobnost P je množinová funkce $\mathcal{A} \rightarrow [0, 1]$ splňující:

- $P(A) \geq 0 \ \forall A \in \mathcal{A}$, (nezápornost)
- $P(\Omega) = 1$, (normovanost)
- jsou-li $A_i \in \mathcal{A}$ po dvou disjunktní, pak $P(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$. (σ -aditivita)

┌ *Poznámka* (Interpretace)

Ω se často nazývá stavový prostor a obsahuje všechny „realizace náhody“ neboli elementární jevy, tj. všechny možnosti, o kterých uvažují.

\mathcal{A} je σ -algebra náhodných jevů. P pak obsahuje veškerou informaci o té dané náhodné situaci.

└ Pokud nastal $\omega \in A \in \mathcal{A}$ ($\omega \in \Omega$), pak nastal jev A .

Definice 2.2 (Klasický pravděpodobnostní prostor, diskrétní pravděpodobnostní prostor, spojitý pravděpodobnostní prostor, indikátor)

Ω konečná, $\mathcal{A} = 2^\Omega$, $P(\{a\}) = \frac{1}{n} \forall a \in \Omega$ je klasický pravděpodobnostní prostor.

Ω spočetná (včetně konečná), $\mathcal{A} = 2^\Omega$, $p : \Omega \rightarrow [0, 1]$ je taková, že $p(\omega) \geq 0 \forall \omega \in \Omega$ a $\sum_{\omega \in \Omega} p(\omega) = 1$. Položíme $P(A) = \sum_{\omega \in A} p(\omega) \forall A \in \mathcal{A}$ nazýváme diskrétní pravděpodobnostní prostor.

$\Omega = \mathbb{R}$, $\mathcal{A} = \mathcal{B}(\mathbb{R})$ (resp. $\mathcal{B}_0(\mathbb{R})$) a $g : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty)$ měřitelná, že $\int_{\mathbb{R}} g(x) dx = 1$, pak definujeme $P(B) = \int_B g(x) dx$, $g \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) = \mathcal{A}$ je spojitý pravděpodobnostní prostor. Speciálním případem $g(x) = 1_{[0,1]}(x)$ je pak tzv. indikátor.

Definice 2.3 (Jev jistý, jev nemožný, podjev, zároveň, alespoň jeden, jev opačný, neslučitelné jevy)

Ω je jev jistý, \emptyset je jev nemožný, $A \subset B$ znamená „ A je podjev B “, $A \cap B$ znamená „nastal A a zároveň B “, $A \cup B$ znamená „nastal A nebo B “, A^C je jev opačný, $A \cap B = \emptyset$ jsou neslučitelné jevy.

Věta 2.1

Budte (Ω, \mathcal{A}, P) pravděpodobnostní prostor a $A, B, A_i \in \mathcal{A}$ ($i \in \mathbb{N}$) náhodné jevy. Pak platí:

- $P(\emptyset) = 0$;
- P je konečně aditivní;
- $P(A^C) = 1 - P(A)$;
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$;
- $A \subset B \implies P(A) \leq P(B)$; (monotonie)
- $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \dots \implies P(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_i)$; (spojitost)
- $A_1 \supseteq A_2 \supseteq \dots \implies P(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_i)$; (spojitost)
- $A_1 \supseteq A_2 \supseteq \dots \wedge \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i = \emptyset \implies \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_i) = 0$; (spojitost v nule)
- $B \subset A \implies P(A \setminus B) = P(A) - P(B)$.

┌
Důkaz

Vše z míry. Pravděpodobnost je konečná, předposlední bod vyplývá z předchozího. □

Poznámka

28. února bude v 17:20 náhradní přednáška za poslední přednášku.

Věta 2.2 (Princip inkluze a exkluze)

Buď (Ω, \mathcal{A}, P) pravděpodobnostní prostor. Pak pro každé $n \in \mathbb{N}$ a každá $A_i \in \mathcal{A}$, $i \in \mathbb{N}$, platí:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i \cap A_j) + \dots + (-1)^{n-1} P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right).$$

┌
Důkaz

Nebude, v podstatě byl v diskřetce. □

3 Podmíněná pravděpodobnost

Definice 3.1 (Podmíněná pravděpodobnost)

Buďte $A, B \in \mathcal{A}$ takové, že $P(B) > 0$. Definujeme $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ a nazýváme ji podmíněnou pravděpodobností jevu A za podmínky (jevu) B .

Věta 3.1

Buď $B \in \mathcal{A}$ takové, že $P(B) > 0$. Pak zobrazení $P(\cdot|B) : \mathcal{A} \rightarrow [0, 1]$ splňuje definici pravděpodobnosti.

┌
Důkaz

Ověříme po bodech: zřejmě $P(A|B) \geq 0 \forall A \in \mathcal{A}$, $P(\Omega|B) = \frac{P(\Omega \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B)}{P(B)} = 1$ a σ -aditivita plyne ze σ -aditivity $P(\cdot \cap B)$ a deMorganových pravidel $(B \cap \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \cap B)$, $P(B)^{-1}$ se prostě z obou stran vytkne. □

Pozor

Podmíněná pravděpodobnost nám neříká nic o příčinné souvislosti.

Pozorování (O podmíněné pravděpodobnosti)

Buďte $A, B, C \in \mathcal{A}$ a pravděpodobnost „správných“ jevů nenulová. Pak:

- $P(A \cup B|C) = P(A|C) + P(B|C) - P(A \cap B|C)$,

- $B \subset A \implies P(A|B) = 1$,
- $A \cap B = \emptyset \implies P(A|B) = 0$,
- $P(A|\Omega) = P(A)$,
- pokud $P(\{\omega\}) > 0$, pak $\forall A \in \mathcal{A}$ platí $P(A|\{\omega\}) = \delta_\omega(A)$.

┌
Důkaz

Triviální (buď z definice, nebo z toho, že je to pravděpodobnost). □

└

Pozor (Neplatí!)

$P(A|B \cup C) = P(A|B) + P(A|C)$, ani v případě, že $A \cap B = \emptyset$.

Věta 3.2 (O násobení pravděpodobností)

Budte $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{A}$ takové, že $P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{n-1}) > 0$. Pak

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = P(A_n|A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) \cdot P(A_{n-1}|A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{n-2}) \cdot \dots \cdot P(A_2|A_1) \cdot P(A_1).$$

┌
Důkaz

Z $P(A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) > 0$ plyne, že $P(A_1 \cap \dots \cap A_k) > 0$ pro $k \in [n-1]$, pomocí monotonie pravděpodobnosti. Tedy výraz je dobře definován.

Dokážeme indukcí: Pro $n = 2$ platí $P(A_1 \cap A_2) = P(A_2|A_1) \cdot P(A_1)$ z definice. Z $n - 1$ na n : ($B := A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}$)

$$\begin{aligned} P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) &= P(B \cap A_n) \stackrel{\text{def}}{=} P(A|B) \cdot P(B) \stackrel{\text{IP}}{=} \\ &= P(A_n|A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) \cdot P(A_{n-1}|A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{n-2}) \cdot \dots \cdot P(A_2|A_1) \cdot P(A_1). \end{aligned}$$

└ □

Věta 3.3 (O celkové pravděpodobnosti)

Budte A, B_1, B_2, \dots náhodné jevy takové, že $P(\bigcup_n B_n) = 1$ a $B_i \cap B_j = \emptyset \forall i \neq j$ a $P(B_i) > 0 \forall i$. Potom $P(A) = \sum_n P(A|B_n) \cdot P(B_n)$.

┌ *Důkaz*

Víme $P((\bigcup_n B_n)^c) = 0$, a tedy $P(A) = P(A \cap \bigcup_n B_n) + P(A \cap (\bigcup_n B_n)^c) = P(A \cap \bigcup_n B_n)$, protože P je konečně-aditivní a platí monotonie. Dle de Morganových pravidel (a toho, že průnik s další množinou zachovává disjunktnost):

$$P(A) = P\left(\bigcup_n (A \cap B_n)\right) = \sum_n P(A \cap B_n) = \sum_n P(A|B_n) \cdot P(B_n).$$

└

□

Věta 3.4 (Bayesova)

Za předpokladů věty o celkové pravděpodobnosti a $P(A) > 0$, platí $P(B_i|A) = \frac{P(A|B_i)P(B_i)}{\sum_n P(A|B_n)P(B_n)}$.

┌ *Důkaz*

Snadný z definice podmíněné pravděpodobnosti a věty o celkové pravděpodobnosti. □

Příklad (Pólyovo urnové schéma)

Máme v urně n koulí k různých barev. Náhodně taháme z urny. Po vytažení koule do urny vytaženou kouli vrátíme a s ní i Δ (pevný parametr) koulí stejné barvy.

Podle volby Δ máme 2 základní schémata: $\Delta = -1$ (tahání bez vracení) a $\Delta = 0$ (tahání s vracením).

Definice 3.2 (Nezávislé jevy)

Náhodné jevy A a B jsou nezávislé, pokud platí $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$.

Pozor

Zase to nemá nic do činění s kauzalitou.

Věta 3.5

Jsou-li dva jevy A a B nezávislé, pak jsou i jevy A a B^c nezávislé.

Je-li navíc $P(B) > 0$, pak $P(A|B) = P(A)$.

┌
Důkaz

$$P(A \cap B^c) = P(A) - P(A \cap B) = P(A) - P(A) \cdot P(B) = P(A) \cdot (1 - P(B)) = P(A) \cdot P(B).$$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A) \cdot P(B)}{P(B)} = P(A).$$

└

□

Definice 3.3 (Vzájemná nezávislost)

Buď $\{A_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ systém náhodných jevů. Pak říkáme, že tyto jevy jsou (vzájemně) nezávislé, pokud pro každou konečnou množinu $I \subset \Lambda$ (dále $I \in \mathcal{F}(\Lambda)$) platí $P(\bigcap_{i \in I} A_i) = \prod_{i \in I} P(A_i)$.

Věta 3.6

Buď $C = \{B_1, \dots, B_k\}$, $k \in \mathbb{N}$, systém nezávislých jevů. Nahradíme-li libovolnou podmnožinu těchto jevů jejich doplňky, dostaneme opět systém nezávislých jevů

┌
Důkaz

Indukcí podle velikosti nahrazované množiny. (Použije se předchozí věta.)

└

□

Věta 3.7

Jsou-li jevy $A_1, \dots, A_n, B_1, \dots, B_m$ vzájemně nezávislé a $P(B_1 \cap \dots \cap B_m) > 0$, pak

$$P(A_1 \cap \dots \cap A_n | B_1 \cap \dots \cap B_m) = P(A_1 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) \cdot \dots \cdot P(A_n).$$

┌
Důkaz

Snadný.

└

□

4 Náhodné veličiny

Definice 4.1 (Náhodný element)

Buďte (Ω, \mathcal{A}) a (Ω', \mathcal{A}') stavové prostory. Pak každé měřitelné zobrazení $X : \Omega \rightarrow \Omega'$ nazveme náhodný element z Ω' .

Definice 4.2 (Náhodná veličina)

Měřitelné zobrazení $X : (\Omega, \mathcal{A}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ nazveme (reálnou) náhodnou veličinou.

Definice 4.3 (Značení)

Místo $\{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \leq a\}$ píšeme $\{X \leq a\}$, místo $P(\{X \leq a\})$ píšeme $P(X \leq a)$.

Definice 4.4

Buď X náhodná veličina. $X^{-1}(\mathcal{B}(\mathbb{R}))$ značíme $\sigma(X)$ a nazýváme σ -algebrou náhodných jevů generovaných náhodnou veličinou X (σ -algebra indukovaná X).

Definice 4.5 (Rozdělení náhodné veličiny)

Rozdělení náhodné veličiny $X : (\Omega, \mathcal{A}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B})$ rozumíme indukovanou pravděpodobnostní mírou P_X na $(\mathbb{R}, \mathcal{B})$ definovanou jako

$$P_X(B) = P(\{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \in B\}) = P(X^{-1}(B)), \quad B \in \mathcal{B}.$$

Poznámka (A důkaz, že je to pravděpodobnostní míra)
 P_X je obraz míry P v zobrazení X .

Věta 4.1 (O přenosu integrace pro P_X)

Buď X náhodná veličina a buď h měřitelná funkce $(\mathbb{R}, \mathcal{B}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B})$. Pak platí

$$\int_{\Omega} h(X(\omega)) dP(\omega) = \int_{\mathbb{R}} h(x) dP_X(x),$$

pokud existuje alespoň jedna strana.

Důkaz
 Speciální případ věty o obrazu míry z TMI1. □

Definice 4.6 (Hustota náhodné veličiny)

Buď X náhodná veličina, P_X její rozdělení a μ σ -konečná míra na $(\mathbb{R}, \mathcal{B})$ taková, že $P_X \ll \mu$. Potom $f(x) = \frac{dP_X}{d\mu}(x)$ se nazývá hustota náhodné veličiny X vzhledem k míře μ .

Poznámka
 $f(x)$ je určena jednoznačně μ -skoro všude. Pokud pro $g : (\mathbb{R}, \mathcal{B}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B})$ měřitelnou platí

$$\int_{\mathbb{R}} |g(x)| dP_X(x) < \infty \quad (\vee g(x) \geq 0 \forall x),$$

pak $\int_{\mathbb{R}} g(x) dP_X(x) = \int_{\mathbb{R}} g(x) f(x) d\mu(x)$.

Věta 4.2

Bud' X náhodná veličina, pak platí následující rovnosti:

$$\begin{aligned} P(X \in B) &:= P(\{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \in B\}) = \int_{\Omega} 1_B(X(\omega)) dP(\omega) = \int_{\mathbb{R}} 1_B(x) dP_X(x) = \int_B dP_X(x) = P_X(B) = \\ &= \int_{\mathbb{R}} 1_B(x) dP_X(x) = \int_{\mathbb{R}} 1_B(x) f(x) d\mu(x) = \int_B f(x) d\mu(x). \end{aligned}$$

┌ Důkaz

└ Je to jen sesypání faktů, které už známe. □

Definice 4.7 (Distribuční funkce)

Mějme náhodnou veličinu $X : (\Omega, \mathcal{A}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B})$. Funkci $F_X : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ definovanou jako $F_X(x) = P(X \leq x)$ nazveme distribuční funkce náhodné veličiny X .

┌ Poznámka

Definice se shoduje s distribuční funkcí z TMI1. (A tedy platí věta o vlastnostech distribuční funkce, s tím, že dokonce $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = 1$.)

Věta 4.3

Bud' $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ splňující vlastnosti distribuční funkce a $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$. Pak existuje pravděpodobnostní prostor (Ω, \mathcal{A}, P) a náhodná veličina $X : (\Omega, \mathcal{A}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B})$ taková, že $F_X = F$.

┌ Důkaz

Z TMI1 víme, že existuje Lebesgueova-Stieltjesova míra μ , jejíž distribuční funkce je F . Tj. $\mu((-\infty, a]) = F(a)$. Teď chybí jen dodefinovat (Ω, \mathcal{A}, P) a X . Položíme $(\Omega, \mathcal{A}, P) = (\mathbb{R}, \mathcal{B}, \mu)$ a $X = \text{id}_{\mathbb{R}}$. □

Definice 4.8 (Názvosloví: diskrétní náhodná veličina, absolutně spojitá veličina)

Mějme diskrétní náhodnou veličinu $P_X \equiv \mu_d$, tj. existuje nejvýše spočetná $\{x_i\}_{i \in I} \subset \mathbb{R}$ a $\{p_i\}_{i \in I} \subset (0, 1]$ takových, že $\sum_{i \in I} p_i = 1$ a platí $P_X = \sum_{i \in I} p_i \delta_{x_i}$.

Potom nutně $F_X(x) = \sum_{i \in I} p_i 1_{[x, \infty)}(x)$ a také platí, že $P_X \ll \nu$, kde ν je čítací míra na $\{x_i\}_{i \in I}$.

(Absolutně) spojitá náhodná veličina je taková, že $P_X = \mu_a \ll \lambda$, takže $P_X(B) = \int_B f(x) d\mu$.

Definice 4.9 (Kvantilová funkce)

Bud' F_X distribuční funkce náhodné veličiny X . Funkce $F_X^{-1}(u) = \int \{x \mid F_X(x) \geq u\}$, $u \in (0, 1)$ se nazývá kvantilová funkce náhodné veličiny X .

┌ *Poznámka*

Bude potřeba později. Teď jen: Je neklesající a zleva spojitá. Lze z ní jednoznačně odvodit F_X .

Pozor

Kvantilová funkce obecně není inverzní funkcí k F_X , protože inverzní funkce nemusí existovat. Ale pro F_X rostoucí a spojitou je F_X^{-1} inverzní funkcí k F_X .

4.1 Střední hodnota, rozptyl a momenty náhodné veličiny

Definice 4.10 (Střední hodnota)

Střední hodnota náhodné veličiny X je číslo $\mathbb{E}X$ dané výrazem $\mathbb{E}X = \int_{\Omega} X(\omega) dP(\omega)$, pokud má integrál smysl.

Definice 4.11 (Medián)

Medián rozdělení náhodné veličiny X je číslo $q_{\frac{1}{2}}$ splňující $P(X \leq q_{\frac{1}{2}}) \geq \frac{1}{2}$ a $P(X \geq q_{\frac{1}{2}}) \geq \frac{1}{2}$.

Věta 4.4

Bud' X náhodná veličina a $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ měřitelná funkce. Pak $g(X)$ je také náhodná veličina a $\mathbb{E}g(X) = \int_{\mathbb{R}} g(x) dP_X(x) = \int_{\mathbb{R}} g(x) dF_X(x)$, pokud alespoň jeden z výrazů existuje.

┌ *Důkaz*

Složení 2 měřitelných funkcí je měřitelné, tj. $g(X)$ je opravdu náhodná veličina.

$$\mathbb{E}g(X) = \int_{\Omega} g(X(\omega)) dP(\omega) = \int_{\mathbb{R}} g(x) dP_X(x).$$

└ Druhá rovnost plyne ze vztahu mezi P_X a její distribuční funkcí. □

Věta 4.5 (Základní vlastnosti $\mathbb{E}X$)

Budte X, Y náhodné veličiny na stejném pravděpodobnostním prostoru (Ω, \mathcal{A}, P) . Pak platí

$$\mathbb{E}(a + bX) = a + b\mathbb{E}X, \quad X \in L^1, a, b \in \mathbb{R},$$

$$\mathbb{E}(X + Y) = \mathbb{E}X + \mathbb{E}Y, \quad X, Y \in L^1,$$

$$P(X \geq 0) = 1 \implies \mathbb{E}X \geq 0, \quad (\text{obecněji } P(X \in [a, b]) = 1 \implies \mathbb{E}X \in [a, b]),$$

$$X \in L^1 \implies |X| \in L^1,$$

$$X \leq Y, P\text{-skoro všude} \implies \mathbb{E}X \leq \mathbb{E}Y (\text{pokud existují}).$$

┌ *Důkaz*

└ Snadný, aplikace míry. □

Definice 4.12 (Názvosloví: P -skoro jistě)

P -skoro jistě znamená P -skoro všude.

Definice 4.13 ($n - t$ moment)

n -tý moment náhodné veličiny X definujeme jako $\mathbb{E}X^n$, $n \in \mathbb{N}$.

n -tý absolutní moment náhodné veličiny X definujeme jako $\mathbb{E}|X|^n$, $n \in \mathbb{N}$.

n -tý centrální moment náhodné veličiny X definujeme jako $\mathbb{E}(X - \mathbb{E}X)^n$, $n \in \mathbb{N}$, pokud $\mathbb{E}X \in \mathbb{R}$.

n -tý absolutní centrální moment náhodné veličiny X definujeme jako $\mathbb{E}|X - \mathbb{E}X|^n$, $n \in \mathbb{N}$, pokud $\mathbb{E}X \in \mathbb{R}$.

┌ *Poznámka*

└ 1-ní moment je $\mathbb{E}X$. První centrální moment je 0.

Definice 4.14 (Rozptyl)

Rozptyl náhodné veličiny X je definován jako $\mathbb{E}(X - \mathbb{E}X)^2$. Značí se $\text{var } X$.

┌ *Poznámka*

└ Rozptyl je střední čtvercová odchylka X od $\mathbb{E}X$. $\text{var } X = \mathbb{E}(X - \mathbb{E}X)^2 \geq 0$. $\text{var } X = 0$ právě tehdy, když $X = \mathbb{E}X$ skoro jistě.

Věta 4.6 (Základní vlastnosti rozptylu)

$$\text{var}(a + bX) = b^2 \text{var } X, \quad a, b \in \mathbb{R} \wedge X \in L^2.$$

┌ *Důkaz*

$$\text{var}(a+bX) = \mathbb{E}(a+bX - \mathbb{E}(a+bX))^2 = \mathbb{E}(a+bX - a - b\mathbb{E}X)^2 = \mathbb{E}(bX - b\mathbb{E}X)^2 = \mathbb{E}(b(X - \mathbb{E}X))^2 = b^2 \mathbb{E}(X - \mathbb{E}X)^2 = b^2 \text{var } X$$

└ □

Věta 4.7 (Čebyševova nerovnost)

Buď $X \in L^1$ náhodná veličina. Pak $P(|X - \mathbb{E}X| \geq a) \leq \frac{\text{var } X}{a^2}$, $\forall a > 0$.

┌ *Důkaz*

└ Viz TMI1. □

Definice 4.15 (Markovova nerovnost)

Buď $X \in L^n$, $n \in \mathbb{N}$, náhodná veličina. Pak $P(|X| \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}|X|^n}{a^n}$, $\forall a > 0$.

┌ *Důkaz*

└ Obdobně Čebyševově větě. □

Věta 4.8 (Nerovnost mezi L^p normami na pravděpodobnostních prostorech)

Buď X náhodná veličina, $0 < \alpha < \beta \in \mathbb{R}$ a $\mathbb{E}|X|^\beta < \infty$. Pak platí $\sqrt[\alpha]{\mathbb{E}|X|^\alpha} \leq \sqrt[\beta]{\mathbb{E}|X|^\beta}$, a speciálně tedy platí $\mathbb{E}|X| \leq \sqrt{\mathbb{E}X^2}$.

┌ *Důkaz*

$$\mathbb{E}|X|^\alpha = \int_{\mathbb{R}} |x|^\alpha dP_X(x) = \int_{\mathbb{R}} |x|^\alpha \cdot 1 dP_X(x) \stackrel{\text{Hölder na } p = \frac{\beta}{\alpha}}{\leq} \left(\int_{\mathbb{R}} |x|^\beta dP_X(x) \right)^{\frac{\alpha}{\beta}} \cdot \left(\int_{\mathbb{R}} 1^\beta dP_X(x) \right)^{\frac{1}{\beta}} = \dots \cdot 1.$$

(Integrál napravo je konečný z předpokladů této věty, tedy splňujeme předpoklady Höldera.) Odmocněním α dostáváme přesně chtěnou nerovnost. □

Například (Absolutně spojitá rozdělení)

Rovnoměrné rozdělení intervalu $[a, b]$, $a < b \in \mathbb{R}$ značíme $R([a, b])$ a jeho hustota je až na konstantu Lebesgueova míra: $f_X(x) = \frac{1}{b-a} 1_{(a,b)}(x)$.

$$F_X(t) = \begin{cases} 0, & t \leq a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & t \in [a, b], \\ 1, & t \geq b. \end{cases} \quad \mathbb{E}X = \int_a^b x \cdot \frac{1}{b-a} dx = \frac{b+a}{2}, \text{ var } X = \mathbb{E}X^2 - (\mathbb{E}X)^2 = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

Exponenciální rozdělení s parametrem $\lambda > 0$ značíme $Exp(\lambda)$. $P(X > t) = e^{-t\lambda}$, $t > 0$. $F_X(t) = P(X \leq t) = 1 - e^{-\lambda t}$ pro $t \geq 0$ a 0 pro $t \leq 0$. $f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}$, $x \geq 0$ a $f_X(x) = 0$ jinak. $\mathbb{E}X = \frac{1}{\lambda}$, $\text{var } X = \frac{1}{\lambda^2}$.

┌ *Poznámka*

└ Exponenciální rozdělení má vlastnost ztráty paměti, tedy že $P(X > s + t | X > s) = P(X > t)$, $s, t > 0$.

Normální (Gaussovo) rozdělení: Normované $N(0, 1)$ je $f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$, $x \in \mathbb{R}$. $F_X(t) = \int_{-\infty}^t \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$. Tyto F_X a f_X se často značí Φ a φ . $\mathbb{E}X = 0$ ($x \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$ je lichá funkce), $\text{var } X = \mathbb{E}(X - \mathbb{E}X)^2 = \mathbb{E}X^2 = 1$. $\mathbb{E}X^{2k+1} = 0$.

Obecné $N(\mu, \sigma^2)$, $\mu \in \mathbb{R}$, $\sigma^2 > 0$ má $f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \cdot e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$, $x \in \mathbb{R}$.

Tvrzení 4.9

Bud X nezáporná (tj. $P(X \geq 0) = 1$) absolutně spojitá náhodná veličina, která splňuje $P(X > s + t | X > s) = P(X > t)$, $\forall s, t > 0$, pak $X \sim \text{Exp}$.

┌ Důkaz

└ Dělat nebudeme. □

Věta 4.10

$X \sim N(0, 1)$ a $Y := \sigma X + \mu$, pro $\sigma > 0$, $\mu \in \mathbb{R}$. Pak $Y \sim N(\mu, \sigma^2)$.

┌ Důkaz

└ TODO!!! □

Důsledek

$$F_Y(t) = P(Y \leq t) = P(\sigma Z + \mu \leq t) = P\left(Z \leq \frac{t - \mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{t - \mu}{\sigma}\right).$$

Důsledek

$$\mathbb{E}Y = \mathbb{E}(\sigma Z + \mu) = \mu + \sigma \mathbb{E}Z = \mu + 0 = \mu.$$

$$\text{var } Y = \text{var}(\sigma Z + \mu) = \sigma^2 \cdot \text{var } Z = \sigma^2.$$

Věta 4.11 (Rozdělení funkce náhodné veličiny)

Bud X náhodná veličina s distribuční funkcí F_X , $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ měřitelná funkce. Pak $Y = g(X)$ je náhodná veličina s distribuční funkcí $F_Y(y) = \int_{\{x|g(x) \leq y\}} dF_X(x)$.

┌ Důkaz

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(g(X) \leq y) = P_X(\{x|g(x) \leq y\}) = \int_{\{x|g(x) \leq y\}} dF_X(x).$$

└ □

5 Náhodné vektory

Definice 5.1 (Náhodný vektor)

Měřitelné zobrazení $\mathbf{X} : (\Omega, \mathcal{A}, P) \rightarrow (\mathbb{R}^n, \mathcal{B}^n)$, $n \in \mathbb{N}$, nazveme náhodným vektorem.

Definice 5.2 (Rozdělení náhodného vektoru)

Rozdělením náhodného vektoru $\mathbf{X} : (\Omega, \mathcal{A}, P) \rightarrow (\mathbb{R}^n, \mathcal{B}^n)$ nazveme indukovanou pravděpodobnostní míru $P_{\mathbf{X}}$ na $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}^n)$ definovanou jako $P_{\mathbf{X}}(B) = P(\{\omega \in \Omega \mid \mathbf{X}(\omega) \in B\})$, $B \in \mathcal{B}^n$.

Definice 5.3 ((Sdružená) distribuční funkce)

(Sdružená) distribuční funkce náhodného vektoru \mathbf{X} je definována jako

$$F_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) = P\left(\bigcup_{i=1}^b (X_i \leq x_i)\right), \quad \forall \mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n.$$

Poznámka

$F_{\mathbf{X}}$ jednoznačně určuje $P_{\mathbf{X}}$.

Věta 5.1 (O marginální distribuční funkci)

Bud' \mathbf{X} n -rozměrný náhodný vektor s distribuční funkcí $F_{\mathbf{X}}$. Pak pro každé $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ platí

$$\lim_{x_n \rightarrow \infty} F_{\mathbf{X}}(x_1, \dots, x_n) = F_{(X_1, \dots, X_{n-1})^T}(x_1, \dots, x_{n-1}),$$

kde $F_{(X_1, \dots, X_{n-1})^T}$ je distribuční funkce náhodného vektoru $(X_1, \dots, X_{n-1})^T$.

Důkaz

Použijeme Heineho větu: Necht' máme posloupnost čísel $\{y_k\}_{k=1}^{\infty}$ takových, že $y_k \rightarrow \infty$. Označme $B = \bigcup_{i=1}^{n-1} \{X_i \leq x_i\}$. $B_k = \left(\bigcup_{i=1}^{n-1} \{X_i \leq x_i\}\right) \cap \{X_n \leq y_k\}$, $D_k = \left(\bigcup_{l=k}^{\infty} B_l^c\right)^c$, $k \in \mathbb{N}$. Zřejmě $D_k \subseteq B_k \subset B = \bigcup_{k=1}^{\infty} B_k$ a $D_k \nearrow B$. Ze spojitosti P máme $\lim_{k \rightarrow \infty} P(D_k) = P(B)$. Nakonec z monotonie P máme $P(D_k) \leq P(B_k) \leq P(B)$, tedy ze dvou strážníků $\lim_{k \rightarrow \infty} P(B_k) = P(B)$. \square

Poznámka

Pro každou permutaci $\pi \in \mathcal{S}_n$ platí

$$F_{\mathbf{X}}(x_1, \dots, x_n) = F_{(X_{\pi(1)}, \dots, X_{\pi(n)})^T}(x_{\pi(1)}, \dots, x_{\pi(n)}).$$

Rozdělení $P_{\mathbf{Y}}$ podvektoru $\mathbf{Y} = (X_j)_{j \in J}$, $J \subset \{1, \dots, n\} = I$ se nazývá marginální rozdělení (a distribuční funkce se nazývá marginální distribuční funkce).

Rozdělení (X_1, \dots, X_n) určuje rozdělení X_1, \dots, X_n , ale ne naopak.

Definice 5.4 (Značení)

Mějme dva body $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ a buď $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^n$ takový, že $c_i \in \{a_i, b_i\}, \forall i \in [n]$. Potom

$$\Delta_{n,k} = \{c \mid c_i = a_i \text{ právě pro } k \text{ indexů}\}, \quad k \in [n]_0.$$

Věta 5.2 (O vlastnostech sdružené distribuční funkce)

Distribuční funkce náhodného vektoru \mathbf{X} splňuje:

1. $\lim_{x_i \rightarrow \infty \forall i} F_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) = 1;$
2. $\forall j \forall x_1, \dots, x_{j-1}, x_{j+1}, \dots, x_n : \lim_{x_j \rightarrow -\infty} F_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) = 0;$
3. $F_{\mathbf{X}}$ je zprava spojitá v každé proměnné;
4. $\forall \mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n, a_i < b_i, \forall i \in [n]$ platí $\sum_{k=0}^n (-1)^k \sum_{\mathbf{c} \in \Delta_{n,k}} F_{\mathbf{X}}(\mathbf{c}) \geq 0$. („Monotonie“.)

┌

Důkaz

1. Uvědomme si, že $x_i \rightarrow \infty, \forall i \in [n] \Leftrightarrow \min_{i \in [n]} x_i \rightarrow \infty$. Z monotonie pravděpodobnosti P máme $1 \geq F_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) \geq F_{\mathbf{X}}(\min_i x_i \cdot (1, \dots, 1))$. Stačí ukázat, že pro funkci $H(x) := F_{\mathbf{X}}(x \cdot (1, \dots, 1))$ platí $\lim_{x \rightarrow +\infty} H(x) = 1$. $H(x)$ je neklesající funkce x (z monotonie pravděpodobnosti P a definice distribuční funkce) a $H(x) \leq 1, \forall x \in \mathbb{R}$. Takže musí $\exists \lim_{x \rightarrow \infty} \leq 1$ a nutně bude i rovna limitě $\lim_{\mathbb{N} \ni k \rightarrow \infty} (k)$. Označme $B_k = (-\infty, k \cdot (1, \dots, 1)]$. Platí $B_k \nearrow \mathbb{R}^n$, takže ze spojitosti pravděpodobnosti $H(k) = P_{\mathbf{X}}(B_k) \rightarrow 1$.

2. 3. analogicky (za domácí úkol).

4. (jen pro $n = 2$, pro $n > 2$ je důkaz zbytečně technický):

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n (-1)^k \sum_{\mathbf{c} \in \Delta_{n,k}} F_{\mathbf{X}}(\mathbf{c}) &= F_{\mathbf{X}}(b_1, b_2) - [F_{\mathbf{X}}(b_1, a_2) + F_{\mathbf{X}}(a_1, b_2)] + F_{\mathbf{X}}(a_1, a_2) = \\ &= [F_{\mathbf{X}}(b_1, b_2) - F_{\mathbf{X}}(b_1, a_2)] - [F_{\mathbf{X}}(a_1, b_2) - F_{\mathbf{X}}(a_1, a_2)] = \\ &= P(X_1 \leq b_1 \wedge a_2 < X_2 \leq b_2) - P(X_1 \leq a_1 \wedge a_2 < X_2 \leq b_2) = \\ &= P(a_1 < X_1 \leq b_1 \wedge a_2 < X_2 \leq b_2). \end{aligned}$$

└

□

Poznámka

Pro každý interval $(\mathbf{a}, \mathbf{b}]$ v \mathbb{R}^n definujeme $\mu_F((\mathbf{a}, \mathbf{b}]) = 4$. z předchozího pro F splňující tvrzení předchozí věty. Potom lze rozšířit μ_F na konečnou borelovskou míru na \mathbb{R}^n a té se říká Lebesgueova-Stieltjesova míra příslušná F .

Pokud $F = F_{\mathbf{X}}$ od \mathbf{X} s rozdělením $P_{\mathbf{X}}$, pak nutně $\mu_F = P_{\mathbf{X}}$, neboť se rovnají na intervalech $\{(\mathbf{a}, \mathbf{b}] \mid \mathbf{a} < \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n\}$, což je systém uzavřený na konečné průniky generující \mathcal{B}^n .

Věta 5.3

Nechť F splňuje vlastnosti sdružené distribuční funkce. Pak \exists pravděpodobnostní prostor (Ω, \mathcal{A}, P) a náhodný vektor \mathbf{X} takový, že $F = F_{\mathbf{X}}$.

┌

Důkaz

Vezměme $\Omega := \mathbb{R}^n$, $\mathcal{A} = \mathcal{B}^n$, $P = \mu_F$ a $\mathbf{X} = \text{id}$. Pak je \mathbf{X} zřejmě měřitelné, tedy je to náhodný vektor. Navíc

$$F_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) = P(\{\omega \in \Omega \mid \omega_i \leq x_i, \forall i \in [n]\}) = \mu_F((-\infty, \mathbf{x}]) = F(\mathbf{x}).$$

└

□

Definice 5.5 (Diskrétní rozdělení)

Náhodný vektor \mathbf{X} má diskrétní rozdělení, pokud \exists (konečná nebo spočetná) množina $\{\mathbf{x}_i\}_{i \in I} \subset \mathbb{R}^n$ a hodnoty $\{p_i\}_{i \in I}$ splňující $\forall i \in I : p_i \in (0, 1]$, $\sum_{i \in I} p_i = 1$, tak že $P(\mathbf{X} = \mathbf{x}_i) = p_i$.

┌

Poznámka

Pak nutně $P_{\mathbf{X}} = \sum_{i \in I} p_i \delta_{\mathbf{x}_i}$.

└

Také zřejmě marginální rozdělení jsou též diskrétní.

Definice 5.6 ((Absolutně) spojitě rozdělení)

Náhodný vektor \mathbf{X} má (absolutně) spojitě rozdělení, existuje-li nezáporná měřitelná funkce $f_{\mathbf{X}} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ taková, že

$$F_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) = \int_{(-\infty, x_1]} \int_{(-\infty, x_2]} \dots \int_{(-\infty, x_n]} f_{\mathbf{X}}(t_1, \dots, t_n) dt_n \dots dt_1, \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n.$$

Poznámka

To nastává právě tehdy, když $P_{\mathbf{X}} \ll \lambda^n$. Potom $f_{\mathbf{X}} = \frac{\partial^n}{\partial x_1 \dots \partial x_n} F_{\mathbf{X}}$ λ^n skoro všude.

Věta 5.4 (O hustotě $P_{\mathbf{X}}$ vzhledem k součinné referenční míře)

Buď $P_{\mathbf{X}}$ rozdělení n -rozměrného náhodného vektoru \mathbf{X} . Nechť $P_{\mathbf{X}} \ll \nu_1 \otimes \dots \otimes \nu_n$ (součin σ -konečných měr na \mathbb{R}). Pak $P_{X_i} \ll \nu_i$, $\forall i \in [n]$, a existují nezáporné měřitelné funkce $f_{\mathbf{x}} : \mathbb{R}^n \rightarrow [0, \infty)$, $f_{x_i} : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty)$, $i \in [n]$ takové, že

$$P_{\mathbf{X}}((-\infty, \mathbf{x}]) = F_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) = \int_{(-\infty, x_1]} \dots \int_{(-\infty, x_n]} f_{\mathbf{x}}(t_1, \dots, t_n) d\nu_n(t_n) \dots d\nu_1(t_1), \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n,$$

$$P_{\mathbf{X}}(B) = \int_B f_{\mathbf{x}}(\mathbf{t}) d(\nu_1 \otimes \dots \otimes \nu_n)(\mathbf{t}), \quad \forall B \in \mathcal{B}^n.$$

Navíc pro každé $x_i \in \mathbb{R}$, $i \in [n]$ platí

$$F_{X_i}(x_i) = \int_{(-\infty, x_i]} f_{x_i}(t) d\nu_i(t),$$

kde $f_{X_i}(y_i) = \int_{\mathbb{R}^{n-1}} f_{\mathbf{x}}(y_1, \dots, y_n) d(\nu_1 \otimes \dots \otimes \nu_{i-1} \otimes \nu_{i+1} \otimes \dots \otimes \nu_n)(y_1, \dots, y_{i-1}, y_{i+1}, \dots, y_n)$ pro ν_i -skoro všechna $y_i \in \mathbb{R}$.

┌

Důkaz

Snadný: existence a tvrzení o $f_{\mathbf{x}}$ plyne z Radon-Nikodymovy věty a přepis v 1. vzorci a tvrzení o f_i plyne z Fubiniovy věty a věty o marginální distribuční funkci. \square

└

6 Nezávislé náhodné veličiny

Definice 6.1 ((Vzájemně) nezávislé náhodné veličiny)

Buď $\{X_i\}_{i \in I}$ systém náhodných veličin na (Ω, \mathcal{A}, P) , kde $I \neq \emptyset$ je libovolná indexová množina. $\{X_i\}_{i \in I}$ nazveme (vzájemně) nezávislé, pokud \forall konečnou neprázdnou $J \subset I$, platí

$$P\left(\bigcap_{i \in J} \{X_i \in B_i\}\right) = \prod_{i \in J} P(X_i \in B_i), \quad B_i \in \mathcal{B}, i \in J.$$

Poznámka

Pro nezávislé náhodné veličiny jsou jevy $(X_i \in B_i)$ nezávislé.

Věta 6.1 (O rozdělení vektoru s nezávislými složkami)

Buď $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)^T$ náhodný vektor. Pak $\{X_i\}_{i=1}^n$ jsou nezávislé náhodné veličiny právě tehdy, když $P_{\mathbf{X}} = P_{X_1} \otimes \dots \otimes P_{X_n}$.

┌

Důkaz

„ \Leftarrow “ zřejmě. „ \Rightarrow “: $\forall B_1, \dots, B_n \in \mathcal{B}$ platí $P_{\mathbf{X}}(B_1 \times \dots \times B_n) = \prod_{i=1}^n P_{X_i}(B_i)$ plyne z definice nezávislosti, takže $P_{\mathbf{X}}$ se rovná součinové míře na měřitelných obdélnících $\{B_1 \times \dots \times B_n | B_i \in \mathcal{B}\}$, ale tento systém je uzavřený na konečné průniky a generuje \mathcal{B}^n , tedy z věty o jednoznačnosti míry se $P_{\mathbf{X}}$ a $P_{X_1} \otimes \dots \otimes P_{X_n}$ rovnají na celém \mathcal{B}^n . \square

└

Věta 6.2 (O distribuční funkci náhodného vektoru s nezávislými složkami)

Za předpokladů předchozí věty platí, že $\{X_i\}_{i=1}^n$ jsou vzájemně nezávislé právě tehdy, když $F_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^n F_{X_i}(x_i)$, $\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$.

┌
Důkaz

„ \implies “ zřejmě neboť $F_{\mathbf{X}}(x_1, \dots, x_n) = P(\bigcup \dots) = \prod P(X_i \in (-\infty, x_i]) = \prod_{i=1}^n F_{X_i}(x_i)$.
 „ \impliedby “: Množiny $(-\infty, \dots] \times \dots$ tvoří systém uzavřený na konečné průniky a generující \mathcal{B}^n , tedy z rovnosti $P_{\mathbf{X}}$ a součinnové míry na tomto systému už plyne rovnost dvou měr na \mathcal{B}^n (pomocí věty o jednoznačnosti míry). \square
 └

Věta 6.3 (O hustotě vektoru s nezávislými složkami)

Bud $P_{\mathbf{X}}$ rozdělení n -rozměrného náhodného vektoru \mathbf{X} splňující $P_{\mathbf{X}} \ll \nu_1 \otimes \dots \otimes \nu_n$ (součin σ -konečných měr) a bud $f_{\mathbf{X}}$ hustota náhodného vektoru \mathbf{X} . Pak náhodné veličiny X_1, \dots, X_n jsou vzájemně nezávislé $\Leftrightarrow f_{\mathbf{X}}(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n f_{X_i}(x_i)$ pro $\nu_1 \otimes \dots \otimes \nu_n$ -skoro všechna $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, kde $f_{x_i} = \frac{dP_{X_i}}{d\nu_i}$, $i \in [n]$.

┌
Důkaz

„ \implies “: použijeme charakterizaci nezávislosti složek pomocí distribuční funkce:

$$\int_{(-\infty, \mathbf{x}]} \prod_{i=1}^n f_{X_i}(t_i) d(\nu_1 \otimes \dots \otimes \nu_n)(\mathbf{t}) = \int_{-\infty}^{x_1} \dots \int_{-\infty}^{x_n} \prod_{i=1}^n f_{X_i}(t_i) d\nu_n(t_n) \dots d\nu_1(t_1) = \prod_{i=1}^n \int_{-\infty}^{x_i} f_{x_i}(t_i) d\nu_i(t_i) \prod_{i=1}^n$$

Takže $f_{\mathbf{X}} = \prod_{i=1}^n f_{X_i} \nu_1 \otimes \dots \otimes \nu_n$ -skoro všude. „ \impliedby “ dokážeme obdobně obráceným postupem. \square
 └

Věta 6.4

Bud $\{X_i\}_{i \in I}$ systém nezávislých náhodných veličin a $g_i : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, i \in I$ měřitelné funkce. Pak $\{g_i(X_i)\}_{i \in I}$.

┌
Důkaz

Dokážeme z definice: Bud $J \subset I$ konečná neprázdná

$$P\left(\bigcap_{i \in J} \{g_i(X_i) \in B_i\}\right) = P\left(\bigcap_{i \in J} \{X_i \in g_i^{-1}(B_i)\}\right) = \prod_{i \in J} P(X_i \in g_i^{-1}(B_i)) = \prod_{i \in J} P(g_i(x_i) \in B_i), \quad \forall B_i \in \mathcal{B}.$$

└

7 Momenty náhodného vektoru

Definice 7.1 (Notace: střední hodnota náhodného vektoru)

$$\mathbb{E}\mathbf{X} := (\mathbb{E}X_1, \dots, \mathbb{E}X_n)^T.$$

Definice 7.2 (Kovariance, korelace)

Budte X, Y náhodné veličiny na pravděpodobnostním prostoru (Ω, \mathcal{A}, P) . Pak kovariance X a Y je definovaná jako $\text{cov}(X, Y) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}X)(Y - \mathbb{E}Y)]$. Korelace X a Y je definována jako $\text{cor}(X, Y) = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{var } X} \cdot \sqrt{\text{var } Y}}$, pokud $\text{var } X \cdot \text{var } Y > 0$.

Věta 7.1 (Hölderova nerovnost)

Budte X_1, X_2 náhodné veličiny na stejném pravděpodobnostním prostoru a necht $\mathbb{E}|X_1|^p < \infty$, $\mathbb{E}|X_2|^q < \infty$, $p, q > 1$ a $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Pak $\mathbb{E}|X_1 \cdot X_2| \leq (\mathbb{E}|X_1|^p)^{\frac{1}{p}} \cdot (\mathbb{E}|X_2|^q)^{\frac{1}{q}}$, a rovnost nastává, když $X_1 = c \cdot X_2$ skoro jistě.

Důkaz

MA3. □

Důsledek

$\mathbb{E}|X_1 \cdot X_2| \leq \sqrt{\mathbb{E}X_1^2 \cdot \mathbb{E}X_2^2}$, takže $|\text{cov}(X, Y)| \leq \sqrt{\text{var } X \cdot \text{var } Y}$ a $\text{cor}(X, Y) \in [-1, 1]$. Navíc $|\text{cor}(X, Y)| = 1 \Leftrightarrow X = aY + b$ skoro jistě pro nějaké $a \neq 0$, $b \in \mathbb{R}$.

Věta 7.2

Budte náhodné veličiny X_1 a X_2 nezávislé a $\mathbb{E}|X_i| < \infty$, $i = 1, 2$. Pak $\mathbb{E}|X_1 \cdot X_2| < \infty$ a platí $\mathbb{E}(X_1 \cdot X_2) = (\mathbb{E}X_1) \cdot (\mathbb{E}X_2)$.

Důkaz

$$\mathbb{E}(X_1 \cdot X_2) = \int_{\mathbb{R}^2} x_1 \cdot x_2 dP_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) = \int_{\mathbb{R}^2} x_1 \cdot x_2 d(P_{X_1} \otimes P_{X_2})(\mathbf{x}) = \int_{\mathbb{R}} x_1 dP_{x_1} \cdot \int_{\mathbb{R}} x_2 dP_{x_2} = (\mathbb{E}X_1) \cdot (\mathbb{E}X_2),$$

z Fubiniovy věty, pokud $\mathbb{E}|X_1 \cdot X_2| < \infty$. Uvažujme $\Phi_n(x_1, x_2) = |x_1| \cdot 1_{|x_1| \leq n} \cdot |x_2| 1_{|x_2| \leq n}$. Pak $\mathbb{E}\Phi_n(X_1, X_2) =$

$$\int_{\mathbb{R}^2} |x_1| \cdot |x_2| 1_{|x_1| \leq n} \cdot 1_{|x_2| \leq n} dP_{X_1} \otimes dP_{X_2}(x_1, x_2) = \mathbb{E}(|X_1| 1_{\{|X_1| \leq n\}}) \cdot \mathbb{E}(|X_2| 1_{\{|X_2| \leq n\}}) \leq \mathbb{E}|X_1| \cdot \mathbb{E}|X_2|.$$

Takže $\Phi_n(X_1, X_2) \nearrow |X_1, X_2|$ z Léviho věty $\mathbb{E}|X_1 \cdot X_2|$ existuje a z poslední nerovnosti je $\mathbb{E}|X_1, X_2| \leq \mathbb{E}|X_1| \cdot \mathbb{E}|X_2|$. □

Věta 7.3 (P cov a var pro nezávislost náhodných veličin)

Budte X_1, \dots, X_n nezávislé náhodné veličiny, $\mathbb{E}X_i^2 < \infty$, $\forall i \in [n]$. Pak $\text{cov}(X_i, X_j) = 0$, $i \neq j$. $\forall a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ platí $\text{var}(\sum_{i=1}^n a_i X_i) = \sum_{i=1}^n a_i^2 \text{var } X_i$.

┌
Důkaz

$\text{cov}(X_i, X_j) = \mathbb{E}[(X_i - \mathbb{E}X_i)(X_j - \mathbb{E}X_j)] = \mathbb{E}X_i X_j - \mathbb{E}X_i(\mathbb{E}X_j) - (\mathbb{E}X_i)\mathbb{E}X_j + \mathbb{E}X_i + \mathbb{E}X_j = \mathbb{E}(X_i X_j) - (\mathbb{E}X_i)(\mathbb{E}X_j)$
z nezávislosti a předchozí věty.

$$\text{var} \left(\sum_{i=1}^n a_i X_i \right) = \mathbb{E} \left(\sum_{i=1}^n a_i X_i - \mathbb{E} \left(\sum_{i=1}^n a_i X_i \right) \right)^2 = \mathbb{E} \left(\sum_{i=1}^n a_i (X_i - \mathbb{E}X_i) \right)^2 = \sum_{i=1}^n a_i^2 \text{var} X_i + 2 \sum_{i=1}^n \sum_{j=i+1}^n a_i a_j \text{cov}(X_i, X_j)$$

└

□

Definice 7.3 (Nekorelované náhodné veličiny)

Náhodné veličiny X a Y s $\text{cov}(X, Y) = 0$ nazveme nekorelované.

Definice 7.4 (Varianční matice, korelační matice)

Varianční matice n -rozměrného náhodného vektoru \mathbf{X} je matice $n \times n$ s prvky $a_{ij} = \text{cov}(X_i, X_j)$, $i, j \in [n]$, tj.

$$\text{Var } \mathbf{X} = \mathbb{E}(\mathbf{X} - \mathbb{E}\mathbf{X})(\mathbf{X} - \mathbb{E}\mathbf{X})^T.$$

Korelační matice n -rozměrného náhodného vektoru \mathbf{X} je matice $n \times n$ s prvky $a_{ij} = \text{cov}(X_i, X_j)$, $i, j \in [n]$.

Věta 7.4 (O vlastnostech varianční matice)

Bud' $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)^T$ náhodný vektor takový, že $\forall i \in [n] : \mathbb{E}(X_i^2) < \infty$. Pak

1. $\text{Var } \mathbf{X}$ je symetrická a pozitivně semidefinitní;
2. pro libovolné $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^m$ a matici B typu $m \times n$ je $\text{Var}(\mathbf{a} + B\mathbf{X}) = B(\text{Var } \mathbf{X})B^T$;
3. $|\text{cov}(X_i, X_j)| \leq \sqrt{\text{var}(X_i) \cdot \text{var}(X_j)}$, a rovnost nastává právě tehdy, když existují konstanty a, b , že $X_i = a + bX_j$ skoro jistě;
4. jsou-li X_1, \dots, X_n vzájemně nezávislé, pak $\text{Var } \mathbf{X}$ je diagonální;
5. $\text{Var } \mathbf{X}$ je singulární \Leftrightarrow existují $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$, alespoň jedno nenulové, taková, že $\sum_{i=1}^n a_i X_i = k$ skoro jistě, kde k je nějaká konstanta.

┌ *Důkaz*

1. symetrická zřejmě, pro pozitivní semidefinitnost chceme dokázat, že $\mathbf{a}(\text{Var } \mathbf{X})\mathbf{a}^T \geq 0$ (rozepíšeme jako v minulé větě):

$$\mathbf{a}(\text{Var } \mathbf{X})\mathbf{a}^T = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_i a_j \text{cov}(X_i, X_j) = \text{var}\left(\sum_{i=1}^n a_i X_i\right) \geq 0.$$

Ve 2. snadně dokážeme $\mathbb{E}(B\mathbf{X}) = B\mathbb{E}\mathbf{X}$. Tedy

$$\text{Var}(\mathbf{a} + B\mathbf{X}) = \mathbb{E}(\mathbf{a} + B\mathbf{X} - \mathbb{E}(\mathbf{a} + B\mathbf{X}))(\mathbf{a} + B\mathbf{X} - \mathbb{E}(\mathbf{a} + B\mathbf{X}))^T = \mathbb{E}(B\mathbf{X} - \mathbb{E}(B\mathbf{X}))(B\mathbf{X} - \mathbb{E}(B\mathbf{X}))^T = \mathbb{E}(B(\mathbf{X} - \mathbb{E}\mathbf{X}))(B(\mathbf{X} - \mathbb{E}\mathbf{X}))^T = B\mathbb{E}(\mathbf{X} - \mathbb{E}\mathbf{X})(\mathbf{X} - \mathbb{E}\mathbf{X})^T B^T = B\text{Var } \mathbf{X} B^T.$$

3. už jsme ukázali jako důsledek Hölderovy nerovnosti. Bod 4. je zřejmý z věty o kovarianci pro nezávislé náhodné veličiny.

5. $\text{Var } \mathbf{X}$ je singulární $\Leftrightarrow \exists \mathbf{a} \in \mathbb{R}^n, \mathbf{a} \neq \mathbf{0}$ tak, že $\mathbf{a}(\text{Var } \mathbf{X})\mathbf{a}^T = 0$, ale $\mathbf{a}(\text{Var } \mathbf{X})\mathbf{a}^T = \mathbb{E}(\mathbf{aX} - \mathbb{E}\mathbf{aX})^2 = 0 \Leftrightarrow \mathbf{aX} = \mathbb{E}\mathbf{aX}$ skoro jistě. \square

Věta 7.5 (O momentech výběrového průměru)

Budte X_1, \dots, X_n nezávislé (nebo jen nekorelované) náhodné veličiny a budte $\mathbb{E}X_i = \mu$, $\text{var } X_i = \sigma^2$, $i \in [n]$, kde $\mu \in \mathbb{R}$, $\sigma^2 \geq 0$. Pak pro $\overline{X_n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ platí $\mathbb{E}\overline{X_n} = \mu$ a $\text{var } \overline{X_n} = \frac{\sigma^2}{n}$.

┌ *Důkaz*

Rozepsáním z linearitě střední hodnoty a z věty o vlastnostech varianční matice bod 2. \square

8 Rozdělení transformovaného náhodného vektoru

Věta 8.1

Budte X, Y nezávislé náhodné veličiny a $\psi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ měřitelná. Pak náhodná veličina $U = \psi(X, Y)$ má distribuční funkci

$$G_U(u) = \int_{\mathbb{R}} \int_{\{y | \psi(x, y) \leq u\}} dF_Y(y) dF_X(x) = \int_{\mathbb{R}} \int_{\{y | \psi(x, y) \leq u\}} dP_Y(y) dP_X(x) =$$

$$G_U(u) = \int_{\mathbb{R}} \int_{\{x | \psi(x, y) \leq u\}} dF_X(x) dF_Y(y) = \int_{\mathbb{R}} \int_{\{x | \psi(x, y) \leq u\}} dP_X(x) dP_Y(y), \quad \forall u \in \mathbb{R}.$$

┌ *Důkaz*

Víme, že $\mathbb{E}U = \int_{\mathbb{R}^2} \psi(x, y) d(P_X \otimes P_Y)(x, y)$. Použijeme Fubiniovu větu a vzorec použijeme pro náhodnou veličinu $\tilde{U}(u) = 1_{(U \leq u)} = 1_{(\psi(X, Y) \leq u)}$. To nám dá

$$G_U(u) = P(U \leq u) = \mathbb{E}1_{(U \leq u)} = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} 1_{(\psi(x, y) \leq u)} dP_Y(y) dP_X(x).$$

└

□

Věta 8.2 (O rozdělení součtu)

Budte X, Y nezávislé náhodné veličiny. Pak náhodná veličina $U = X + Y$ má distribuční funkci

$$F_U(u) = \int_{\mathbb{R}} F_x(u - y) dF_Y(y) = \int_{\mathbb{R}} F_Y(u - x) dF_X(x), \quad \forall u \in \mathbb{R}.$$

┌ *Důkaz*

Dosazením do předchozí věty.

└

□

Definice 8.1 (Konvoluce)

Bud' $\psi(x, y) = x + y$. Pak $\psi(P_X \otimes P_Y)$ se nazývá konvoluce pravděpodobnostních rozdělení P_X a P_Y . Budte F_X a F_Y distribuční funkce. Pak F_U definovaná jako $F_U(u) = \int_{\mathbb{R}} F_X(u - y) dF_Y(y) = \int_{\mathbb{R}} F_Y(u - x) dF_X(x)$ se nazývá konvoluce distribučních funkcí. Značíme $P_X * P_Y$, resp. $F_X * F_Y$.

Důsledek (Věty o rozdělení součtu nezávislých náhodných veličin)

Budte X, Y nezávislé náhodné veličiny a budte obě absolutně spojitě. Pak $U = X + Y$ je také absolutně spojitá s hustotou $f_U(u) = \int_{\mathbb{R}} f_X(u - y) dy = \int_{\mathbb{R}} f_Y(u - x) f_X(x) dx$, $u \in \mathbb{R}$.

┌ *Důkaz*

Dosazením.

└

□

Poznámka

Pro ne-nezávislá X, Y lze snadno odvodit analogický vzorec (s jinou než součinnovou mírou).

Věta 8.3

Budte nezávislé náhodné veličiny X a Y čítací (tj. $P(X \in \mathbb{N}_0) = 1 = P(Y \in \mathbb{N}_0)$). Pak $U = X + Y$ je také čítací náhodná veličina a $P(U = u) = \sum_{n=0}^u P(X = n) \cdot P(Y = u - n)$, $u \in \mathbb{N}_0$.

┌ *Důkaz*

Snadno z věty o úplné pravděpodobnosti.

└

□

Věta 8.4 (O transformaci hustot)

Bud \mathbf{X} n -rozměrný absolutně spojitý náhodný vektor s hustotou $f_{\mathbf{X}}$. Bud $S_{\mathbf{X}}$ otevřená množina taková, že $P(\mathbf{X} \in S_{\mathbf{X}}) = 1$, a $g : S_{\mathbf{X}} \rightarrow \mathbb{R}^n$ difeomorfismus. Pak rozdělení náhodného vektoru $\mathbf{Y} = g(\mathbf{X})$ má vzhledem k λ^n hustotu $f_{\mathbf{Y}}(\mathbf{y}) = f_{\mathbf{X}}(g^{-1}(\mathbf{y})) \cdot |\text{Jac } g^{-1}(\mathbf{y})|_{g(S_{\mathbf{X}})}(\mathbf{y})$, $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$.

┌

Důkaz

Z věty o obrazu míry víme, že $P_{\mathbf{X}}(A) = P_{\mathbf{Y}}(g(A))$, $\forall A \in \mathcal{B}^n$, resp. $\forall g(A) \in \mathcal{B}^n$. Pokud existuje hustota $f_{\mathbf{Y}}$, pak je to také rovno $\int_{g(A)} f_{\mathbf{Y}}(\mathbf{y}) d\mathbf{y}$. Z předpokladů máme, že g^{-1} je difeomorfismus na $g(S_{\mathbf{X}})$. Použijeme větu o substituci s volbami $h = f_{\mathbf{X}}$, $\varphi = g^{-1}$, $M = g(S_{\mathbf{X}})$ a $N = A$ a dostaneme

$$P_{\mathbf{X}}(A) = \int_A f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = \int_{g(A)} f_{\mathbf{X}}(g^{-1}(\mathbf{y})) |\text{Jac } g^{-1}(\mathbf{y})| d\mathbf{y},$$

pro každou $A \subset g^{-1}(g(S_{\mathbf{X}})) = S_{\mathbf{X}}$, resp. $\forall g(A) \subset g(S_{\mathbf{X}})$. Levý integrál zřejmě existuje, tedy existuje i pravý. Z předpokladů víme $\int_{S_{\mathbf{X}}^c} f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = P(\mathbf{X} \in S_{\mathbf{X}}^c) = 0$ a také $\int_{(g(S_{\mathbf{X}}))^c} f_{\mathbf{Y}}(\mathbf{y}) d\mathbf{y} = 0$ a oba integrály jsou nulové i pro všechny podmnožiny $S_{\mathbf{X}}^c$, resp. $(g(S_{\mathbf{X}}))^c$. Takže $\forall B \in \mathcal{B}^n$ a funkci $f_{\mathbf{Y}}$ ze znění dostáváme:

$$P_{\mathbf{Y}}(B) = P_{\mathbf{Y}}(B \cap g(S_{\mathbf{X}})) + P_{\mathbf{Y}}(B \setminus g(S_{\mathbf{X}})) = P_{\mathbf{X}}(g^{-1}(B \cap g(S_{\mathbf{X}}))) + 0 = \int_{B \cap g(S_{\mathbf{X}})} f_{\mathbf{Y}} d\mathbf{y} + 0 = \int_{B \cap g(S_{\mathbf{X}})} f_{\mathbf{Y}} d\mathbf{y} = \dots$$

┌ A tedy $f_{\mathbf{Y}}$ je opravdu hustota \mathbf{Y} . □

9 Mnoharozměrné normální rozdělení

Definice 9.1 (Mnoharozměrné normální rozdělení)

Bud $\mathbf{Z} = (Z_1, \dots, Z_r)^T$, $r \in \mathbb{N}$, r -rozměrný váhový vektor, kde Z_i jsou vzájemně nezávislé a $Z_i \sim N(0, 1)$, $i \in [r]$. Bud $A_{n \times r}$, $n \in \mathbb{N}$ matice a $\mu = (\mu_1, \dots, \mu_n) \in \mathbb{R}^n$ pevný vektor. Náhodný vektor definovaný jako $\mathbf{X} = A\mathbf{Z} + \mu$ má n -rozměrné normální rozdělení s parametry μ a $\Sigma = AA^T$. Značíme $N_n(\mu, \Sigma)$.

Důsledek

- $\mathbf{Z} \sim N_r(\mathbf{0}, I_n)$.
- $\mathbb{E}\mathbf{X} = \mu$.
- Pro $k \in \mathbb{N}$ a matici $B_{k \times n}$ platí, že $\mathbf{Y} = B\mathbf{X} \sim N_k(B\mu, B\Sigma B^T)$.

- Speciálně pro vektor $\mathbf{c} = (c_1, \dots, c_n) \in \mathbb{R}^n$ má \mathbf{cX} jednorozměrné normální rozdělení $N(\mathbf{c}\mu, \mathbf{c}\Sigma\mathbf{c}^T)$.

┌
Důkaz

Byl na přednášce, ale jednoduchý. □

Věta 9.1 (O hustotě n -rozměrného normálního rozdělení)

Buď \mathbf{X} náhodný vektor s rozdělením $N_n(\mu, \Sigma)$, kde Σ je regulární matice. Pak $P_{\mathbf{X}} \ll \lambda^n$ a

$$f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}} \sqrt{\det \Sigma}} e^{-\frac{1}{2}(\mathbf{x}-\mu)^T \Sigma^{-1}(\mathbf{x}-\mu)}, \quad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n.$$

┌
Důkaz

Nejdříve buď $\mathbf{X} \sim N_n(0, I_n)$. Pak $X_i = Z_i$ z definice a víme tedy, že $X_i \sim N(0, 1)$ a X_i jsou vzájemně nezávislé, tedy

$$f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x_i^2}{2}}, \quad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n.$$

Následně buď Σ pozitivně definitní, $\mu \in \mathbb{R}^n$. Pak $\exists A_{n \times n}$ taková, že $\sigma = AA^T$ a A je regulární. Položme $\mathbf{Y} = A\mathbf{X} + \mu$, kde \mathbf{X} je vektor ze začátku důkazu. Tedy $\mathbf{Y} \sim N_n(\mu, A^T A = \Sigma)$. Použijeme větu o transformaci hustot na odvození $f_{\mathbf{Y}}$:

Mějme zobrazení $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, $g(\mathbf{x}) = A\mathbf{x} + \mu$. g je difeomorfismus na \mathbb{R}^n , $|\text{Jac } g| = |\det A| \neq 0$, tedy můžeme volit $S_{\mathbf{X}} = \mathbb{R}^n$, $g(S_{\mathbf{X}}) = \mathbb{R}^n$, $g^{-1}(\mathbf{y}) = A^{-1}(\mathbf{y} - \mu)$, tedy:

$$\begin{aligned} f_{\mathbf{Y}}(\mathbf{y}) &= \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \cdot \frac{1}{|\det A|} \cdot e^{-\frac{1}{2}(A^{-1}(\mathbf{y}-\mu))^T (A^{-1}(\mathbf{y}-\mu))} = \\ &= \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \cdot \frac{1}{\sqrt{\det \Sigma}} \cdot e^{-\frac{1}{2}(\mathbf{y}-\mu)^T \Sigma^{-1}(\mathbf{y}-\mu)}, \quad \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n. \end{aligned}$$

└ □

Důsledek (O marginálních rozděleních v N_n)

Buď \mathbf{X} náhodný vektor $\sim N_n(\mu, \Sigma)$. Pak marginální rozdělení X_i je $N(\mu_i, \sigma_i^2)$, kde $\sigma_i^2 = \Sigma_{i,i} = \text{var } X_i$. A podvektor $(X_i, X_j)^T$, $i \neq j$, má rozdělení $N_2 \left(\begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \sigma_i^2 & \varrho_{ij}\sigma_i\sigma_j \\ \varrho_{ij}\sigma_i\sigma_j & \sigma_j^2 \end{pmatrix} \right)$, kde $\varrho_{ij} = \text{cor}(X_i, X_j)$.

┌
Důkaz

Použijeme předchozí důsledek definice, čtvrtý bod pro první část a třetí bod pro druhou část. □

Tvrzení 9.2

Nechť máme náhodný vektor $(X, Y)^T \sim N_2$. Pak mají X, Y jednorozměrné normální rozdělení. Pokud navíc $\text{cov}(X, Y) = 0$, pak jsou X a Y nezávislé.

Definice 9.2 (χ^2 -rozdělení)

Buďte X_1, \dots, X_n , $n \in \mathbb{N}$ nezávislé náhodné veličiny s rozdělením $N(0, 1)$. Pak náhodná veličina $Y_n = \sum_{i=1}^n X_i^2$ má χ^2 -rozdělení o n stupních volnosti (značíme χ_n^2), s hustotou

$$g_n(y) = \frac{y^{\frac{n}{2}-1}}{2^{\frac{n}{2}}\Gamma(\frac{n}{2})} e^{-\frac{y}{2}} 1_{y>0}, \quad y \in \mathbb{R}.$$

Poznámka

Střední hodnota je n , rozptyl $2n$.

Definice 9.3 (Studentovo rozdělení)

Buďte $X \sim N(0, 1)$ a $Y \sim \chi_n^2$ nezávislé náhodné veličiny. Pak náhodná veličina $T = \frac{X}{\sqrt{\frac{Y}{n}}}$ má studentovo t_n rozdělení (neboli t -rozdělení o n stupních volnosti) s hustotou

$$h_n(t) = \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\sqrt{\varphi n} \Gamma(\frac{n}{2})} \left(1 + \frac{t^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Poznámka

Střední hodnota je 0, pokud $n > 1$. Obecně t_n -rozdělení má konečné momenty až do řádu $(n-1)$ včetně.

Pro $n = 1$ se toto rozdělení nazývá Cauchyho rozdělení (protože se chová jinak než ostatní studentova).

10 Limitní věty

Definice 10.1 (Značení)

Buďte A_1, A_2, \dots náhodné jevy ze σ -algebry \mathcal{A} . Značíme

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k, \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k.$$

Věta 10.1 (Cantelli)

Budte A_1, A_2, \dots náhodné jevy z \mathcal{A} . Pokud $\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) < \infty$, pak $P(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n) = 0$.

┌

Důkaz

$$P(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n) = P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k\right) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=n}^{\infty} P(A_k) = 0.$$

└

□

Důsledek

$$P((\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n)^c) = 1 = P(\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n^c).$$

Věta 10.2 (Borelova, Borelův 0-1 zákon)

Budte A_1, \dots nezávislé náhodné jevy z \mathcal{A} . Pak

$$\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) < \infty \Leftrightarrow P(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n) = 0,$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) = \infty \Leftrightarrow P(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n) = 1.$$

┌

Důkaz

Neb nic jiného než $\sum = \infty$ nebo $\sum < \infty$ nastat nemůže, stačí ukázat dvakrát \Rightarrow . „První \Rightarrow “ je Cantelliho věta.

„Druhá \Rightarrow “: Platí $P(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n) = 1 - P((\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n)^c) = 1 - P(\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n^c)$. Počítejme

$$P(\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n^c) = P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k^c\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\bigcap_{k=n}^{\infty} A_k^c\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{N \rightarrow \infty} P\left(\bigcap_{k=n}^N A_k^c\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{N \rightarrow \infty} \prod_{k=n}^N P(A_k^c) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=n}^{\infty} P(A_k^c) = 0.$$

└

□

Definice 10.2 (Konvergence v pravděpodobnosti)

Budte Y_1, Y_2, \dots náhodné veličiny na (Ω, \mathcal{A}, P) . Posloupnost $\{Y_n\}_{n=1}^{\infty}$ konverguje v pravděpodobnosti k náhodné veličině Y , značíme $Y_n \xrightarrow{P} Y$, pokud $P(|Y_n - Y| > \varepsilon) \rightarrow 0, \forall \varepsilon > 0$.

┌ *Poznámka*

Je to konvergence podle míry. Je ekvivalentní

$$\forall \varepsilon > 0 : P(|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i - \mathbb{E}Y| \leq \varepsilon) \rightarrow 1?$$

└

Definice 10.3 (Konvergence skoro jistě)

Budte Y_1, \dots náhodné veličiny na (Ω, \mathcal{A}, P) . Posloupnost $\{Y_n\}_{n=1}^\infty$ konverguje skoro jistě k náhodné veličině Y , značíme $Y_n \xrightarrow{s.j.} Y$, pokud $P(\{\omega \in \Omega \mid \lim_{n \rightarrow \infty} Y_n(\omega) = Y(\omega)\}) = 1$.

┌ *Poznámka*

Je to konvergence skoro všude.

└

Věta 10.3 (O konvergenci v pravděpodobnosti a součtu)

Budte Y_1, \dots náhodné veličiny na (Ω, \mathcal{A}, P) náhodné veličiny a Z_1, \dots náhodné veličiny také na (Ω, \mathcal{A}, P) . Pak

$$(Y_n \xrightarrow{P} 0) \wedge (Z_n \xrightarrow{P} 0) \implies (Y_n + Z_n \xrightarrow{P} 0).$$

┌ *Důkaz*

$$P(|Y_n + Z_n| > \varepsilon) \leq P(|Y_n| > \frac{\varepsilon}{2}) + P(|Z_n| > \frac{\varepsilon}{2}) \rightarrow 0, \quad \forall \varepsilon > 0.$$

└

□

Věta 10.4 (O konvergenci v pravděpodobnosti a násobení)

Za stejných předpokladů jako výše s přidáním $\{a_n\}_{n=1}^\infty$ je reálná omezená posloupnost, je $Y_n \xrightarrow{P} 0 \implies a_n Y_n \xrightarrow{P} 0$.

┌ *Důkaz*

$$P(|a_n Y_n| > \varepsilon) \leq P(|Y_n| > \frac{\varepsilon}{c}) \rightarrow 0.$$

└

□

Věta 10.5 (O spojitě transformaci a konvergence)

Budte Y_1, Y_2, \dots n. v. na (Ω, \mathcal{A}, P) a $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funkce spojitá na otevřené množině S_Y takové, že $P(Y \in S_Y) = 1$. Pak

$$Y_n \xrightarrow{P} Y \implies g(Y_n) \xrightarrow{P} g(Y),$$

$$Y_n \xrightarrow{s.j.} Y \implies g(Y_n) \xrightarrow{s.j.} g(Y).$$

┌ *Důkaz*

První implikace viz literatura. Druhá: Buď $N \subset \Omega$ taková, že $Y_n(\omega) \rightarrow Y(\omega)$, $\forall \omega \in \Omega \setminus N$. Označíme $M = (\Omega \setminus N) \cap Y^{-1}(S_Y)$. Pak $P(M) = 1$. A $\forall \omega \in M$ platí, že g je spojitá na otevřeném okolí $Y(\omega)$, a tedy z $Y_n(\omega) \rightarrow Y(\omega)$ dostaneme $g(Y_n(\omega)) \rightarrow g(Y(\omega))$ z věty o limitě spojitě transformované posloupnosti v \mathbb{R} . \square

Věta 10.6 (Čebyševův slabý zákon velkých čísel)

Budte X_1, X_2, \dots vzájemně nezávislé náhodné veličiny definované na tomtéž (Ω, \mathcal{A}, P) splňující $\mathbb{E}X_n^2 < \infty$, $n \in \mathbb{N}$, a $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{var } X_i \right) = 0$. Potom platí

$$|\overline{X_n} - \mathbb{E}X_n| \xrightarrow{P} 0.$$

┌ *Důkaz*

Buď $\varepsilon > 0$ pevné.

$$P(|\overline{X_n} - \mathbb{E}X_n| > \varepsilon) \leq \frac{\text{var}(\overline{X_n} - \mathbb{E}X_n)}{\varepsilon^2} = \frac{\text{var } \overline{X_n}}{\varepsilon^2} = \frac{\text{var } \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i}{\varepsilon^2} = \frac{1}{n^2} \frac{\sum_{i=1}^n \text{var } X_i}{\varepsilon^2} = \frac{\frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{var } X_i}{\varepsilon^2} \rightarrow 0.$$

└ \square

TODO!!! (Chyběl jsem)

TODO!!! (Chyběl jsem)

Věta 10.7 (Silný zákon velkých čísel pro iid)

Buď $\{X_n\}_{n=1}^\infty$ posloupnost iid náhodných veličin. Pak

$$(\exists \mu \overline{X_n} \xrightarrow{\text{skoro jistě}} \mu) \Leftrightarrow \mathbb{E}|X_1| < \infty.$$

┌ *Důkaz*

„ \implies “: $X_n = n \cdot \overline{X_n} - (n-1) \cdot \overline{X_{n-1}}, \forall n \geq 2,$

$$\frac{X_n}{n} = \overline{X_n} - \frac{n-1}{n} \overline{X_{n-1}}.$$

Tedy $\frac{X_n}{n} \rightarrow 0$ skoro jistě. Takže $P(\frac{X_n}{n} \geq 1, \text{ pro nekonečně mnoho } n) = P(\limsup \frac{|X_n|}{n} \geq 1) = 0.$

Z Borelovy věty máme, že jevy $|X_n| \geq n$ jsou vzájemně nezávislé, neb $\{X_n\}_{n=1}^\infty$ jsou vzájemně nezávislé.

$$\sum_{n=1}^{\infty} P(|X_n| \geq n) < \infty, \quad \sum_{n=1}^{\infty} P(|X_1| \geq n) < \infty.$$

Nyní z předchozího lemmatu máme $\mathbb{E}|X_1| < \infty.$

└ Navíc z jednoznačnosti limity skoro jistě máme, že $\mu = \mathbb{E}X_1.$ □

Definice 10.4 (Konvergence v distribuci)

Buď Y_n posloupnost náhodných veličin na libovolných pravděpodobnostních prostorech. Řekneme, že náhodné veličiny Y_n konvergují v distribuci (značíme \xrightarrow{D}), pokud $\lim_{n \rightarrow \infty} F_{Y_n}(x) = F_Y(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$, které jsou body spojitosti F_Y .

┌ *Poznámka*

Konvergence v distribuci mluví o konvergenci měr P_{Y_n} , nikoliv Y_n .

Věta 10.8 (Centrální limitní věta (Ljapunov 1901, Lévy, Lindenberg 1922))

Buďte X_1, X_2, X_3, \dots nezávislé, stejně rozdělené náhodné veličiny s $\mathbb{E}X_1 = \mu \in \mathbb{R}$ a $0 < \text{var } X_1 = \sigma^2 < \infty$. Potom pro náhodné veličiny $Z_n = \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sqrt{n\sigma^2}}$ platí $Z_n \xrightarrow{D} Z$, kde $Z \sim N(0, 1)$.

Lemma 10.9 (Ekvivalentní charakterizace \xrightarrow{D})

Posloupnost náhodných veličin $\{Y_n\}_{n=1}^\infty$ splňuje $Y_n \xrightarrow{D} Y$ právě tehdy, když $\mathbb{E}h(Y_n) \rightarrow \mathbb{E}h(Y)$ pro každou spojitou omezenou funkci $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

┌ *Důkaz*

Důkaz je technický a byl vynechán. □

Důkaz (Centrální limitní věty)

BÚNO $\mathbb{E}X_i = 0$ a $\text{var } X_i = 1$, $\forall i \in \mathbb{N}$, (jinak bychom následující použili pro $\tilde{X}_i = \frac{X_i - \mu}{\sqrt{\sigma^2}}$). Z předchozího lemmatu nám stačí ukázat, že $\mathbb{E}h(Z_n) \rightarrow \mathbb{E}h(Z) \forall h$ 2krát spojitě diferencovatelné, stejnoměrně spojitě a s omezenými prvními a druhými derivacemi.

Budte $\{Y_i\}_{i=1}^\infty$ nezávislé náhodné veličiny $\sim N(0, 1)$ nezávislé s $\{X_i\}_{i=1}^\infty$. Pak $T_n = \frac{\sum_{i=1}^n Y_i - 0}{\sqrt{n \cdot 1}} \sim N(0, 1)$. Teď chceme ukázat $|\mathbb{E}h(Z_n) - \mathbb{E}h(T_n)| \rightarrow 0$ pro každé h jako výše.

Označíme si $X_{i,n} = \frac{X_i}{\sqrt{n}}$, $Y_{i,n} = \frac{Y_i}{\sqrt{n}}$, $W_{i,n} = \sum_{j=0}^i Y_{j,n} + \sum_{j=i+1}^n X_{j,n}$. Platí

$$h(Z_n) - h(T_n) = \sum_{i=1}^n (h(W_{i,n} + X_{i,n}) - h(W_{i,n} + Y_{i,n})), \quad \text{neboť } W_{i,n} + X_{i,n} = W_{i+1,n} + Y_{i,n}, \quad 1 \leq i \leq n.$$

Nyní použijeme Taylorův rozvoj na omezení jednotlivých rozdílů. Platí

$$h(W_{i,n} + X_{i,n}) = h(W_{i,n}) + h'(W_{i,n})X_{i,n} + \frac{1}{2}h''(W_{i,n})X_{i,n}^2 + R_{x,i,n},$$

$$R_{x,i,n} = \frac{1}{2X_{i,n}^2(h''(W_{i,n} + \zeta X_{i,n}) - h''(W_{i,n}))}, \quad 0 \leq \zeta \leq 1.$$

A také platí $|R_{x,i,n}| \leq X_{i,n}^2 \|h''\|_\infty$ a také platí $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : |R_{x,i,n}| \leq X_{i,n}^2 \varepsilon$, pro $|X_{i,n}| < \delta$ ze stejnoměrné spojitosti h'' . Dohromady $|R_{x,i,n}| \leq X_{i,n}^2 (\varepsilon \cdot 1_{(|X_{i,n}| < \delta)} + \|h''\|_\infty 1_{(|X_{i,n}| \geq \delta)})$. Obdobně vše pro $Y_{i,n}$.

Dosadíme Taylorův rozvoj a odhady do teleskopické sumy výše a spočítáme střední hodnotu:

$$\mathbb{E}(h(Z_n) - h(T_n)) = \sum_{i=1}^n \left[\mathbb{E}(h(W_{i,n}) - h(W_{i,n})) + \mathbb{E}h'(W_{i,n})(X_{i,n} - Y_{i,n}) + \mathbb{E}\frac{1}{2}h''(W_{i,n})(X_{i,n}^2 - Y_{i,n}^2) + \mathbb{E}R_{x,i,n} \right]$$

neboť první člen je zřejmě nula, druhý člen je střední hodnota součinu nezávislých veličin, tedy součin středních hodnot a X, Y mají stejnou střední hodnotu a střední hodnota $W_{i,n}$ existuje, tedy i druhý člen je 0. Třetí člen je úplně totéž, jen X, Y mají shodný rozptyl.

$$\begin{aligned} |\mathbb{E}(h(Z_n) - h(T_n))| &\leq \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(|R_{x,i,n}| + |R_{y,i,n}|) \leq \sum_{i=1}^n (\varepsilon \mathbb{E}(X_{i,n}^2 + Y_{i,n}^2) + \|h''\|_\infty \mathbb{E}(X_{i,n}^2 1_{(|X_{i,n}| \geq \delta)} + Y_{i,n}^2 1_{(|Y_{i,n}| \geq \delta)})) = \\ &= 2\varepsilon + \sum_{i=1}^n \|h''\|_\infty (\mathbb{E}\frac{X_i^2}{n} 1_{|X_i| > \delta \cdot \sqrt{n}} + \mathbb{E}\frac{Y_i^2}{n} 1_{(|Y_i| \geq \delta \cdot \sqrt{n})}) = \\ &= 2\varepsilon + \|h''\|_\infty (\mathbb{E}X_1^2 1_{(|X_1| \geq \delta \sqrt{n})} + \mathbb{E}Y_1^2 1_{(|Y_1| \geq \delta \sqrt{n})}), \end{aligned}$$

A neboť $\mathbb{E}X_1^2 1_{(|X_1| \geq \delta \sqrt{n})} = \mathbb{E}X_1^2 - \mathbb{E}X_1^2 1_{(|X_1| < \delta \sqrt{n})} \rightarrow \mathbb{E}X_1^2 - \mathbb{E}X_1^2 = 0$ z Lebesgueovy věty. Tak

$$|\mathbb{E}(h(z_n) - h(t_n))| \rightarrow 2\varepsilon.$$

Tedy $\forall \varepsilon > 0 \exists n : |\mathbb{E}h(Z_n) - \mathbb{E}h(T_n)| < 3\varepsilon$, tedy teleskopická suma jde k nule, tudíž $|\mathbb{E}h(Z_n) - \mathbb{E}h(T_n)| \rightarrow 0 \forall h$ splňující podmínky výše. \square

Věta 10.10 (De Moivre-Laplaceova centrální limitní věta)

Budte $Y_n \sim \text{Binom}(n, p)$ náhodné veličiny pro $n \in \mathbb{N}$ a $p \in (0, 1)$. Pak

$$\frac{Y_n - n \cdot p}{\sqrt{n \cdot p \cdot (1 - p)}} \xrightarrow{D} N(0, 1).$$

Důkaz (Dá se napočítat a umlácit Stirlingem, ale pro trénink)

Bud' $\{X_i\}_{i=1}^{\infty}$ posloupnost iid s $X_i \sim \text{Alt}(p)$. Pak $\sum_{i=1}^n X_i = Y_n \sim \text{Binom}(n, p)$. A také $\{X_i\}$ splňuje předpoklady CLV. A tedy

$$Z_n = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)}{\sqrt{n \cdot \sigma^2}} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - p)}{\sqrt{n \cdot p \cdot (1 - p)}} \xrightarrow{D} N(0, 1).$$

Tudíž také

$$\frac{-n \cdot p + \sum_{i=1}^n X_i}{\sqrt{n \cdot p \cdot (1 - p)}} \xrightarrow{D} N(0, 1).$$

Takže pro Y_n věta platí. Pro jiné $V_n \sim \text{Binom}(n, p)$ platí toto také, neboť konvergence v distribuci závisí pouze na rozdělení. \square

Lemma 10.11 (O spojitě transformaci a konvergenci v distribuci)

Bud' $\{X_i\}_{i=1}^{\infty}$ posloupnost nezávislých veličin taková, že $X_n \xrightarrow{D} X$, X náhodná veličina, a $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ bud' spojitá funkce. Necht' $Y_n = g(X_n)$, $n \in \mathbb{N}$, pak $Y_n \xrightarrow{D} Y$, kde $Y = g(X)$.

Důkaz

Použijeme charakterizaci konvergence v distribuci: ukážeme, že $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}h(Y_n) = \mathbb{E}h(y)$ pro každou h omezenou spojitou funkci z \mathbb{R} do \mathbb{R} . Ale $\mathbb{E}h(Y_n) = \mathbb{E}h(g(X_n))$ a $h \circ g$ je spojitá a omezená funkce z \mathbb{R} do \mathbb{R} .

Tedy protože $X_n \xrightarrow{D} X$, musí $\mathbb{E}hg(X_n) \rightarrow \mathbb{E}h(g(X))$. \square

Věta 10.12

Bud' $\{X_n\}_{n=1}^{\infty}$ posloupnost náhodných veličin definovaných na (Ω, \mathcal{A}, P) a X náhodná veličina na (Ω, \mathcal{A}, P) . Pak $(X_n - X) \xrightarrow{P} 0 \implies X_n \xrightarrow{D} X$.

Důkaz

Vynechán (viz TP1). \square

Pozor

Obráceně to neplatí.

Věta 10.13 (Cramér-Slucky)

Budte $\{X_n\}_{n=1}^\infty$, $\{Y_n\}_{n=1}^\infty$, X náhodné veličiny a necht $X_n \xrightarrow{D} X$ a $Y_n \xrightarrow{P} a \in \mathbb{R}$. Pak

$$X_n + Y_n \xrightarrow{D} (X + a) \wedge X_n \cdot Y_n \xrightarrow{D} X \cdot a.$$

┌ Důkaz

└ Vynechán. □

Část I

Statistika

Definice 10.5 (Empirická distribuční funkce)

Empirická distribuční funkce je definována jako $F_n(x, \omega) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n 1_{(X_k \leq x)}(\omega) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n 1_{(X_k(\omega) \leq x)}$.

Definice 10.6 (Náhodný výběr, rozsah výběru)

Budte X_1, \dots, X_n nezávislé, stejně rozdělené náhodné veličiny se stejným rozdělením P_X s distribuční funkcí F . Pak (X_1, \dots, X_n) nazveme náhodný výběr z rozdělení s distribuční funkcí F (resp. z rozdělení P_X). n je tzv. rozsah výběru.

Definice 10.7 (Model)

Modelem pro pozorování X_1, \dots, X_n rozumíme předem stanovenou množinu rozdělení \mathcal{F} , do níž neznámé rozdělení P_X , resp. jeho distribuční funkce F patří.

11 Bodový odhad

Definice 11.1 (Parametrická funkce)

(Máme náhodný výběr (X_1, \dots, X_n) z modelu $\mathcal{F} = \{F_\vartheta | \vartheta \in \Theta\} = \{P_\vartheta | \vartheta \in \Theta\}$, kde Θ je Borelovská $\subset \mathbb{R}^d$. Chceme odhadnout ϑ nebo $g(\vartheta)$.)

Borelovsky měřitelné zobrazení $g : \vartheta \rightarrow \mathbb{R}$ nazveme parametrickou funkcí.

Definice 11.2 (Bodový odhad parametrické funkce)

Bodový odhad φ_n parametrické funkce $g(\vartheta)$ je borelovsky měřitelné zobrazení $\varphi_n : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, jehož předpis nezávisí na ϑ (a tedy ani na P_ϑ či F_ϑ) a jehož definiční obor obsahuje obor hodnot (X_1, \dots, X_n)

Definice 11.3 (Nestranný bodový odhad)

Bodový odhad φ_n parametrické funkce $g(\vartheta)$ se nazývá nestranný, pokud $\forall \vartheta \in \Theta$ platí $\mathbb{E}_{\vartheta} \varphi_n(X_1, \dots, X_n) = g(\vartheta)$. (\mathbb{E}_{ϑ} značí, že \mathbb{E} počítáme vzhledem k rozdělení P_{ϑ}^n neboli $X_i \sim P_{\vartheta}$.)

Definice 11.4 (Silně konzistentní posloupnost bodových odhadů)

Posloupnost bodových odhadů φ_n parametrické funkce $g(\Theta)$ se nazývá silně konzistentní, pokud $\forall \vartheta \in \Theta$ platí $P(\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi(X_1, \dots, X_n) = g(\vartheta)) = 1$.

Definice 11.5 (Slabě konzistentní posloupnost bodových odhadů)

Posloupnost bodových odhadů φ_n parametrické funkce $g(\Theta)$ se nazývá slabě konzistentní, pokud $\forall \vartheta \in \Theta$ platí $\varphi(X_1, \dots, X_n) \xrightarrow{P} g(\vartheta)$.

Definice 11.6 (Statistika, výběrový průměr, výběrový rozptyl)

Statistikou nazveme libovolnou borelovsky měřitelnou funkci $T_n : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, jejíž definiční obor je obor hodnot náhodného výběru (X_1, \dots, X_n) .

Statistika $\overline{X}_n := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ se nazývá výběrový průměr. Statistika $S_n^2 := \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (X_k - \overline{X}_n)^2$ si nazývá výběrový rozptyl.

Věta 11.1 (O výběrovém průměru a výběrovém rozptylu)

Bud' X_1, \dots, X_n náhodný výběr z rozdělení se střední hodnotou $\mu = \mathbb{E}X \in \mathbb{R}$ a rozptylem $\sigma^2 = \text{var } X < +\infty$. Pak výběrový průměr \overline{X}_n je nestranný a konzistentní odhad μ a výběrový rozptyl S_n^2 je nestranný a konzistentní odhad σ^2 .

┌ *Důkaz*

Nestrannost μ :

$$\mathbb{E}\overline{X}_n = \mathbb{E}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n} \cdot n \cdot \mathbb{E}X_1 = \mu.$$

Konzistence μ plyne ze silného zákona velkých čísel.

Pro S_n^2 upravíme:

$$\begin{aligned} S_n^2 &= \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (X_k - \mu - (\overline{X}_n - \mu))^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 - 2 \frac{1}{n-1} \underbrace{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)(\overline{X}_n - \mu)}_{=(\overbrace{X_n} - \mu) \sum_{i=1}^n (X_i - \mu) \cdot \frac{n}{n} = (\overbrace{X_n} - \mu) \cdot ((\overbrace{X_n} - \mu))} \\ &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 - \frac{n}{n-1} (\overbrace{X_n} - \mu)^2. \end{aligned}$$

Nestrannost S_n^2 :

$$\mathbb{E}S_n^2 = \mathbb{E}\left(\frac{1}{n-1} (X_i - \mu)^2 - \frac{n}{n-1} (\overbrace{X_n} - \mu)^2\right) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n \text{var } X_k - \frac{n}{n-1} \text{var } \overline{X}_n = \frac{n}{n-1} \cdot \sigma^2 - \frac{n}{n-1} \cdot \sigma^2 = \sigma^2.$$

Konzistence S_n^2 :

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 - \frac{n}{n-1} (\overbrace{X_n} - \mu)^2 = \frac{n}{n-1} \cdot \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 - \frac{n}{n-1} (\overbrace{X_n} - \mu)^2 \rightarrow 1 \cdot \mathbb{E}(X_1 - \mu)^2 = \sigma^2.$$

skoro jistě ze silného zákona velkých čísel a silného zákona velkých čísel spojeného s větou o transformaci. □

Definice 11.7 (Výběrový moment)

Výběrový moment je definován jako $\widehat{m_r(\vartheta)} := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^r$.

Tvrzení 11.2 (Platí)

Výběrové momenty jsou nestranné a silně konzistentní odhady $m_r(\vartheta)$.

┌ *Důkaz*

Domácí úkol. □

Definice 11.8 (Metoda momentů)

Najdeme $\hat{\vartheta}$ jako řešení rovnic $m_r(\vartheta) = \widehat{m_r(\vartheta)}$.

12 Intervalový odhad

Definice 12.1 ((Oboustranný) intervalový odhad)

Buď $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ náhodný výběr o rozsahu n z P_ϑ a buď $\alpha \in (0, 1)$. (Oboustranným) intervalovým odhadem parametrické funkce $g(\vartheta)$ o spolehlivosti $(1 - \alpha)$ nazveme dvojici borelovských funkcí $\eta_L, \eta_U : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, jejichž předpis nezávisí na ϑ a $\forall \vartheta \in \Theta$ platí

$$P_\vartheta(\eta_L(\mathbf{X}) < g(\vartheta) < \eta_U(\mathbf{X})) \geq 1 - \alpha.$$

Definice 12.2 (Horní a dolní oboustranný odhad)

Buď \mathbf{X} náhodný výběr z P_ϑ o rozsahu n a buď $\alpha \in (0, 1)$. Dolním intervalovým odhadem parametrické funkce $g(\vartheta)$ o spolehlivosti $(1 - \alpha)$ nazveme borelovskou funkci $\eta_D : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, jejíž předpis nezávisí na ϑ a $\forall \vartheta \in \Theta$ platí

$$P_\vartheta(\eta_D(\mathbf{X}) < g(\vartheta)) \geq 1 - \alpha.$$

Horním intervalovým odhadem $g(\vartheta)$ o spolehlivosti $(1 - \alpha)$ nazveme borelovskou funkci $\eta_H : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ jejíž předpis nezávisí na ϑ a $\forall \vartheta \in \Theta$ platí

$$P_\vartheta(g(\vartheta) < \eta_H(\mathbf{X})) \geq 1 - \alpha.$$

Definice 12.3 (β -kvantil)

Buď F distribuční funkce spojitá a ryze rostoucí na $F^{-1}(0, 1)$ a $\beta \in (0, 1)$. β -kvantil rozdělení s distribuční funkcí F nazveme $q_\beta = F^{-1}(\beta)$.

12.1 Intervalové odhady v normálním modelu

Věta 12.1

Buď $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)^T$ náhodný výběr z $N(\mu, \sigma^2)$, kde $\vartheta = \mu \in \mathbb{R}$ je neznámý parametr a $\sigma^2 > 0$ je známá konstanta. A buď $\alpha \in (0, 1)$. Pak

$$(\overline{X}_n - u_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \overline{X}_n + u_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$$

je intervalový odhad μ o spolehlivosti $(1 - \alpha)$.

┌
Důkaz

Postupujeme podle obecného postupu odvození intervalového odhadu:

Volíme $H(\mathbf{X}, \mu) = \sqrt{n} \frac{\overline{X_n} - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$. Pak

$$P_\mu(u_{\frac{\alpha}{2}} < H(\mathbf{X}, \mu) < u_{1-\frac{\alpha}{2}}) = \Phi(u_{1-\frac{\alpha}{2}}) - \Phi(u_{\frac{\alpha}{2}}) = 1 - \frac{\alpha}{2} - \frac{\alpha}{2} = 1 - \alpha, \quad \forall \mu \in \mathbb{R} \quad \forall \alpha \in (0, 1).$$

Ekvivalentní úpravou (za pomoci $u_{\frac{\alpha}{2}} = u_{1-\frac{\alpha}{2}}$) upravíme na:

$$P_\mu(\overline{X_n} - u_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \overline{X_n} + u_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}).$$

└

□

Věta 12.2 (O vlastnostech $\overline{X_n}$ a S_n^2 v normálním modelu)

Bud $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)^T$ náhodný výběr z $N(\mu, \sigma^2)$, $\mu \in \mathbb{R}$, $\sigma^2 > 0$. (Oba neznáme.) Pak

1. $\overline{X_n}$ a $S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \overline{X_n})^2$ jsou nezávislé;
2. náhodná veličina $\frac{n-1}{\sigma^2} S_n^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \overline{X_n})^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2$;
3. náhodná veličina $T_n = \frac{\overline{X_n} - \mu}{S_n/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$ (Studentovo t -rozdělení o $(n-1)$ stupních volnosti, $S_n := \sqrt{S_n^2}$).

┌
Důkaz

Zatím vynecháme. (Pravděpodobně úplně vynecháme.)

□

Věta 12.3

Bud $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)^T$ náhodný výběr z rozdělení $N(\mu, \sigma^2)$, kde $\mu \in \mathbb{R}$, $\sigma^2 \in \mathbb{R}^+$ jsou neznámé parametry. Bud $\alpha \in (0, 1)$. Pak

- $(\overline{X_n} - t_{n-1}(1 - \frac{\alpha}{2}) \frac{S_n}{\sqrt{n}}, \overline{X_n} + t_{n-1}(1 - \frac{\alpha}{2}) \frac{S_n}{\sqrt{n}})$ je intervalový odhad parametru μ o spolehlivosti $(1 - \alpha)$;
- $(\frac{(n-1)S_n^2}{\chi_{n-1}^2(1-\frac{\alpha}{2})}, \frac{(n-1)S_n^2}{\chi_{n-1}^2(\frac{\alpha}{2})})$ je intervalový odhad parametru σ^2 o spolehlivosti $(1 - \alpha)$.

┌
Poznámka

$\chi_{n-1}^2(\beta)$ je β -kvantil χ^2 -rozdělení o $(n-1)$ stupních volnosti a $t_{n-1}(\beta)$ je β -kvantil Studentova t_{n-1} rozdělení.

└

┌
Důkaz

Podle obecného postupu odvození intervalového odhadu. Volíme $H(\mathbf{X}, \mu, \sigma^2) = \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sqrt{S_n^2}} \sqrt{n} \sim t_{n-1}$ (z třetího bodu předchozí věty).

$$P_{\mu, \sigma^2}(t_{n-1}(\frac{\alpha}{2}) < \frac{\bar{X}_n - \mu}{S_n} \sqrt{n} < t_{n-1}(1 - \frac{\alpha}{2})) = 1 - \alpha, \quad \forall \alpha \in (0, 1) \quad \forall \mu \in \mathbb{R} \quad \forall \sigma^2 > 0.$$

Upravíme nerovnosti:

$$P\left(\bar{X}_n - t_{n-1}(1 - \frac{\alpha}{2}) \frac{S_n}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X}_n + t_{n-1}(1 - \frac{\alpha}{2}) \frac{S_n}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha.$$

Obecným postupem odvození intervalového odhadu dostaneme ze statistiky $H(\mathbf{X}, \mu, \sigma^2) = \frac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2}$ druhý intervalový odhad:

$$P_{\mu, \sigma^2}(\dots) = F_{\chi_{n-1}^2}(\chi_{n-1}^2(1 - \frac{\alpha}{2})) - F_{\chi_{n-1}^2}(\chi_{n-1}^2(\frac{\alpha}{2})) = 1 - \frac{\alpha}{2} - \frac{\alpha}{2} = 1 - \alpha.$$

└

□

12.2 Intervalové odhady založené na CLV

Definice 12.4 (Intervalový odhad s asymptotickou spolehlivostí)

Budte $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)^T$ náhodná veličina z P_ϑ , $\vartheta \in \Theta$. Pokud $\eta_L(\mathbf{X})$ a $\eta_U(\mathbf{X})$ splňuje

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_\vartheta(\eta_L(\mathbf{X}) < g(\vartheta) < \eta_U(\mathbf{X})) = 1 - \alpha,$$

pak mluvíme o intervalovém odhadu s asymptotickou spolehlivostí $1 - \alpha$.

Věta 12.4

Bud' $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ náhodný výběr z rozdělení, jež je prvkem modelu $\mathcal{F} = \{P_\vartheta, \vartheta \in \Theta\}$, ve kterém platí $\text{var}_\vartheta X_1 \in \mathbb{R}^+$. Bud' $\alpha \in (0, 1)$. Potom intervalovým odhadem střední hodnoty $\mu = E_\vartheta X$ o asymptotické spolehlivosti $(1 - \alpha)$ je interval $(\bar{X}_n - u_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{S_n}{\sqrt{n}}, \bar{X}_n + u_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{S_n}{\sqrt{n}})$.

┌
Důkaz

Za domácí úkol (použije se standardní postup odvození intervalového odhadu se statistikou

$$H(\mathbf{X}, \vartheta) = \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sqrt{S_n^2}} \sqrt{n}).$$

└

□

13 Testování hypotéz

Poznámka

1. Formulujeme statistický model: $(X_1, \dots, X_n) \sim P_{\vartheta} \in \mathcal{F} = \{P_{\vartheta} | \vartheta \in \Theta\}$.

2. Formulujeme nulovou a alternativní hypotézu, tedy $\Theta = \Theta_0 \cup \Theta_1$ disjunktní, taková, že $\vartheta \in \Theta_0$ znamená, že ϑ je uspokojivé, a $\vartheta \in \Theta_1$ znamená, že ϑ je problematická (klasicky ta hypotéza, kterou testujeme). Mluvíme o tom, že testujeme nulovou hypotézu $H_0 : \vartheta \in \Theta_0$ proti alternativní hypotéze $H_1 : \vartheta \in \Theta_1$.

3. Volíme hladinu testu $\alpha =$ maximální pravděpodobnost chyby prvního druhu (H_0 zamítnuta i když platí). Většinou $\alpha = 0.01$.

4. Volba rozhodovacího pravidla / kritického oboru $W \subset \mathbb{R}^n$, tj. $\mathbf{X} \in W \implies$ zamítám H_0 , $\mathbf{X} \notin W \implies$ nezamítám H_1 .

5. Až teď! Provedeme experiment.