

*Příklad (1.)*

Let  $\mathbb{A}$  be a sufficiently smooth tensor/matrix field, and let  $\mathbb{A}$  be (at every point  $\mathbf{x}$ ) a *symmetric matrix*. Show that

$$\text{rot} \left( (\text{rot } \mathbb{A})^T \right) = [\Delta \text{tr } \mathbb{A} - \text{div}(\text{div } \mathbb{A})] \mathbb{I} + \nabla(\text{div } \mathbb{A}) + [\nabla(\text{div } \mathbb{A})]^T - \nabla(\nabla \text{tr } \mathbb{A}) - \Delta \mathbb{A}.$$

┌

*Důkaz*

Z definice:

$$\text{rot} \left( (\text{rot } \mathbb{A})^T \right) = \text{rot} \left( \varepsilon_{jkl} \frac{\partial A_{il}}{\partial x_k} \cdot \mathbf{e}_j \otimes \mathbf{e}_i \right) = \varepsilon_{nop} \varepsilon_{mkl} \frac{\partial^2 A_{pl}}{\partial x_k \partial x_o} \mathbf{e}_m \otimes \mathbf{e}_n$$

Z rovnosti

$$\varepsilon_{nop} \varepsilon_{mkl} = \det \begin{pmatrix} \delta_{nm} & \delta_{nk} & \delta_{nl} \\ \delta_{om} & \delta_{ok} & \delta_{ol} \\ \delta_{pm} & \delta_{pk} & \delta_{pl} \end{pmatrix}$$

dostáváme na pravé straně 6 členů:

- $\frac{\partial^2 A_{pp}}{\partial x_k \partial x_o} \mathbf{e}_m \otimes \mathbf{e}_n = (\Delta \text{tr } \mathbb{A}) \mathbb{I}$ , neboť

$$A_{pp} = \text{tr } \mathbb{A}, \quad \frac{\partial^2}{\partial x_o^2} = \nabla \cdot \nabla = \Delta, \quad \mathbf{e}_n \otimes \mathbf{e}_n = \mathbb{I};$$

- $-\frac{\partial^2 A_{po}}{\partial x_p \partial x_o} \mathbf{e}_n \otimes \mathbf{e}_n = -\text{div}(\text{div } \mathbb{A});$

- $\frac{\partial^2 A_{po}}{\partial x_n \partial x_o} \mathbf{e}_p \otimes \mathbf{e}_n = \frac{\partial(\nabla \cdot \mathbb{A}^T)_p}{\partial x_n} \mathbf{e}_p \otimes \mathbf{e}_n = \frac{\partial(\nabla \cdot \mathbb{A})_p}{\partial x_n} \mathbf{e}_p \otimes \mathbf{e}_n = \frac{\partial(\text{div } \mathbb{A})_p}{\partial x_n} \mathbf{e}_p \otimes \mathbf{e}_n = \nabla(\text{div } \mathbb{A});$

- $\frac{\partial^2 A_{pn}}{\partial x_p \partial x_o} \mathbf{e}_o \otimes \mathbf{e}_n = \frac{\partial(\nabla \cdot \mathbb{A})_n}{\partial x_o} \mathbf{e}_o \otimes \mathbf{e}_n = \frac{\partial(\text{div } \mathbb{A})_n}{\partial x_o} \mathbf{e}_o \otimes \mathbf{e}_n = [\nabla(\text{div } \mathbb{A})]^T;$

- $-\frac{\partial^2 A_{pp}}{\partial x_n \partial x_o} \mathbf{e}_n \otimes \mathbf{e}_o = -\frac{\partial^2 \text{tr } \mathbb{A}}{\partial x_n \partial x_o} \mathbf{e}_n \otimes \mathbf{e}_o = -\nabla(\nabla \text{tr } \mathbb{A});$

- $-\frac{\partial^2}{\partial x_o^2} A_{pm} \mathbf{e}_p \otimes \mathbf{e}_n = -\frac{\partial^2}{\partial x_o^2} \mathbb{A} = -\Delta \mathbb{A}.$

└

Tím jsme dokázali rovnost.

□

*Příklad (2.)*

Prove the following. Let  $u, v$  be smooth scalar valued functions,  $v : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $u : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ , and let  $\mathbb{A}$  be a smooth tensor valued function  $\mathbb{A} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^{3 \times 3}$ . Let  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^3$  be a bounded domain with smooth boundary, then

$$\int_{\Omega} u(\nabla v) dv = \int_{\partial\Omega} uv ds - \int_{\Omega} (\nabla u) v dv$$

┌

*Důkaz*

Stokesova věta říká:

$$\int_{\partial\Omega} (uv\mathbf{w}) \cdot d\mathbf{s} = \int_{\Omega} \nabla \cdot (uv\mathbf{w}) dv \quad \left( = \int_{\Omega} \operatorname{div}(uv\mathbf{w}) dv \right)$$

Z předchozího domácího úkolu víme, že  $\operatorname{div}(a\mathbf{x}) = \mathbf{x} \cdot \nabla a + a \operatorname{div} \mathbf{x}$ . To použijeme dvakrát:

$$= \int_{\Omega} (v\mathbf{w} \cdot \nabla u + u \operatorname{div} v\mathbf{w}) dv = \int_{\Omega} (v\mathbf{w} \cdot \nabla u + u\mathbf{w} \cdot \nabla v + uv \operatorname{div} \mathbf{w}) dv =$$

Zvolili jsme si konstantní vektor, tedy jeho derivace jsou nulové:

$$\int_{\Omega} (v\mathbf{w} \cdot \nabla u + u\mathbf{w} \cdot \nabla v) dv.$$

Jelikož toto platí pro libovolný vektor  $\mathbf{w}$ , tak platí

$$\begin{aligned} \int_{\partial\Omega} uv ds &= \int_{\Omega} (v(\nabla u) + u(\nabla v)) dv = \int_{\Omega} v(\nabla u) dv + \int_{\Omega} u(\nabla v) dv, \\ \int_{\Omega} u(\nabla v) dv &= \int_{\partial\Omega} uv ds - \int_{\Omega} v(\nabla u) dv. \end{aligned}$$

└

□

$$\int_{\Omega} (\operatorname{div} \mathbb{A}) \cdot \mathbf{v} \, dv = \int_{\partial\Omega} (\mathbb{A}^T \mathbf{v}) \cdot d\mathbf{s} - \int_{\Omega} \mathbb{A} : \nabla \mathbf{v} \, dv.$$

┌

*Důkaz*

Zase podle Stokesa platí:

$$\int_{\partial\Omega} (\mathbb{A}^T \mathbf{v}) \cdot d\mathbf{s} = \int_{\Omega} \operatorname{div}(\mathbb{A}^T \mathbf{v}) \, dv.$$

Takže nám stačí dokázat  $\operatorname{div}(\mathbb{A}^T \mathbf{v}) = \operatorname{div}(\mathbb{A}) \cdot \mathbf{v} + \mathbb{A} : \nabla \mathbf{v}$ . Potom už dostaneme chtěnou rovnost pouze z linearity integrálu a „přehozením“ jednoho integrálu „na druhou stranu“.

$$\operatorname{div}(\mathbb{A}^T \mathbf{v}) = \frac{\partial A_{ji} v_j}{\partial x_i} = \frac{\partial A_{ji}}{\partial x_i} v_j + A_{ji} \frac{\partial v_j}{\partial x_i} = (\operatorname{div} \mathbb{A})_j v_j + A_{ji} (\nabla \mathbf{v})_{ji} = (\operatorname{div} \mathbb{A}) \cdot \mathbf{v} + \mathbb{A} : \nabla \mathbf{v}.$$

└

□