


# VORKURS EINFÜHRUNG IN DIE HOCHSCHULMATHEMATIK:

VEKTORRÄUME

JONATHAN BUSSE

UNIVERSITÄT DUISBURG ESSEN  
[GITHUB.COM/JOKABUS/VEH2020](https://github.com/JOKABUS/VEH2020)

SITZUNG VOM 21. OKTOBER 2020



# ORGANISATORISCHES

# **ORGANISATORISCHES**

## **ZEITPLANUNG**

**10:00** Begrüßung

**10:05** Break-Out-Session

*Übung 7.2-2*

**10:50** Kaffeepause

**11:00** Vorrechnen

**11:20** Zusammenfassung und Schluss

# BEGRÜSSUNG

Liebe Studierende,

Liebe Studierende,

leider habe ich die gestrige Präsentation zwar hochgeladen, aber nicht auf der github-site verlinkt :(

Liebe Studierende,

leider habe ich die gestrige Präsentation zwar hochgeladen, aber nicht auf der github-site verlinkt :(

Heute gibt es einen zweiten Versuch.

Liebe Studierende,

leider habe ich die gestrige Präsentation zwar hochgeladen, aber nicht auf der github-site verlinkt :(

Heute gibt es einen zweiten Versuch. Die Aufgabe 7.2-2 schließt an die 7.2-1 an, an der Sie sich gestern versucht haben.



# BEGRÜSSUNG

Liebe Studierende,

leider habe ich die gestrige Präsentation zwar hochgeladen, aber nicht auf der github-site verlinkt :(

Heute gibt es einen zweiten Versuch. Die Aufgabe 7.2-2 schließt an die 7.2-1 an, an der Sie sich gestern versucht haben.

Ab etwa 10:20 bin ich im Raum ansprechbar.

Liebe Studierende,

leider habe ich die gestrige Präsentation zwar hochgeladen, aber nicht auf der github-site verlinkt :(

Heute gibt es einen zweiten Versuch. Die Aufgabe 7.2-2 schließt an die 7.2-1 an, an der Sie sich gestern versucht haben.

Ab etwa 10:20 bin ich im Raum ansprechbar.

Auf den kommenden Slides habe ich einige Tipps zur Lösung der Aufgabe vorbereitet!

Liebe Studierende,

leider habe ich die gestrige Präsentation zwar hochgeladen, aber nicht auf der github-site verlinkt :(

Heute gibt es einen zweiten Versuch. Die Aufgabe 7.2-2 schließt an die 7.2-1 an, an der Sie sich gestern versucht haben.

Ab etwa 10:20 bin ich im Raum ansprechbar.

Auf den kommenden Slides habe ich einige Tipps zur Lösung der Aufgabe vorbereitet! Viel Erfolg :)

# ÜBUNGSAUFGABE

# ÜBUNGSAUFGABE

## VORGEHEN

# ÜBUNG 7.2 AUFGABE 2

## Aufgabe 2:

Zeige für die Menge

$$\mathbb{R}[X]_2 := \left\{ ax^2 + bx + c \mid a, b, c \in \mathbb{R} \right\}$$

d.h. die Menge aller Polynome vom Grad  $\leq 2$ :

- (a)  $\mathbb{R}[X]_2$  ist ein reeller Vektorraum.
- (b) Die Menge der Vektoren  $\{1 + x + x^2, 1 + x, 1 + x^2\}$  ist eine Basis von  $\mathbb{R}[X]_2$ .
- (c) Welche Dimension hat  $\mathbb{R}[X]_2$ ?

## a) Vektorraumaxiome prüfen

# ÜBUNG 7.2 AUFGABE 2

## Aufgabe 2:

Zeige für die Menge

$$\mathbb{R}[X]_2 := \left\{ ax^2 + bx + c \mid a, b, c \in \mathbb{R} \right\}$$

d.h. die Menge aller Polynome vom Grad  $\leq 2$ :

- (a)  $\mathbb{R}[X]_2$  ist ein reeller Vektorraum.
- (b) Die Menge der Vektoren  $\{1 + x + x^2, 1 + x, 1 + x^2\}$  ist eine Basis von  $\mathbb{R}[X]_2$ .
- (c) Welche Dimension hat  $\mathbb{R}[X]_2$ ?

## a) Vektorraumaxiome prüfen

### Definition [\[ Bearbeiten \]](#) [\[ Quelltext bearbeiten \]](#)

Es seien  $V$  eine Menge,  $(K, +, \cdot)$  ein Körper,  $\oplus: V \times V \rightarrow V$  eine **innere zweistellige Verknüpfung**, genannt Vektoraddition, und  $\odot: K \times V \rightarrow V$  eine **äußere zweistellige Verknüpfung**, genannt **Skalarmultiplikation**. Man nennt dann  $(V, \oplus, \odot)$  einen **Vektorraum über dem Körper  $K$**  oder kurz  **$K$ -Vektorraum**, wenn für alle  $u, v, w \in V$  und  $\alpha, \beta \in K$  die folgenden Eigenschaften gelten:

Vektoraddition:

- V1:  $u \oplus (v \oplus w) = (u \oplus v) \oplus w$  (**Assoziativgesetz**)
- V2: Existenz eines **neutralen Elements**  $0_V \in V$  mit  $v \oplus 0_V = 0_V \oplus v = v$
- V3: Existenz eines zu  $v \in V$  **inversen Elements**  $-v \in V$  mit  $v \oplus (-v) = (-v) \oplus v = 0_V$
- V4:  $v \oplus u = u \oplus v$  (**Kommutativgesetz**)

Skalarmultiplikation:

- S1:  $\alpha \odot (u \oplus v) = (\alpha \odot u) \oplus (\alpha \odot v)$  (**Distributivgesetz**)
- S2:  $(\alpha + \beta) \odot v = (\alpha \odot v) \oplus (\beta \odot v)$
- S3:  $(\alpha \cdot \beta) \odot v = \alpha \odot (\beta \odot v)$
- S4: Neutralität des **Einselements**  $1 \in K$ , also  $1 \odot v = v$

# ÜBUNG 7.2 AUFGABE 2

## Aufgabe 2:

Zeige für die Menge

$$\mathbb{R}[X]_2 := \left\{ ax^2 + bx + c \mid a, b, c \in \mathbb{R} \right\}$$

d.h. die Menge aller Polynome vom Grad  $\leq 2$ :

- (a)  $\mathbb{R}[X]_2$  ist ein reeller Vektorraum.
- (b) Die Menge der Vektoren  $\{1 + x + x^2, 1 + x, 1 + x^2\}$  ist eine Basis von  $\mathbb{R}[X]_2$ .
- (c) Welche Dimension hat  $\mathbb{R}[X]_2$ ?

## a) Vektorraumaxiome prüfen

**Definition** [[Bearbeiten](#) | [Quelltext bearbeiten](#)]

Es seien  $V$  eine Menge,  $(K, +, \cdot)$  ein Körper,  $\oplus: V \times V \rightarrow V$  eine **innere zweistellige Verknüpfung**, genannt Vektoraddition, und  $\odot: K \times V \rightarrow V$  eine **äußere zweistellige Verknüpfung**, genannt **Skalarmultiplikation**. Man nennt dann  $(V, \oplus, \odot)$  einen **Vektorraum über dem Körper  $K$**  oder kurz  **$K$ -Vektorraum**, wenn für alle  $u, v, w \in V$  und  $\alpha, \beta \in K$  die folgenden Eigenschaften gelten:

Vektoraddition:

- V1:  $u \oplus (v \oplus w) = (u \oplus v) \oplus w$  (**Assoziativgesetz**)
- V2: Existenz eines **neutralen Elements**  $0_V \in V$  mit  $v \oplus 0_V = 0_V \oplus v = v$
- V3: Existenz eines zu  $v \in V$  **inversen Elements**  $-v \in V$  mit  $v \oplus (-v) = (-v) \oplus v = 0_V$
- V4:  $v \oplus u = u \oplus v$  (**Kommutativgesetz**)

Skalarmultiplikation:

- S1:  $\alpha \odot (u \oplus v) = (\alpha \odot u) \oplus (\alpha \odot v)$  (**Distributivgesetz**)
- S2:  $(\alpha + \beta) \odot v = (\alpha \odot v) \oplus (\beta \odot v)$
- S3:  $(\alpha \cdot \beta) \odot v = \alpha \odot (\beta \odot v)$
- S4: Neutralität des **Einselements**  $1 \in K$ , also  $1 \odot v = v$

(mir ist nicht klar, was Sie als gegeben voraussetzen dürfen, beißen Sie sich nicht an diesem Aufgabenteil fest)



# ÜBUNG 7.2 AUFGABE 2

## Aufgabe 2:

Zeige für die Menge

$$\mathbb{R}[X]_2 := \left\{ ax^2 + bx + c \mid a, b, c \in \mathbb{R} \right\}$$

d.h. die Menge aller Polynome vom Grad  $\leq 2$ :

- (a)  $\mathbb{R}[X]_2$  ist ein reeller Vektorraum.
- (b) Die Menge der Vektoren  $\{1 + x + x^2, 1 + x, 1 + x^2\}$  ist eine Basis von  $\mathbb{R}[X]_2$ .
- (c) Welche Dimension hat  $\mathbb{R}[X]_2$ ?

a) Vektorraumaxiome prüfen

b) Basis auf lineare Unabhängigkeit überprüfen

# ÜBUNG 7.2 AUFGABE 2

## Aufgabe 2:

Zeige für die Menge

$$\mathbb{R}[X]_2 := \{ ax^2 + bx + c \mid a, b, c \in \mathbb{R} \}$$

d.h. die Menge aller Polynome vom Grad  $\leq 2$ :

- (a)  $\mathbb{R}[X]_2$  ist ein reeller Vektorraum.
- (b) Die Menge der Vektoren  $\{ 1 + x + x^2, 1 + x, 1 + x^2 \}$  ist eine Basis von  $\mathbb{R}[X]_2$ .
- (c) Welche Dimension hat  $\mathbb{R}[X]_2$ ?

a) Vektorraumaxiome prüfen

b) Basis auf lineare Unabhängigkeit überprüfen

## Basis

Übersetzen sie hierzu die Basismenge in eine Matrix und bestimmen Sie deren Rang nach folgendem Prinzip:

# ÜBUNG 7.2 AUFGABE 2

## Aufgabe 2:

Zeige für die Menge

$$\mathbb{R}[X]_2 := \{ ax^2 + bx + c \mid a, b, c \in \mathbb{R} \}$$

d.h. die Menge aller Polynome vom Grad  $\leq 2$ :

- (a)  $\mathbb{R}[X]_2$  ist ein reeller Vektorraum.
- (b) Die Menge der Vektoren  $\{ 1 + x + x^2, 1 + x, 1 + x^2 \}$  ist eine Basis von  $\mathbb{R}[X]_2$ .
- (c) Welche Dimension hat  $\mathbb{R}[X]_2$ ?

a) Vektorraumaxiome prüfen

b) Basis auf lineare Unabhängigkeit überprüfen

## Basis

Übersetzen sie hierzu die Basismenge in eine Matrix und bestimmen Sie deren Rang nach folgendem Prinzip:

$$B = \{7z^2, 3z + 1, 2\}$$

# ÜBUNG 7.2 AUFGABE 2

## Aufgabe 2:

Zeige für die Menge

$$\mathbb{R}[X]_2 := \{ ax^2 + bx + c \mid a, b, c \in \mathbb{R} \}$$

d.h. die Menge aller Polynome vom Grad  $\leq 2$ :

- (a)  $\mathbb{R}[X]_2$  ist ein reeller Vektorraum.
- (b) Die Menge der Vektoren  $\{ 1 + x + x^2, 1 + x, 1 + x^2 \}$  ist eine Basis von  $\mathbb{R}[X]_2$ .
- (c) Welche Dimension hat  $\mathbb{R}[X]_2$ ?

a) Vektorraumaxiome prüfen

b) Basis auf lineare Unabhängigkeit überprüfen

## Basis

Übersetzen sie hierzu die Basismenge in eine Matrix und bestimmen Sie deren Rang nach folgendem Prinzip:

$$B = \{ 7z^2, 3z + 1, 2 \} \sim \begin{bmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

# ÜBUNG 7.2 AUFGABE 2

## Aufgabe 2:

Zeige für die Menge

$$\mathbb{R}[X]_2 := \{ ax^2 + bx + c \mid a, b, c \in \mathbb{R} \}$$

d.h. die Menge aller Polynome vom Grad  $\leq 2$ :

- (a)  $\mathbb{R}[X]_2$  ist ein reeller Vektorraum.
- (b) Die Menge der Vektoren  $\{ 1 + x + x^2, 1 + x, 1 + x^2 \}$  ist eine Basis von  $\mathbb{R}[X]_2$ .
- (c) Welche Dimension hat  $\mathbb{R}[X]_2$ ?

a) Vektorraumaxiome prüfen

b) Basis auf lineare Unabhängigkeit überprüfen

## Basis

Übersetzen sie hierzu die Basismenge in eine Matrix und bestimmen Sie deren Rang nach folgendem Prinzip:

$$B = \{7z^2, 3z + 1, 2\} \sim \begin{bmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

# ÜBUNG 7.2 AUFGABE 2

## Aufgabe 2:

Zeige für die Menge

$$\mathbb{R}[X]_2 := \{ ax^2 + bx + c \mid a, b, c \in \mathbb{R} \}$$

d.h. die Menge aller Polynome vom Grad  $\leq 2$ :

- (a)  $\mathbb{R}[X]_2$  ist ein reeller Vektorraum.
- (b) Die Menge der Vektoren  $\{ 1 + x + x^2, 1 + x, 1 + x^2 \}$  ist eine Basis von  $\mathbb{R}[X]_2$ .
- (c) Welche Dimension hat  $\mathbb{R}[X]_2$ ?

a) Vektorraumaxiome prüfen

b) Basis auf lineare Unabhängigkeit überprüfen

## Basis

Übersetzen sie hierzu die Basismenge in eine Matrix und bestimmen Sie deren Rang nach folgendem Prinzip:

$$B = \{ 7z^2, 3z + 1, 2 \} \sim \begin{bmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{Rang}(3)$$

# ÜBUNG 7.2 AUFGABE 2

## Aufgabe 2:

Zeige für die Menge

$$\mathbb{R}[X]_2 := \left\{ ax^2 + bx + c \mid a, b, c \in \mathbb{R} \right\}$$

d.h. die Menge aller Polynome vom Grad  $\leq 2$ :

- (a)  $\mathbb{R}[X]_2$  ist ein reeller Vektorraum.
- (b) Die Menge der Vektoren  $\{1 + x + x^2, 1 + x, 1 + x^2\}$  ist eine Basis von  $\mathbb{R}[X]_2$ .
- (c) Welche Dimension hat  $\mathbb{R}[X]_2$ ?

a) Vektorraumaxiome prüfen

b) Basis auf lineare Unabhängigkeit überprüfen

c) Die Dimension eines Vektorraums entspricht der Anzahl der Elemente einer Basis.

# ÜBUNGSaufgABE

**VORRECHNEN**



# ÜBUNG 7.2 AUFGABE 2

## Aufgabe 2:

Zeige für die Menge

$$\mathbb{R}[X]_2 := \left\{ ax^2 + bx + c \mid a, b, c \in \mathbb{R} \right\}$$

d.h. die Menge aller Polynome vom Grad  $\leq 2$ :

- (a)  $\mathbb{R}[X]_2$  ist ein reeller Vektorraum.
- (b) Die Menge der Vektoren  $\{1 + x + x^2, 1 + x, 1 + x^2\}$  ist eine Basis von  $\mathbb{R}[X]_2$ .
- (c) Welche Dimension hat  $\mathbb{R}[X]_2$ ?

a)

# ÜBUNG 7.2 AUFGABE 2

## Aufgabe 2:

Zeige für die Menge

$$\mathbb{R}[X]_2 := \left\{ ax^2 + bx + c \mid a, b, c \in \mathbb{R} \right\}$$

d.h. die Menge aller Polynome vom Grad  $\leq 2$ :

- (a)  $\mathbb{R}[X]_2$  ist ein reeller Vektorraum.
- (b) Die Menge der Vektoren  $\{1 + x + x^2, 1 + x, 1 + x^2\}$  ist eine Basis von  $\mathbb{R}[X]_2$ .
- (c) Welche Dimension hat  $\mathbb{R}[X]_2$ ?

# ÜBUNG 7.2 AUFGABE 2

## Aufgabe 2:

Zeige für die Menge

$$\mathbb{R}[X]_2 := \left\{ ax^2 + bx + c \mid a, b, c \in \mathbb{R} \right\}$$

d.h. die Menge aller Polynome vom Grad  $\leq 2$ :

- (a)  $\mathbb{R}[X]_2$  ist ein reeller Vektorraum.
- (b) Die Menge der Vektoren  $\{1 + x + x^2, 1 + x, 1 + x^2\}$  ist eine Basis von  $\mathbb{R}[X]_2$ .
- (c) Welche Dimension hat  $\mathbb{R}[X]_2$ ?

b)

# ÜBUNG 7.2 AUFGABE 2

## Aufgabe 2:

Zeige für die Menge

$$\mathbb{R}[X]_2 := \left\{ ax^2 + bx + c \mid a, b, c \in \mathbb{R} \right\}$$

d.h. die Menge aller Polynome vom Grad  $\leq 2$ :

- (a)  $\mathbb{R}[X]_2$  ist ein reeller Vektorraum.
- (b) Die Menge der Vektoren  $\{1 + x + x^2, 1 + x, 1 + x^2\}$  ist eine Basis von  $\mathbb{R}[X]_2$ .
- (c) Welche Dimension hat  $\mathbb{R}[X]_2$ ?

# ÜBUNG 7.2 AUFGABE 2

## Aufgabe 2:

Zeige für die Menge

$$\mathbb{R}[X]_2 := \left\{ ax^2 + bx + c \mid a, b, c \in \mathbb{R} \right\}$$

d.h. die Menge aller Polynome vom Grad  $\leq 2$ :

- (a)  $\mathbb{R}[X]_2$  ist ein reeller Vektorraum.
- (b) Die Menge der Vektoren  $\{1 + x + x^2, 1 + x, 1 + x^2\}$  ist eine Basis von  $\mathbb{R}[X]_2$ .
- (c) Welche Dimension hat  $\mathbb{R}[X]_2$ ?

c)

# ÜBUNG 7.2 AUFGABE 2

## Aufgabe 2:

Zeige für die Menge

$$\mathbb{R}[X]_2 := \left\{ ax^2 + bx + c \mid a, b, c \in \mathbb{R} \right\}$$

d.h. die Menge aller Polynome vom Grad  $\leq 2$ :

- (a)  $\mathbb{R}[X]_2$  ist ein reeller Vektorraum.
- (b) Die Menge der Vektoren  $\{1 + x + x^2, 1 + x, 1 + x^2\}$  ist eine Basis von  $\mathbb{R}[X]_2$ .
- (c) Welche Dimension hat  $\mathbb{R}[X]_2$ ?

# ÜBUNGSAUFGABE

## MUSTERLÖSUNG

# ÜBUNG 7.2 AUFGABE 2

## Aufgabe 2:

Zeige für die Menge

$$\mathbb{R}[X]_2 := \left\{ ax^2 + bx + c \mid a, b, c \in \mathbb{R} \right\}$$

d.h. die Menge aller Polynome vom Grad  $\leq 2$ :

- (a)  $\mathbb{R}[X]_2$  ist ein reeller Vektorraum.
- (b) Die Menge der Vektoren  $\{1 + x + x^2, 1 + x, 1 + x^2\}$  ist eine Basis von  $\mathbb{R}[X]_2$ .
- (c) Welche Dimension hat  $\mathbb{R}[X]_2$ ?

## a) Vektorraumaxiome prüfen



# ÜBUNG 7.2 AUFGABE 2

## Aufgabe 2:

Zeige für die Menge

$$\mathbb{R}[X]_2 := \left\{ ax^2 + bx + c \mid a, b, c \in \mathbb{R} \right\}$$

d.h. die Menge aller Polynome vom Grad  $\leq 2$ :

- (a)  $\mathbb{R}[X]_2$  ist ein reeller Vektorraum.
- (b) Die Menge der Vektoren  $\{1 + x + x^2, 1 + x, 1 + x^2\}$  ist eine Basis von  $\mathbb{R}[X]_2$ .
- (c) Welche Dimension hat  $\mathbb{R}[X]_2$ ?

## a) Vektorraumaxiome prüfen

Diesen Aufgabenteil lösen sie durch nachrechnen. Alle Axiome gelten aufgrund der Rechenregeln mit reellen Zahlen.

# ÜBUNG 7.2 AUFGABE 2

## Aufgabe 2:

Zeige für die Menge

$$\mathbb{R}[X]_2 := \{ ax^2 + bx + c \mid a, b, c \in \mathbb{R} \}$$

d.h. die Menge aller Polynome vom Grad  $\leq 2$ :

- (a)  $\mathbb{R}[X]_2$  ist ein reeller Vektorraum.
- (b) Die Menge der Vektoren  $\{ 1 + x + x^2, 1 + x, 1 + x^2 \}$  ist eine Basis von  $\mathbb{R}[X]_2$ .
- (c) Welche Dimension hat  $\mathbb{R}[X]_2$ ?

## a) Vektorraumaxiome prüfen

Diesen Aufgabenteil lösen sie durch nachrechnen. Alle Axiome gelten aufgrund der Rechenregeln mit reellen Zahlen.

Beispiel S2:

$$(\alpha + \beta)(ax^2 + bx + c) = \alpha(ax^2 + bx + c) + \beta(ax^2 + bx + c)$$

# ÜBUNG 7.2 AUFGABE 2

## Aufgabe 2:

Zeige für die Menge

$$\mathbb{R}[X]_2 := \{ ax^2 + bx + c \mid a, b, c \in \mathbb{R} \}$$

d.h. die Menge aller Polynome vom Grad  $\leq 2$ :

- (a)  $\mathbb{R}[X]_2$  ist ein reeller Vektorraum.
- (b) Die Menge der Vektoren  $\{ 1 + x + x^2, 1 + x, 1 + x^2 \}$  ist eine Basis von  $\mathbb{R}[X]_2$ .
- (c) Welche Dimension hat  $\mathbb{R}[X]_2$ ?

## a) Vektorraumaxiome prüfen

Diesen Aufgabenteil lösen sie durch nachrechnen. Alle Axiome gelten aufgrund der Rechenregeln mit reellen Zahlen.

Beispiel S2:

$$(\alpha + \beta)(ax^2 + bx + c) = \alpha(ax^2 + bx + c) + \beta(ax^2 + bx + c)$$

Beispiel V3: Betrachte  $z = ax^2 + bx + c \in \mathbb{R}[X]_2$ , dann wähle  $-z = -ax^2 - bx - c$ , dann gilt

$$z + (-z) = (a - a)x^2 + (b - b)x + (c - c) = 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}[X]_2}.$$

## ÜBUNG 7.2 AUFGABE 2

a) Vektorraumaxiome prüfen (sind erfüllt)

## ÜBUNG 7.2 AUFGABE 2

- a) Vektorraumaxiome prüfen (sind erfüllt)
- b) Basis auf lineare Unabhängigkeit überprüfen

## ÜBUNG 7.2 AUFGABE 2

a) Vektorraumaxiome prüfen (sind erfüllt)

b) Basis auf lineare Unabhängigkeit überprüfen

erlaubte Operationen sind: Zeilen aufeinander addieren, Zeilen mit Faktor multiplizieren, Zeilen vertauschen

## ÜBUNG 7.2 AUFGABE 2

a) Vektorraumaxiome prüfen (sind erfüllt)

b) Basis auf lineare Unabhängigkeit überprüfen

erlaubte Operationen sind: Zeilen aufeinander addieren, Zeilen mit Faktor multiplizieren, Zeilen vertauschen

$$\{1 + x + x^2, 1 + x, 1 + x^2\}$$

## ÜBUNG 7.2 AUFGABE 2

a) Vektorraumaxiome prüfen (sind erfüllt)

b) Basis auf lineare Unabhängigkeit überprüfen

erlaubte Operationen sind: Zeilen aufeinander addieren, Zeilen mit Faktor multiplizieren, Zeilen vertauschen

$$\{1 + x + x^2, 1 + x, 1 + x^2\}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



## ÜBUNG 7.2 AUFGABE 2

a) Vektorraumaxiome prüfen (sind erfüllt)

b) Basis auf lineare Unabhängigkeit überprüfen

erlaubte Operationen sind: Zeilen aufeinander addieren, Zeilen mit Faktor multiplizieren, Zeilen vertauschen

$$\{1 + x + x^2, 1 + x, 1 + x^2\}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

## ÜBUNG 7.2 AUFGABE 2

a) Vektorraumaxiome prüfen (sind erfüllt)

b) Basis auf lineare Unabhängigkeit überprüfen

erlaubte Operationen sind: Zeilen aufeinander addieren, Zeilen mit Faktor multiplizieren, Zeilen vertauschen

$$\{1 + x + x^2, 1 + x, 1 + x^2\}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

## ÜBUNG 7.2 AUFGABE 2

a) Vektorraumaxiome prüfen (sind erfüllt)

b) Basis auf lineare Unabhängigkeit überprüfen

erlaubte Operationen sind: Zeilen aufeinander addieren, Zeilen mit Faktor multiplizieren, Zeilen vertauschen

$$\{1 + x + x^2, 1 + x, 1 + x^2\}$$

$$\begin{array}{l} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{array}$$

## ÜBUNG 7.2 AUFGABE 2

a) Vektorraumaxiome prüfen (sind erfüllt)

b) Basis auf lineare Unabhängigkeit überprüfen

erlaubte Operationen sind: Zeilen aufeinander addieren, Zeilen mit Faktor multiplizieren, Zeilen vertauschen

$$\{1 + x + x^2, 1 + x, 1 + x^2\}$$

$$\begin{array}{ccc} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} & \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} & \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} & \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} & \end{array}$$

## ÜBUNG 7.2 AUFGABE 2

a) Vektorraumaxiome prüfen (sind erfüllt)

b) Basis auf lineare Unabhängigkeit überprüfen

erlaubte Operationen sind: Zeilen aufeinander addieren, Zeilen mit Faktor multiplizieren, Zeilen vertauschen

$$\{1 + x + x^2, 1 + x, 1 + x^2\}$$

$$\begin{array}{ccc} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} & \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} & \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} & \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} & \end{array}$$

$\Rightarrow$  die Basismenge ist linear unabhängig und die Matrix hat (vollen) Rang 3

## ÜBUNG 7.2 AUFGABE 2

- a) Vektorraumaxiome prüfen (sind erfüllt)
- b) Basis auf lineare Unabhängigkeit überprüfen (erfüllt)
- c) Der Vektorraum ist dreidimensional.

VIEL ERFOLG FÜR DEN **STUDIENSTART!**

