Procesamiento de Señales e Imágenes Biomédicas

Instituto Tecnológico de Buenos Aires

Trabajo Práctico final

Profesores:
Roberto Sebastián Tomás
Francisco Tassara
Victoria Reppucci
Lucila Capurro

Alumnos/as:
Joaquín Basualdo – 65658
Bautista Estrada – 65583
Facundo Garaguso Fernandez – 65436

Criterio	**Calificación**
Presentación	
Desarrollo	
Conclusiones	
Nota Final	
Firma y Fecha	

Índice

1. Introducción **3**

1.1. Marco Teórico . . . 3

1.1.1. Enfermedad de Alzheimer . . . 3

1.1.2. Resonancia Magnética (MRI) y Secuencias T1 . . . 3

1.2. Estado del Arte . . . 3

1.3. Objetivos . . . 4

2. Materiales y Métodos **4**

2.1. Datos . . . 4

2.2. Acondicionamiento de las imágenes . . . 5

2.3. Extracción del cerebro . . . 5

2.4. Comparación entre visitas . . . 6

2.5. Segmentación de los ventrículos laterales . . . 6

2.6. Medidas . . . 7

2.7. Análisis longitudinal y clínico . . . 7

2.8. Validación . . . 7

2.9. Implementación . . . 8

3. Resultados **8**

3.1. Validación del método . . . 8

3.2. Evolución por paciente . . . 9

4. Conclusiones **10**

4.1. Discusión . . . 10

4.2. Limitaciones . . . 11

5. Bibliografia **11**

1. Introducción

1.1. Marco Teórico

1.1.1. Enfermedad de Alzheimer

La Enfermedad de Alzheimer es un trastorno neurodegenerativo primario y progresivo, catalogado como la causa más frecuente de demencia a nivel global. La patología se caracteriza por la acumulación extracelular de placas de proteína beta-amiloide y la formación intracelular de ovillos de proteína tau. Estas alteraciones desencadenan una cascada tóxica que interrumpe la comunicación celular, resultando en una pérdida masiva de sinapsis y la subsecuente muerte neuronal.

A nivel macroscópico, esta neurodegeneración sostenida se manifiesta como una severa atrofia estructural del encéfalo. El proceso atrófico provoca una reducción mensurable del volumen del tejido cerebral. Como consecuencia directa de esta pérdida progresiva de masa encefálica, se produce un fenómeno anatómico compensatorio conocido como expansión ventricular, donde se ensanchan drásticamente para ocupar el volumen intracraneal que el tejido muerto ha dejado vacío, llenándose de líquido cefalorraquídeo (LCR).

La magnitud de esta degradación anatómica presenta una fuerte correlación con el deterioro cognitivo del paciente. Clínicamente, el grado de este deterioro se estandariza mediante herramientas de evaluación. Clínicamente, el grado de este deterioro se estandariza mediante herramientas de evaluación como la *Clinical Dementia Rating* (CDR), que clasifica la demencia en normal (0), muy leve (0,5), leve (1), moderada (2) y severa (3), y el *Mini-Mental State Examination* (MMSE), un test cognitivo de 0 a 30 puntos en el que valores menores a 24 sugieren deterioro.

1.1.2. Resonancia Magnética (MRI) y Secuencias T1

La Resonancia Magnética es una técnica de diagnóstico por imágenes no invasiva que emplea campos magnéticos estáticos y pulsos de radiofrecuencia para alinear y alterar transitoriamente el estado energético de los protones (átomos de hidrógeno) presentes en las moléculas de agua y grasa del cuerpo humano. A medida que estos protones regresan a su estado de equilibrio energético emiten señales electromagnéticas. Estas señales son capturadas por antenas receptoras y procesadas computacionalmente para reconstruir imágenes de altísima resolución espacial.

Por su parte, la ponderación T1 está diseñada para explotar el tiempo de relajación longitudinal de los tejidos, maximizando el contraste anatómico. Esto se traduce en una escala de grises definida: el líquido cefalorraquídeo alojado en los ventrículos presenta se visualiza netamente hipointenso (negro u oscuro); la sustancia blanca, rica en lípidos debido a la mielina, se observa hiperintensa (blanca o clara); finalmente, la sustancia gris de la corteza cerebral adopta una señal isointensa (tonalidad gris intermedia).

1.2. Estado del Arte

El dataset proviene de una investigación realizada en la Escuela de Medicina de la Univeridad de Washington y fue publicada en el paper .°pen access series of imaging studies: Longitudinal MRI data in nondemented and demented older adults", con el objetivo de generar opensource data para estimular la investigación. La base de datos posee resonacias magnéticas T1 de 150 sujetos (todos con mano derecha dominante) entre los 60 y 96 años con dos o más visitas separadas al menos un

año. Se utilizó el Clinical Dementia Rating scale para determinar el nivel de demensia de los adultos lo cual se correlaciona con el avance de la enfermedad de Alzheimer. Para conocer el CDR score se analizan 6 dominios: memoria, orientación, resolución de problemas, cuidado personal, Hogar y pasatiempos y su desempeño en comunidad. Para CDR mayores a 0 se considera una demensia pequeña, y este criterio fue confirmado con examinacion histológica con un 93 % de acierto. Por su parte, para reducir la relación señal-ruido y mejorar la calidad volumétrica, el protocolo de estudio estableció que para cada paciente se adquirieran de tres a cuatro imágenes individuales con ponderación T1 utilizando un resonador magnético Vision de 1.5 Tesla (Siemens, Erlangen, Alemania) en una misma sesión clínica

Una gran importancia de la investigación realizada es analizar algunas técnicas de postprocesamiento utilizadas a principio de siglo, para obtener tres métricas fundamentales:El procesamiento volumétrico se fundamenta en el cálculo secuencial de tres métricas clave. Inicialmente, el Volumen Intracraneal Total Estimado se obtiene mediante técnicas de registro espacial, alineando el cerebro del paciente con uno de referencia y multiplicando el volumen de este último por el determinante de la matriz de transformación afín. A partir de este, se determina el Volumen Cerebral Total Normalizado (nWBV), el cual representa el porcentaje del espacio intracraneal ocupado por masa encefálica viva. Este valor se extrae empleando herramientas de segmentación basadas en modelos estadísticos de Campos Aleatorios de Markov Ocultos, los cuales clasifican cada vóxel analizando tanto su nivel de brillo como su proximidad espacial. Finalmente, para evaluar el desgaste estructural longitudinal provocado por el Alzheimer, se calcula la Tasa de Atrofia Anual y se obtiene al restar el nWBV del segundo escaneo menos el del primero, normalizandolo.

1.3. Objetivos

El objetivo principal de este proyecto es diseñar e implementar un algoritmo computacional capaz de cuantificar de manera objetiva la progresión de la atrofia estructural del cerebro asociada a la Enfermedad de Alzheimer. Mediante el procesamiento automatizado de imágenes por resonancia magnética (MRI), el sistema medirá métricamente la expansión de los ventrículos cerebrales (consecuencia directa de la pérdida de masa encefálica) y evaluará la degradación del tejido anatómico circundante. Este análisis se fundamentará en la comparación temporal de estudios longitudinales de un mismo paciente, permitiendo trazar la evolución morfológica de la enfermedad a lo largo del tiempo.

2. Materiales y Métodos

2.1. Datos

Se utilizó el conjunto de datos longitudinal OASIS-2 (Marcus et al., 2010), descripto en la sección de Estado del Arte. En cada visita se adquirieron entre tres y cuatro resonancias T1 consecutivas, con un tamaño de vóxel de $1 \times 1 \times 1{,}25$ mm, almacenadas en formato Analyze (archivos `.img` y `.hdr`). Los datos clínicos (grupo, edad, CDR, MMSE, eTIV y nWBV de cada visita) se obtuvieron de la planilla publicada junto con el dataset.

Se seleccionaron cuatro pacientes que representan distintas evoluciones clínicas:

- **OAS2_0070** (sano): cinco visitas entre los 80 y los 86 años, con CDR 0 en todas ellas.

- **OAS2_0048** (demencia): cinco visitas entre los 66 y los 69 años, con demencia leve (CDR 1) sostenida.
- **OAS2_0087** (demencia): dos visitas a los 96 y 98 años, con progresión de demencia leve (CDR 1) a moderada (CDR 2).
- **OAS2_0127** (*converted*): cinco visitas entre los 79 y los 86 años; ingresó sano (CDR 0) y desde la segunda visita presentó demencia muy leve (CDR 0,5).

2.2. Acondicionamiento de las imágenes

Cada visita se acondicionó en tres pasos, con el objetivo de que el mismo tejido tenga el mismo brillo en toda la imagen y en todas las visitas:

1. **Promediado de adquisiciones**: las adquisiciones de una misma sesión se alinearon con la primera (`mpr-1`) mediante un registro rígido de seis parámetros (tres rotaciones y tres traslaciones), que maximiza la información mutua entre las imágenes con un descenso por gradiente en tres resoluciones. Las imágenes alineadas se promediaron vóxel a vóxel, lo que reduce el ruido y aumenta la relación señal-ruido, siguiendo la misma estrategia que el protocolo de OASIS.
2. **Corrección de la inhomogeneidad de campo (*bias field*)**: el resonador no ilumina la cabeza de forma pareja, por lo que un mismo tejido puede verse más claro o más oscuro según su ubicación. Esta variación lenta se estimó y corrigió con el algoritmo N4 (Tustison et al., 2010), calculado sobre una máscara de la cabeza. La máscara se obtuvo con el umbral de Otsu, seguido de un cierre morfológico, el relleno de huecos corte a corte y la selección de la región conectada más grande, para separar la cabeza del fondo.
3. **Normalización de intensidad**: dentro de la máscara de la cabeza, el percentil 1 de intensidad se llevó a 0 y el percentil 99 a 1, recortando los valores fuera de ese rango y fijando el fondo en 0. Así, el umbral de tejido es comparable entre visitas aunque el brillo general de las adquisiciones difiera.

Con fines comparativos se aplicó además un filtro de mediana de $3 \times 3 \times 3$ vóxeles al promedio de la primera visita, pero no se utilizó en el resto del procesamiento, ya que el promediado de adquisiciones reduce el ruido sin difuminar los bordes entre tejidos.

2.3. Extracción del cerebro

Para medir el volumen cerebral es necesario aislar el cerebro del cráneo, la grasa, los ojos y el cuello. En primer lugar, las intensidades de la cabeza se agrupan mediante un algoritmo de k-means de cuatro clases: oscura (hueso, líquido cefalorraquídeo y aire), sustancia gris, sustancia blanca y grasa. El umbral de tejido es el límite entre la clase oscura y la sustancia gris. Se asigna una clase propia a la grasa porque su brillo es particularmente intenso y, de lo contrario, desplaza los límites entre clases y parte de la sustancia gris queda por debajo del umbral.

El umbral por sí solo no alcanza, ya que también incluye grasa y músculo del cuero cabelludo. Por eso se utiliza el atlas MNI152 (Fonov et al., 2011), un cerebro promedio construido a partir de 152 sujetos, que se registra sobre el paciente mediante una transformación afín para delimitar

la zona donde se encuentra el cerebro. Esta zona, denominada en adelante *zona intracraneal*, es la máscara de cerebro del atlas (sustancia gris y blanca, con los surcos cerrados y los ventrículos incluidos) transformada al espacio del paciente. No equivale al volumen intracraneal real, ya que no incluye la totalidad del líquido cefalorraquídeo externo y su tamaño depende del ajuste del registro (en los pacientes analizados midió entre 1,02 y 1,19 veces el eTIV de OASIS), pero delimita la misma región anatómica en todas las visitas de un paciente. Antes del registro se prueban distintas inclinaciones de la cabeza, de $-45°$ a $45°$, para tolerar las diferentes posiciones del paciente en el resonador. El tejido cerebral queda definido como los vóxeles que superan el umbral dentro de la zona del atlas. Como los ventrículos y los surcos están ocupados por líquido cefalorraquídeo, que es oscuro en T1, quedan excluidos del tejido aun cuando estén agrandados por la atrofia.

Inicialmente se probó una extracción basada solo en erosión y dilatación morfológicas, pero se descartó porque en cerebros con atrofia las circunvoluciones finas desaparecían con la erosión y no se recuperaban.

2.4. Comparación entre visitas

Para que las mediciones de distintas visitas sean comparables, deben realizarse siempre sobre la misma región. Por ello, el atlas se registra únicamente en la primera visita y la zona intracraneal obtenida se traslada a las visitas siguientes mediante un registro rígido (rotación y traslación), dado que el cráneo no cambia con los años. Como la posición de la cabeza varía entre visitas, el registro se inicia desde dos puntos de partida (una búsqueda de la inclinación de la cabeza y una estimación obtenida a partir del atlas) y se conserva el que logra la mayor correlación de intensidades dentro del cerebro.

Como control de calidad, el procedimiento emite un aviso si la correlación entre visitas es menor a 0,85 o si la zona intracraneal supera 1,3 veces el volumen intracraneal estimado (eTIV) publicado por OASIS.

2.5. Segmentación de los ventrículos laterales

Los ventrículos laterales se segmentaron combinando un atlas anatómico con el umbral de intensidad. Se utilizaron las etiquetas de ventrículo lateral izquierdo y derecho del atlas subcortical Harvard-Oxford, que se llevaron al espacio de cada visita con las transformaciones ya calculadas en la extracción del cerebro (atlas $\rightarrow$ primera visita y, en las visitas siguientes, primera visita $\rightarrow$ visita actual). Para cada ventrículo:

1. Se delimitó una región de búsqueda de 8 mm alrededor de la etiqueta del atlas, lo que permite detectar ventrículos agrandados sin buscar líquido cefalorraquídeo en toda la cabeza.
2. Dentro de esa región y de la zona intracraneal, se seleccionaron los vóxeles oscuros: aquellos con intensidad, tras un suavizado gaussiano de 0,6 mm, menor o igual al umbral de tejido más una pequeña tolerancia por volumen parcial (0,025).
3. Se separaron ambos hemisferios con un plano medio estimado a partir de las dos etiquetas del atlas.
4. Se identificaron las regiones conectadas (vecindad de seis vóxeles) y se conservó la que más se superpone con la etiqueta del atlas, junto con otros fragmentos relevantes superpuestos a ella.

Cada segmentación recibe un estado de control: se marca para revisión si el atlas no se superpone con la imagen, si no se encuentran regiones candidatas, si la región cubre menos del 12 % de la etiqueta del atlas o si el volumen total queda fuera del rango de 2 a 120 ml. Cuando no se detecta ningún problema, el estado indica únicamente que la máscara debe inspeccionarse visualmente en el reporte (`REVISAR_MASCARA`).

2.6. Medidas

En cada visita se calculan las siguientes medidas:

- **Volumen de tejido cerebral** (ml): sustancia gris y blanca dentro de la zona intracraneal.
- **nWBV propio**: volumen de tejido dividido por el eTIV publicado por OASIS, para comparar con el nWBV del dataset.
- **Volumen ventricular** (ml): ventrículos laterales.
- **Fracción ventricular** (%): volumen ventricular dividido por el volumen de la zona intracraneal. Como la zona es la misma en todas las visitas de un paciente, actúa como referencia fija y permite comparar pacientes con cabezas de distinto tamaño.

2.7. Análisis longitudinal y clínico

Para cada paciente se calcularon, respecto de la primera visita y entre visitas consecutivas, los cambios de volumen cerebral y ventricular (en ml y en porcentaje), las tasas de cambio en ml/año y la variación de la fracción ventricular. Las tasas anuales reportadas en los resultados se obtuvieron mediante regresión lineal sobre todas las visitas, lo que reduce la influencia del error de cada medición individual. Estos cambios se analizaron junto con la evolución del CDR y del MMSE de cada visita, y se compararon con la variación del nWBV publicado por OASIS.

Como salidas del procesamiento se generó un reporte en PDF por paciente, con las imágenes de cada etapa, y se exportaron las máscaras ventriculares de cada visita en formato NIfTI, con la misma ubicación espacial que la adquisición original, para poder inspeccionarlas en un visor externo. Además, la última visita de cada paciente se remuestreó sobre la grilla de la primera mediante el registro rígido, lo que permite comparar ambos estudios sobre los mismos cortes anatómicos.

2.8. Validación

El método se evaluó de tres formas:

- **Concordancia con OASIS**: se comparó la tasa de atrofia obtenida (variación anual del nWBV propio) con la del nWBV publicado por OASIS (Marcus et al., 2010), calculado por los autores con su propio método automático.
- **Test-retest (precisión)**: en cada visita, OASIS adquirió entre tres y cuatro resonancias consecutivas. Como en esos minutos el cerebro no cambia, la diferencia entre medir por separado la primera y la segunda adquisición corresponde al error del método. Se evaluaron las dos primeras visitas de cada paciente.

- **Segmentación manual externa (exactitud de los ventrículos)**: como OASIS no publica volúmenes ventriculares, se utilizó el conjunto de entrenamiento de MRBrainS18 (Kuijf et al., 2024; 7 sujetos mayores de 50 años con distintos grados de atrofia), en el que expertos segmentaron manualmente los ventrículos. La superposición se cuantificó con el coeficiente Dice, $D = 2|A \cap B|/(|A|+|B|)$, que vale 1 si ambas máscaras coinciden y 0 si no se superponen. La referencia manual incluye todos los ventrículos (laterales con sus astas temporales, tercero y cuarto), mientras que el método mide solo los ventrículos laterales.

2.9. Implementación

El procesamiento se implementó en Python, utilizando NumPy y SciPy para el cálculo numérico y la morfología, SimpleITK para los registros y la corrección N4, nibabel para la lectura de las imágenes, nilearn para la obtención de los atlas MNI152 y Harvard-Oxford, pandas para los datos tabulares y Matplotlib para las figuras. El código se organizó en módulos según la etapa del procesamiento (lectura, acondicionamiento, extracción de características, interpretación, validación, visualización y reporte).

3. Resultados

3.1. Validación del método

La Tabla 1 resume las tres validaciones. La tasa de atrofia coincidió con la de OASIS en el paciente que desarrolló demencia (*converted*) y en el paciente sano (1,02 y 1,18 veces la de OASIS, respectivamente), y fue mayor en los pacientes con demencia (1,27 y 1,56 veces); en los cuatro casos, ambos métodos ordenaron a los pacientes de la misma forma. En el ensayo test-retest, el error típico (mediana de las diferencias) fue de 6,9 ml (0,55 %) para el tejido cerebral y de 0,22 ml (0,48 %) para los ventrículos. Se observó un caso atípico (OAS2_0127, visita 1), con una diferencia de 83 ml en el tejido y de solo 0,08 ml en los ventrículos, que se atribuye a una adquisición de menor calidad. Frente a la segmentación manual de MRBrainS18 se obtuvo un coeficiente Dice medio de 0,84 y una correlación de volúmenes de $r = 0{,}98$.

Validación	**Medida**	**Resultado**
Concordancia con OASIS	Tasa de atrofia propia / tasa de OASIS	Converted 1,02; sano 1,18; dementes 1,27 y 1,56
Test-retest	Error típico (mediana), tejido / ventrículos	6,9 ml / 0,22 ml
MRBrainS18 ($n = 7$)	Dice medio (rango) / correlación de volúmenes	0,84 (0,74–0,91) / $r = 0{,}98$

Tabla 1: Resultados de las tres validaciones del método.

El volumen ventricular resultó en promedio un 19 % menor que el de la referencia manual. Esta diferencia no es una medida del error del método: la referencia incluye el tercer y cuarto ventrículo y las astas temporales, que el método no segmenta, por lo que el volumen manual será siempre mayor. Por el mismo motivo, el coeficiente Dice obtenido es conservador, ya que también se ve penalizado por esas estructuras. Las medidas relevantes son la correlación de volúmenes ($r = 0{,}98$),

que indica que el método ordena correctamente a los sujetos de menor a mayor volumen ventricular (lo necesario para seguir su evolución en el tiempo), y el Dice, que indica una buena superposición con la segmentación de expertos a pesar de esa diferencia de definición. En un sujeto (Dice 0,74) el registro del atlas quedó sobredimensionado, lo que fue detectado por el control de calidad.

3.2. Evolución por paciente

La Tabla 2 presenta la evolución de cada paciente. Las tasas se calcularon mediante regresión lineal sobre todas las visitas. La columna «Veces el error» compara el cambio ventricular total con el error del test-retest.

Paciente	**Visitas / años**	**Atrofia (%/año)**	**Ventrículos (ml/año)**	**Fracción ventricular (%)**	**Veces el error**	**CDR**	**MMSE**
0070 (sano)	5 / 6,5	−0,61 (−0,55)	+1,35	3,14 → 3,58	41	0 → 0	28 → 30
0127 (converted)	5 / 7,2	−1,18 (−1,09)	+2,90	2,51 → 3,75	97	0 → 0,5	29 → 30
0087 (demencia)	2 / 2,1	−2,01 (−1,64)	+1,66	2,77 → 2,96	16	1 → 2	26 → 21
0048 (demencia)	5 / 3,4	−2,24 (−1,46)	+5,27	3,13 → 4,09	83	1 → 1	19 → 4

Tabla 2: Evolución morfológica y clínica de cada paciente (OAS2_XXXX). Atrofia: variación anual del nWBV propio (entre paréntesis, la de OASIS). Veces el error: cambio ventricular total dividido por el error del test-retest (0,22 ml). CDR (*Clinical Dementia Rating*): grado de demencia (0 = normal; 0,5 = muy leve; 1 = leve; 2 = moderada). MMSE (*Mini-Mental State Examination*): evaluación cognitiva de 0 a 30 puntos; valores menores a 24 sugieren deterioro cognitivo.

El paciente sano presentó la menor tasa de atrofia y de expansión ventricular, y OAS2_0048 las mayores. Este último es además el que mostró el mayor deterioro clínico, con una caída del MMSE de 19 a 4 puntos en 3,4 años.

La Figura 1 muestra la comparación anatómica entre la primera y la última visita de OAS2_0127, sobre los mismos cortes. Se observa el aumento del volumen de los ventrículos laterales a lo largo de los 7,2 años de seguimiento.




Figura 1: Ventrículos laterales de OAS2_0127 en la primera (izquierda) y la última visita (derecha), sobre los mismos cortes sagital, coronal y axial. Contorno amarillo: segmentación automática.

4. Conclusiones

4.1. Discusión

Los ventrículos resultaron un marcador más confiable que el volumen cerebral: su error de medición fue de 0,22 ml frente a 6,9 ml para el tejido, y su volumen aumentó de forma prácticamente monótona entre visitas, mientras que el del tejido fluctuó. El crecimiento ventricular superó el error de medición entre 16 y 97 veces según el paciente, por lo que no puede atribuirse a ruido del método.

El paciente sano también presentó expansión ventricular. Esto es esperable: entre los 80 y los 86 años el cerebro pierde volumen por el envejecimiento normal, aun sin demencia, y como el cráneo no cambia, ese espacio es ocupado por líquido cefalorraquídeo que se acumula en los ventrículos y los surcos. Lo que distingue a la demencia no es la presencia de expansión ventricular sino su velocidad: OAS2_0048 la presentó unas cuatro veces más rápido que el paciente sano. En

el paciente sano, además, la pérdida de tejido en todo el seguimiento (4,4 ml) fue menor que el error de medición del tejido, mientras que el crecimiento ventricular (8,8 ml) lo superó 41 veces: en este caso, los ventrículos detectaron un cambio que el volumen cerebral no llegó a distinguir del error.

Expresado en mililitros por año, el crecimiento ventricular de OAS2_0087 (+1,66) resultó similar al del paciente sano (+1,35). Sin embargo, en términos relativos fue mayor (3,5 % anual frente a 2,3 %), y su atrofia cerebral fue más de tres veces más rápida (−2,01 frente a −0,61 % anual, en concordancia con OASIS). Además, OAS2_0087 cuenta con solo dos visitas separadas por dos años, por lo que su tasa proviene de un único intervalo y es mucho menos confiable que la del paciente sano, estimada con cinco visitas en 6,5 años. Con esa información no es posible caracterizar adecuadamente su expansión ventricular.

En los pacientes con demencia, el método estimó una atrofia mayor que la de OASIS. Una posible explicación es que los vóxeles del límite entre tejido y líquido cefalorraquídeo, que contienen una mezcla de ambos, se cuentan enteros o se descartan enteros según el umbral; en cerebros que se atrofian rápidamente los surcos se ensanchan y aumenta la proporción de esos vóxeles. Por último, el volumen absoluto de los ventrículos está subestimado respecto de la referencia manual, pero, al ser una diferencia sistemática, no afecta la tasa de cambio.

4.2. Limitaciones

- Se analizó un paciente por grupo (dos en el caso de demencia), por lo que los resultados son descriptivos y no permiten generalizar.
- OAS2_0087 cuenta con solo dos visitas, lo que impide estimar una tendencia.
- La ubicación inicial del atlas puede fallar en imágenes con menos ruido. Para saber dónde ubicarlo, el método construye una máscara aproximada del cerebro erosionando el tejido y conservando la región conectada más grande. Entre el cerebro y la cara o el cuello existen puentes finos de tejido: en una imagen ruidosa el ruido los interrumpe y la región más grande es solo el cerebro, pero en una imagen más limpia (como el promedio de adquisiciones o una resonancia de 3 T) los puentes permanecen, la región incluye la cara y el cuello, y el atlas se ubica en un lugar incorrecto. Esto ocurrió en 1 de los 7 sujetos de MRBrainS18 y fue detectado por el control de calidad.
- Los resultados varían alrededor de un 1 % entre ejecuciones, debido a que la biblioteca de registro (SimpleITK) distribuye el cálculo entre varios hilos del procesador.

5. Bibliografia

- Fowler, K. D., Funt, J. M., Artyomov, M. N., Zeskind, B., Kolitz, S. E., & Towfic, F. (2015). Leveraging existing data sets to generate new insights into Alzheimer's disease biology in specific patient subsets. Scientific Reports, 5, Artículo 14324. https://doi.org/10.1038/srep14324
- Marcus, D. S., Fotenos, A. F., Csernansky, J. G., Morris, J. C., & Buckner, R. L. (2010). Open access series of imaging studies: Longitudinal MRI data in nondemented and demented older adults. Journal of Cognitive Neuroscience, 22(12), 2677–2684.

- Fonov, V., Evans, A. C., Botteron, K., Almli, C. R., McKinstry, R. C., Collins, D. L., & Brain Development Cooperative Group (2011). Unbiased average age-appropriate atlases for pediatric studies. NeuroImage, 54(1), 313–327.
- Tustison, N. J., Avants, B. B., Cook, P. A., Zheng, Y., Egan, A., Yushkevich, P. A., & Gee, J. C. (2010). N4ITK: Improved N3 bias correction. IEEE Transactions on Medical Imaging, 29(6), 1310–1320.
- Kuijf, H. J., Bennink, E., Vincken, K. L., Weaver, N., Biessels, G. J., & Viergever, M. A. (2024). MR Brain Segmentation Challenge 2018 Data (V1) [Conjunto de datos]. DataverseNL. https://doi.org/10.34894/E0U32Q

- La zona intracraneal utilizada como referencia de la fracción ventricular proviene del atlas y no coincide exactamente con el volumen intracraneal real, por lo que la fracción ventricular es comparable entre pacientes de este trabajo pero no directamente con valores de la literatura.