

Instituto de Cibernética, Matemática y Física  
Departamento de Física Teórica

TESIS DE MAESTRÍA

---

**EXPLORACIÓN DE LOS ATRACTORES  
HOMEOSTÁTICO, ALZHEIMER Y  
GLIOBLASTOMA**

---

**Autor:** Joan Andrés Nieves Cuadrado

**Tutor:** Dr. Augusto González García, *ICIMAF*



La Habana, 2024

*Aquí va la dedicatoria o una frase cool*

## Resumen

Los datos disponibles de la materia blanca de cerebro permiten localizar los atractores normal (homeostático), Glioblastoma y Alzheimer en el espacio de expresión genética e identificar caminos relacionados con transiciones como la carcinogénesis o la aparición del Alzheimer. También se aprecia una trayectoria predefinida para el envejecimiento, lo cual es consistente con la hipótesis del envejecimiento programado. Adicionalmente, suposiciones razonables sobre la fortaleza relativa de los atractores permite dibujar un panorama esquemático del *fitnest*: diagrama de Wright. Estos sencillos diagramas reproducen relaciones conocidas entre el envejecimiento, el Glioblastoma y el Alzheimer, y plantea cuestiones interesantes como la posible conexión entre el envejecimiento programado y el Glioblastoma en este tejido. Prevemos que múltiples diagramas similares en otros tejidos podrían ser útiles en el entendimiento de la biología de enfermedades o trastornos aparentemente no relacionados, y para descubrir pistas inesperadas para su tratamiento.

## Abstract

Available data for white matter of the brain allows to locate the normal (homeostatic), Glioblastoma and Alzheimer's disease attractors in gene expression space and to identify paths related to transitions like carcinogenesis or Alzheimer's disease onset. A predefined path for aging is also apparent, which is consistent with the hypothesis of programmatic aging. In addition, reasonable assumptions about the relative strengths of attractors allow to draw a schematic landscape of fitness: a Wright's diagram. These simple diagrams reproduce known relations between aging, Glioblastoma and Alzheimer's disease, and rise interesting questions like the possible connection between programmatic aging and Glioblastoma in this tissue. We anticipate that similar multiple diagrams in other tissues could be useful in the understanding of the biology of apparently unrelated diseases or disorders, and in the discovery of unexpected clues for their treatment.

# Índice general

<b>Resumen</b>	<b>II</b>
<b>Abstract</b>	<b>III</b>
<b>Índice general</b>	<b>IV</b>
<b>Introducción</b>	<b>1</b>
<b>1. Materiales y métodos</b>	<b>4</b>
1.1. Reducción de la dimensionalidad . . . . .	4
<b>2. Chapter 2</b>	<b>9</b>
2.1. The N + GB + EA diagram . . . . .	9
<b>3. Chapter 3</b>	<b>13</b>
<b>Conclusiones</b>	<b>14</b>
<b>Recomendaciones</b>	<b>15</b>
<b>Bibliografía</b>	<b>16</b>

# Introducción

El *fitness* celular refiere a la capacidad de una célula de sobrevivir y proliferar en un ambiente determinado. Abarca varios factores como la capacidad de la célula para adaptarse al ambiente, resistir al estrés y mantener la homeostasis. Este concepto es particularmente importante en la biología del cáncer, donde los niveles de *fitness* celular pueden determinar su supervivencia y dominancia dentro de un tejido.

Un paradigma conocido en la biología molecular expresa que los máximos locales de *fitness*, en el espacio de expresión genética, están relacionados con estados biológicos accesibles. Un diagrama de Wright es una representación gráfica reducida del panorama genético, donde los picos y valles representan diferentes genotipos y sus niveles relativos de *fitness* [1], ver figura 1.




Figura 1: Representación esquemática de un diagrama de Wright. Las zonas de mayor *fitness* (+) están asociadas con estados biológicos accesibles. Las de menor *fitness* (-) son solo zonas de transito. Las líneas discontinuas delimitan los distintos niveles de *fitness*. Tomada de la referencia [1]

Esta representación ha sido aplicada a la descripción del destino celular a lo largo de una

línea de diferenciación [2]. Sin embargo, hasta donde sabemos, no hay gráficos basados en datos reales para un tejido dado que represente, al menos de forma parcial, un diagrama de Wright con más de dos máximos. En el presente trabajo, mostramos un diagrama para la materia blanca del cerebro en el cual el estado normal (N) se representa junto con el atractor de glioblastoma (GB) y el máximo relacionado con la enfermedad del Alzheimer (EA).

La EA se caracteriza por la pérdida progresiva de células neuronales, mientras que el GB es un tipo de cáncer cerebral que implica la proliferación descontrolada de células. Algunas investigaciones muestran que pacientes con la EA podrían tener un menor riesgo de desarrollar GB. Por ejemplo, en la referencia [3] se muestra que ambas enfermedades presentan un aumento en el estrés oxidativo, en la EA, esto hace que las células neuronales sean más vulnerables a la muerte, mientras que en el GB, las células cancerosas se vuelven más resistentes. Además, se plantea que la degeneración de células que secretan acetilcolina en la EA podría tener un efecto protector contra el cáncer, ya que esta sustancia puede estimular el crecimiento de células cancerosas.

Los estudios epidemiológicos señalan que aquellas personas que padecen una de estas enfermedades tienen un riesgo menor de desarrollar la otra. Concretamente, los pacientes con cáncer tienen un riesgo alrededor de 31 y 35 % menor de desarrollar la EA en comparación con aquellos sin antecedente de cáncer. Mientras que las personas que padecen la EA tienen un riesgo entre 41 y 61 % menor de desarrollar cáncer [4–6].

Esta idea de la EA y el GB como alternativas opuestas también está apoyada por un gran número de experimentos de biología molecular. Por ejemplo, en la referencia [7] los autores encuentran que las vías de señalización ERK/MAPK están aumentadas en GB y disminuidas en la EA. Estas vías conectan señales extracelulares, como factores de crecimiento y citocinas, a respuestas intracelulares que regulan la proliferación celular, diferenciación y supervivencia. También muestran que las vías de señalización de la angiopoyetina están aumentadas en la EA y disminuidas en GB, estas relacionadas con la regulación de la angiogénesis y la estabilidad vascular.

El estudio realizado por C. Lanni y colaboradores en la referencia [8] destaca varios actores moleculares, especialmente PIN1 y p53, que están involucrados en interacciones moleculares complejas asociadas con la correlación inversa entre estas enfermedades. El aumento en la expresión de PIN1 está relacionado con un retraso en la edad de inicio de la EA, mientras que niveles bajos de expresión se asocian con un menor riesgo de desarrollar varios tipos de cáncer.

Muchas de estas investigaciones no solo muestran una oposición entre la EA y el GB, sino que también señalan el envejecimiento como un factor de riesgo común para ambas enfermedades [5–9]. Esta compleja relación entre ambas enfermedades cerebrales queda representada en nuestro diagrama de Wright. Además, se puede apreciar un camino o corredor hacia el envejecimiento normal, en línea con la teoría del envejecimiento programado [10, 11].

A nivel genético, hay genes que varían de la misma manera en los procesos de envejecimiento, progresión de AD y cáncer, mientras que también hay genes que indican una situación disyuntiva entre la EA y el GB. Un ejemplo de este último es el gen codificador de proteínas MMP9, que juega un papel importante en la invasión tumoral [12, 13], pero también conocido como neuroprotector, controlando las interacciones entre axones y fibras beta-amiloide [14]. Las desviaciones del valor de expresión génica de su referencia en el tejido normal pueden indicar una progresión potencial a AD (subexpresión) o a GB (sobreexpresión).

Esta visión inusual puede ayudar a comprender las relaciones entre la EA y el GB, e identificar marcadores génicos útiles para ambos procesos. Como un bono adicional, la representación permite encontrar preguntas muy interesantes que se discutirán a continuación.

El trabajo presentado como tesis de diploma consta de una introducción, tres capítulos, las conclusiones y las recomendaciones. El contenido se distribuye de la siguiente forma:

- **Introducción:** Se hace una breve descripción del panorama genético y epidemiológico que engloban a la EA, el GB y el envejecimiento. Se ejemplifican las relaciones que existen entre estos atractores.
- **Capítulo 1:**
- **Capítulo 2:**
- **Capítulo 3:**
- **Conclusiones:**
- **Recomendaciones:**



# Capítulo 1

## Materiales y métodos

### 1.1. Reducción de la dimensionalidad

La reducción de la dimensionalidad es un paso crucial en el análisis de datos, especialmente cuando se trata de grandes conjuntos con muchas variables. Este facilita la visualización y comprensión de los datos, lo que permite una rápida identificación de patrones y tendencias importantes. Algunas técnicas comunes de reducción dimensional son PCA (*Principal Component Analysis*), t-SNE (*t-Distributed Stochastic Neighbor Embedding*) y UMAP (*Uniform Manifold Approximation and Projection*). Estas técnicas son herramientas poderosas que ayudan a simplificar la complejidad de los datos sin perder información crítica, lo que permite un análisis más eficiente y efectivo.

El t-SNE es un método no lineal y estocástico. Su funcionamiento se puede separar en dos etapas. En la primera, se seleccionan los vecinos de cada punto. Para ello se utiliza una distribución gaussiana alrededor de él, donde los más cercanos tienen una probabilidad mayor de ser seleccionados que los lejanos. Este paso permite al modelo preservar las estructuras locales. Durante la segunda etapa, se asignan posiciones iniciales aleatorias en un espacio de menor dimensión (generalmente 2 o 3 dimensiones). Luego, se define una distribución de probabilidad similar para los puntos en el nuevo espacio y se minimiza la divergencia entre las dos distribuciones. Esta etapa ayuda a mantener la fidelidad de la representación en el espacio reducido. De esta forma, el algoritmo logra una transformación de los datos hacia una dimensión reducida que preserva la similitud entre los vecinos cercanos. [Buscar algunas](#)

referencias donde expliquen t-SNE

UMAP es una técnica muy similar a t-SNE. Una de las diferencias principales es que, durante la selección de los vecinos, se asume que los datos forman una variedad de menor dimensión que el espacio original. Esto le permite ser más eficiente en términos de tiempo de cómputo y más efectivo en la conservación de relaciones a gran escala. Otra característica de este método es que, para hacer la representación reducida, minimiza la entropía cruzada en lugar de la divergencia entre las distribuciones. Estas diferencias permiten a este algoritmo preservar mejor tanto la estructura local como la global de los datos, además de hacerlo capaz de trabajar con datos que no se ajustan necesariamente a una distribución normal. [Buscar algunas referencias donde expliquen UMAP](#)

Por otro lado, el PCA es una técnica lineal y determinista que transforma variables correlacionadas en un conjunto reducido de variables no correlacionadas, conocidas como componentes principales. Al igual que en los casos anteriores, su funcionamiento se puede dividir en dos etapas. En la primera etapa, se centran los datos en su media aritmética y se calcula la matriz de covarianza. Esta matriz captura la variabilidad conjunta entre múltiples variables aleatorias y permite comprender las relaciones entre ellas. Luego, durante la segunda etapa, se obtienen los autovalores, ordenados de mayor a menor, y sus correspondientes autovectores. Los autovectores representan las direcciones de máxima varianza en los datos, mientras que los autovalores indican la cantidad de varianza que se encuentra en cada una de estas direcciones. Al proyectar los datos originales sobre los primeros autovectores, se obtiene una representación de los datos en un sistema ortogonal que maximiza la conservación de la varianza, utilizando el menor número posible de componentes [15]. [Buscar algunas referencias donde expliquen PCA](#)

t-SNE y UMAP se han vuelto muy populares últimamente debido a su eficiencia y la gran capacidad de para visualizar datos de alta dimensión en un espacio de 2 o 3 dimensiones [\[insert cites here\]](#). Pero su naturaleza no lineal y estocástica hace que sea complejo una interpretación cuantitativa de los resultados. Por otro lado, PCA es una técnica lineal y determinista que junto a su relativa sencillez permite realizar varias interpretaciones de sus resultados [\[insert cites here\]](#).

Sin embargo, la aplicación directa del PCA puede presentar algunas complicaciones. Una de las principales dificultades es la construcción de la matriz de covarianza, ya que el número de elementos que contiene es igual al cuadrado de la dimensión original de los datos. Esto hace que sea imposible almacenarla en la memoria RAM de la mayoría de los equipos de

cómputo personales. Por ejemplo, si el número de componentes de los datos es  $5 \times 10^4$ , la matriz de covarianza tendría  $2,5 \times 10^9$  elementos. Suponiendo que cada elemento ocupe 8 bytes, el tamaño total de la matriz sería aproximadamente 19 GB. Si se hace uso de que esta es una matriz simétrica, se podría guardar solo los elementos de la triangular superior (o inferior), permitiendo reducir el almacenamiento necesario casi a la mitad. Sin embargo, aún así se requeriría mucho espacio y este escala rápidamente con el aumento de la dimensión de los datos. Por lo tanto, en general, es necesario recurrir al almacenamiento en disco, que tiene una velocidad de lectura y escritura menor que la memoria RAM.

Otro problema grave que enfrenta el algoritmo estándar del PCA es el cálculo de los autovalores y autovectores. La mayoría de las implementaciones de los métodos directos usados para este cálculo no permiten que se apliquen a grandes matrices debido a las limitaciones de la memoria RAM. Una característica del PCA que resulta de gran ayuda en esta parte es que, en general, no es necesario calcular todos los autovalores, solo los más grandes y sus correspondientes autovectores.

Un algoritmo relativamente sencillo de implementar y que permite calcular solo los autovalores más grandes y sus correspondientes autovectores es el método de Lanczos. En el caso del análisis de datos de expresión genética, donde solo un subconjunto diferente de genes se expresa en cada tejido, la matriz de covarianza podría tener un número elevado de valores nulos. Esto es beneficioso para el método de Lanczos, ya que funciona mejor con matrices dispersas.

El método de Lanczos puede ser de gran utilidad en algunos problemas donde las implementaciones estándar pueden verse limitadas. Sin embargo, en la práctica se utilizan otras técnicas para realizar el PCA de forma indirecta. Una de las alternativas es la descomposición en valores singulares (SVD, por sus siglas en inglés). Por estas razones, a continuación mostraremos brevemente la implementación básica del método de Lanczos. Luego, en qué consiste el SVD y cómo realizar el PCA de forma indirecta a partir de este.

## **Algoritmo de Lanczos**

El método de Lanczos es una técnica numérica utilizada para encontrar los autovalores y autovectores de una matriz grande y dispersa. Es especialmente útil en problemas de álgebra lineal donde la matriz es demasiado grande para ser manejada por métodos directos.

Poner aquí el algoritmo general del método de Lanczos

Una de las limitaciones de este algoritmo es su estabilidad numérica. [Buscar citas](#)

## Descomposición en valores singulares

La SVD provee una descomposición numéricamente estable de matrices que puede ser usado en una gran variedad de propósitos. Como resultado de aplicar este algoritmo se obtiene una descomposición matricial única que existe para toda matriz de valores complejos  $\mathbf{X} \in \mathbb{C}^{n \times m}$ :

$$\mathbf{X} = \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^*, \quad (1.1)$$

donde  $\mathbf{U} \in \mathbb{C}^{n \times n}$  y  $\mathbf{V} \in \mathbb{C}^{m \times m}$  son matrices unitarias con columnas ortonormales, y  $\mathbf{\Sigma} \in \mathbb{R}^{n \times m}$  una matriz con valores reales no negativos en la diagonal y ceros fuera de la diagonal. Aquí  $*$  denota la transpuesta conjugada.

Cuando  $n \geq m$ , la matriz  $\mathbf{\Sigma}$  tiene como máximo  $m$  valores distintos de cero en la diagonal y puede ser escrita como  $\mathbf{\Sigma} = \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{\Sigma}} \\ 0 \end{bmatrix}$ . Por lo tanto, es posible representar  $\mathbf{X}$  de forma exacta usando la versión reducida de SVD:

$$\mathbf{X} = \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^* = \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{U}} & \mathbf{U}^\perp \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{\Sigma}} \\ 0 \end{bmatrix} \mathbf{V}^*, \quad (1.2)$$

las columnas de  $\mathbf{U}^\perp$  abarcan un espacio vectorial que es complementario y ortogonal a  $\hat{\mathbf{U}}$ . Las columnas de  $\mathbf{U}$  son llamadas vectores singulares izquierdos de  $\mathbf{X}$  y forman una base del espacio de los vectores columnas de  $\mathbf{X}$ . Las columnas de  $\mathbf{V}$  son los vectores singulares derechos y forman una base para los vectores filas de  $\mathbf{X}$ . Los elementos diagonales de  $\hat{\mathbf{\Sigma}} \in \mathbb{C}^{m \times m}$ , los llamados valores singulares, están ordenados de mayor a menor. El rango de  $\mathbf{X}$  es igual a la cantidad de valores singulares distintos de cero.

Para ver la relación con el PCA, supongamos una matriz de datos  $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n \times m}$  que ha sido previamente centrada, es decir, la media de cada columna es cero. La matriz de covarianza se calcula como:

$$\mathbf{C} = \mathbf{X}^T \mathbf{X}. \quad (1.3)$$

Si usamos la SVD de  $\mathbf{X} = \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^T$  y la propiedad de ortonormalidad de  $\mathbf{U}$  y  $\mathbf{V}$ , obtenemos:

$$\mathbf{C} = \mathbf{V}\mathbf{\Sigma}\mathbf{U}^T\mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^T = \mathbf{V}\mathbf{\Sigma}^2\mathbf{V}^T, \quad (1.4)$$

es decir,  $\mathbf{\Sigma}$  y  $\mathbf{V}$  son la solución del siguiente problema de autovalores:

$$\mathbf{C}\mathbf{V} = \mathbf{V}\mathbf{\Sigma}^2. \quad (1.5)$$

En otras palabras, cada valor singular distinto de cero de  $\mathbf{X}$  es la raíz cuadrada positiva de los autovalores de su matriz de covarianza, y las columnas de  $\mathbf{V}$  son los autovectores. En términos del PCA, las columnas de  $\mathbf{V}$  son las componentes principales de  $\mathbf{X}$  y los elementos de la diagonal de  $\mathbf{\Sigma}^2$  representan la varianza de los datos en cada una de las componente.

Esta es la manera usual en la que los algoritmo actuales realizan el PCA, por ejemplo, la librería scikit-learn de Python [16]. En general, nosotros preferimos usar directamente SVD para hacer el PCA, ya que brinda mayor flexibilidad y control. Por ejemplo, si en lugar usar una matriz de media cero, los datos se centran en el valor medio de un subconjunto, las componentes principales van a indicar la dirección en la cual hay más dispersión respecto a este subconjunto.

Una ventaja significativa de este método para realizar el PCA, es que se obtiene las componentes principales directamente, sin tener que calcular la matriz de covarianza. Esto permite ahorrar tiempo y recursos computacionales, algo que toma mayor importancia en la medida que aumenta la cantidad de datos y el números de variables a procesar.

# Capítulo 2

## Chapter 2

### 2.1. The N + GB + EA diagram

Nuestro punto de partida es el diagrama de los datos de expresión genética del análisis de componentes principales para la materia blanca del cerebro, mostrado en la Fig. 2.1. Como se puede notar en la figura, las dos primeras componentes principales capturan más del 80 % de la varianza del sistema. Por lo tanto, es una representación bidimensional adecuada de la distribución real de los puntos en el espacio de expresión genética.

En la figura se pueden apreciar 4 grupos de muestras. Las muestras marcadas como N y GB corresponden, a especímenes patológicamente normales y tumorales en los datos del Atlas del Genoma del Cáncer (TCGA, <https://www.cancer.gov/tcga>) para el Glioblastoma [17]. Estas son tomadas durante procedimientos quirúrgicos. Los tumores se pueden localizar en diferente zonas cerebrales pero, como es común en el Glioblastoma, estos son tumores tomados de la sustancia blanca del cerebro [18]. Los centros de las nubes de muestras de N y GB en el espacio de expresión genética definen, respectivamente, los atractores Normal (homeostático) y Glioblastoma de Kauffman [19,20]. De hecho, la acumulación de puntos en una determinada región de este espacio indica que esta es un atractor de la Red de regulación Genética que gobierna la dinámica del sistema.

Hay 5 muestras N de pacientes con edades en el rango entre 49 y 74 años, mientras que el intervalo de edades de las 169 muestras de GB es entre 21 y 89 años. Las pacientes femeninas representan aproximadamente dos tercios de la cohorte.




Figura 2.1: Análisis de componentes principales para los datos de expresión genética.

Por otro lado, los grupos etiquetados como EA y O corresponden a las muestras de la materia blanca del cerebro de la enfermedad del Alzheimer y del grupo de control (*old*) en el estudio longitudinal del Instituto Allen sobre envejecimiento y la demencia (<https://aging.brain-map.org/>) [21]. Las muestras son tomadas *post mortem*. El grupo O está conformado por 47 muestras, mientras que en el grupo EA hay 28. El intervalo de edad para todas estas muestras es entre 77 y 101 años. El diagnóstico de la EA está respaldado por pruebas cognitivas y otras pruebas clínicas. Alrededor del 40 % de la cohorte son mujeres.

La Fig. 2.2 es una reconstrucción de la figura 3 de la referencia [22]. En esta se muestra los resultados del PCA para los datos de expresión genética de la materia blanca del cerebro del Instituto Allen. La primera componente principal (PC1), la cual contiene el 24,7 % de la varianza total, discrimina entre las muestra de O y EA. La posición del centro de la nube de

O en este eje es  $\langle x_1 \rangle = 0$ , y para la EA es  $\langle x_1 \rangle = 40,97$ . Sin embargo, los radios de las nubes de las muestras de O y EA son más grandes que la distancia entre los centros, que son 80,69 y 72,64 respectivamente.




Figura 2.2: Figura tomada de la referencia [22].

Es bien conocido el papel de la edad en la EA, especialmente en ancianos [23]. Por lo tanto, podemos usar la edad como una variable de tiempo para seguir la transición. A pesar del número relativamente pequeño de muestras, se realizó un análisis de regresión lineal de la posición media de  $\langle x_1 \rangle$  en función de la edad en las muestras de O, Fig. 2.3a, muestra que  $\langle x_1 \rangle = -287,12 + 3,24 \cdot edad$ . En las muestras de la EA, sin embargo, no se encontró correlación entre  $\langle x_1 \rangle$  y la edad observada. Por lo tanto, la posición de la zona EA es aproximadamente fija, y la nube de muestras de O muestra una deriva hacia el mínimo de EA a medida que aumenta la edad.

Una mejor ilustración de este hecho viene representada en la Fig. 2.4, donde se compara la densidad de probabilidad de las muestras de O y de la EA. Se definen cuatro intervalos de edades, que contienen aproximadamente la misma cantidad de muestras de O: [77, 84], [84, 90], [90, 95], [95, 100+]. La probabilidad total de las muestras de la EA es mostrada en los cuatro paneles. Es aparente un desplazamiento de las muestras de O hacia la zona de la EA.

Esta propiedad sugiere que el centro de la nube de muestras de la EA define un atractor en el espacio de expresión genética. Las muestras de O parecen ser atrapadas por el atractor de la EA en el proceso del envejecimiento.






Figura 2.3: Figura tomada de la referencia [22]




Figura 2.4: Densidad de probabilidad de las muestras de O y de la EA a lo largo del eje de PC1. Cada panel es para un intervalo de edad para las muestras de O. La probabilidad de la EA, la cual es aproximadamente independiente de la edad, es mostrada en los cuatro paneles. Figura tomada de la referencia [22]

## Capítulo 3

## Chapter 3

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetur at, consectetur sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui.

# Conclusiones

Etiam euismod. Fusce facilisis lacinia dui. Suspendisse potenti. In mi erat, cursus id, nummy sed, ullamcorper eget, sapien. Praesent pretium, magna in eleifend egestas, pede pede pretium lorem, quis consectetur tortor sapien facilisis magna. Mauris quis magna varius nulla scelerisque imperdiet. Aliquam non quam. Aliquam porttitor quam a lacus. Praesent vel arcu ut tortor cursus volutpat. In vitae pede quis diam bibendum placerat. Fusce elementum convallis neque. Sed dolor orci, scelerisque ac, dapibus nec, ultricies ut, mi. Duis nec dui quis leo sagittis commodo.

Aliquam lectus. Vivamus leo. Quisque ornare tellus ullamcorper nulla. Mauris porttitor pharetra tortor. Sed fringilla justo sed mauris. Mauris tellus. Sed non leo. Nullam elementum, magna in cursus sodales, augue est scelerisque sapien, venenatis congue nulla arcu et pede. Ut suscipit enim vel sapien. Donec congue. Maecenas urna mi, suscipit in, placerat ut, vestibulum ut, massa. Fusce ultrices nulla et nisl.

# Recomendaciones

Etiam ac leo a risus tristique nonummy. Donec dignissim tincidunt nulla. Vestibulum rhoncus molestie odio. Sed lobortis, justo et pretium lobortis, mauris turpis condimentum augue, nec ultricies nibh arcu pretium enim. Nunc purus neque, placerat id, imperdiet sed, pellentesque nec, nisl. Vestibulum imperdiet neque non sem accumsan laoreet. In hac habitasse platea dictumst. Etiam condimentum facilisis libero. Suspendisse in elit quis nisl aliquam dapibus. Pellentesque auctor sapien. Sed egestas sapien nec lectus. Pellentesque vel dui vel neque bibendum viverra. Aliquam porttitor nisl nec pede. Proin mattis libero vel turpis. Donec rutrum mauris et libero. Proin euismod porta felis. Nam lobortis, metus quis elementum commodo, nunc lectus elementum mauris, eget vulputate ligula tellus eu neque. Vivamus eu dolor.

Nulla in ipsum. Praesent eros nulla, congue vitae, euismod ut, commodo a, wisi. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aenean nonummy magna non leo. Sed felis erat, ullamcorper in, dictum non, ultricies ut, lectus. Proin vel arcu a odio lobortis euismod. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Proin ut est. Aliquam odio. Pellentesque massa turpis, cursus eu, euismod nec, tempor congue, nulla. Duis viverra gravida mauris. Cras tincidunt. Curabitur eros ligula, varius ut, pulvinar in, cursus faucibus, augue.

# Bibliografía

- [1] S. Wright, “The roles of mutation, inbreeding, crossbreeding and selection in evolution,” in *Proceedings of the sixth international congress of Genetics*, vol. 1, pp. 356–366, 1932.
- [2] M. J. Casey, P. S. Stumpf, and B. D. MacArthur, “Theory of cell fate,” *WIREs Systems Biology and Medicine*, vol. 12, p. e1471, Dec. 2019.
- [3] S.-M. Ou, Y.-J. Lee, Y.-W. Hu, C.-J. Liu, T.-J. Chen, J.-L. Fuh, and S.-J. Wang, “Does alzheimer’s disease protect against cancers? a nationwide population-based study,” *Neuroepidemiology*, vol. 40, pp. 42–49, Oct. 2012.
- [4] C. M. Roe, A. L. Fitzpatrick, C. Xiong, W. Sieh, L. Kuller, J. P. Miller, M. M. Williams, R. Kopan, M. I. Behrens, and J. C. Morris, “Cancer linked to alzheimer disease but not vascular dementia,” *Neurology*, vol. 74, pp. 106–112, Jan. 2010.
- [5] J. A. Driver, A. Beiser, R. Au, B. E. Kreger, G. L. Splansky, T. Kurth, D. P. Kiel, K. P. Lu, S. Seshadri, and P. A. Wolf, “Inverse association between cancer and alzheimer’s disease: results from the framingham heart study,” *BMJ*, vol. 344, pp. e1442–e1442, Mar. 2012.
- [6] M. Musicco, F. Adorni, S. Di Santo, F. Prinelli, C. Pettenati, C. Caltagirone, K. Palmer, and A. Russo, “Inverse occurrence of cancer and alzheimer disease: A population-based incidence study,” *Neurology*, vol. 81, pp. 322–328, July 2013.
- [7] T. Liu, D. Ren, X. Zhu, Z. Yin, G. Jin, Z. Zhao, D. Robinson, X. Li, K. Wong, K. Cui, H. Zhao, and S. T. C. Wong, “Transcriptional signaling pathways inversely regulated in alzheimer’s disease and glioblastoma multiform,” *Scientific Reports*, vol. 3, Dec. 2013.
- [8] C. Lanni, M. Masi, M. Racchi, and S. Govoni, “Cancer and alzheimer’s disease inverse relationship: an age-associated diverging derailment of shared pathways,” *Molecular Psychiatry*, vol. 26, pp. 280–295, May 2020.
- [9] J. A. Driver and K. Ping Lu, “Pin1: A new genetic link between alzheimers disease, cancer and aging,” *Current Aging Science*, vol. 3, pp. 158–165, Dec. 2010.

- [10] J. P. Magalhães, “Programmatic features of aging originating in development: aging mechanisms beyond molecular damage?,” *The FASEB Journal*, vol. 26, pp. 4821–4826, Sept. 2012.
- [11] D. Gems, “The hyperfunction theory: An emerging paradigm for the biology of aging,” *Ageing Research Reviews*, vol. 74, p. 101557, Feb. 2022.
- [12] G. Choe, J. K. Park, L. Jouben-Steele, T. J. Kremen, L. M. Liau, H. V. Vinters, T. F. Cloughesy, and P. S. Mischel, “Active matrix metalloproteinase 9 expression is associated with primary glioblastoma subtype1,” *Clinical Cancer Research*, vol. 8, pp. 2894–2901, 09 2002.
- [13] Q. Xue, L. Cao, X.-Y. Chen, J. Zhao, L. Gao, S.-Z. Li, and Z. Fei, “High expression of mmp9 in glioma affects cell proliferation and is associated with patient survival rates,” *Oncology Letters*, vol. 13, pp. 1325–1330, Jan. 2017.
- [14] A. Kaminari, N. Giannakas, A. Tzinia, and E. C. Tsilibary, “Overexpression of matrix metalloproteinase-9 (mmp-9) rescues insulin-mediated impairment in the 5xfad model of alzheimer’s disease,” *Scientific Reports*, vol. 7, Apr. 2017.
- [15] J. Lever, M. Krzywinski, and N. Altman, “Principal component analysis,” *Nature Methods*, vol. 14, pp. 641–642, 7 2017.
- [16] F. Pedregosa, G. Varoquaux, A. Gramfort, V. Michel, B. Thirion, O. Grisel, M. Blondel, P. Prettenhofer, R. Weiss, V. Dubourg, J. Vanderplas, A. Passos, D. Cournapeau, M. Brucher, M. Perrot, and E. Duchesnay, “Scikit-learn: Machine learning in Python,” *Journal of Machine Learning Research*, vol. 12, pp. 2825–2830, 2011.
- [17] C. Brennan, R. Verhaak, A. McKenna, B. Campos, H. Nounshmehr, S. Salama, S. Zheng, D. Chakravarty, J. Sanborn, S. Berman, R. Beroukhim, B. Bernard, C.-J. Wu, G. Genovese, I. Shmulevich, J. Barnholtz-Sloan, L. Zou, R. Vegesna, S. Shukla, G. Ciriello, W. Yung, W. Zhang, C. Sougnez, T. Mikkelsen, K. Aldape, D. Bigner, E. Van Meir, M. Prados, A. Sloan, K. Black, J. Eschbacher, G. Finocchiaro, W. Friedman, D. Andrews, A. Guha, M. Iacocca, B. O’Neill, G. Foltz, J. Myers, D. Weisenberger, R. Penny, R. Kucherlapati, C. Perou, D. Hayes, R. Gibbs, M. Marra, G. Mills, E. Lander, P. Spellman, R. Wilson, C. Sander, J. Weinstein, M. Meyerson, S. Gabriel, P. Laird, D. Haussler, G. Getz, L. Chin, C. Benz, J. Barnholtz-Sloan, W. Barrett, Q. Ostrom, Y. Wolinsky, K. Black, B. Bose, P. Boulos, M. Boulos, J. Brown, C. Czerinski, M. Eppley, M. Iacocca, T. Kempista, T. Kitko, Y. Koyfman, B. Rabeno, P. Rastogi, M. Sugarman, P. Swanson, K. Yalamanchii, I. Otey, Y. Liu, Y. Xiao, J. Auman, P.-C. Chen, A. Hadjipanayis, E. Lee, S. Lee, P. Park, J. Seidman, L. Yang, R. Kucherlapati, S. Kalkanis, T. Mikkelsen, L. Poisson, A. Raghunathan, L. Scarpacci, B. Bernard, R. Bressler, A. Eakin, L. Iype,

- R. Kreisberg, K. Leinonen, S. Reynolds, H. Rovira, V. Thorsson, I. Shmulevich, M. Annala, R. Penny, J. Paulauskis, E. Curley, M. Hatfield, D. Mallery, S. Morris, T. Shelton, C. Shelton, M. Sherman, P. Yena, L. Cuppini, F. DiMeco, M. Eoli, G. Finocchiario, E. Maderna, B. Pollo, M. Saini, S. Balu, K. Hoadley, L. Li, C. Miller, Y. Shi, M. Topal, J. Wu, G. Dunn, C. Giannini, B. O'Neill, B. Aksoy, Y. Antipin, L. Borsu, S. Berman, C. Brennan, E. Cerami, D. Chakravarty, G. Ciriello, J. Gao, B. Gross, A. Jacobsen, M. Ladanyi, A. Lash, Y. Liang, B. Reva, C. Sander, N. Schultz, R. Shen, N. Socci, A. Viale, M. Ferguson, Q.-R. Chen, J. Demchok, L. Dillon, K. Shaw, M. Sheth, R. Tarnuzzer, Z. Wang, L. Yang, T. Davidsen, M. Guyer, B. Ozenberger, H. Sofia, J. Bergsten, J. Eckman, J. Harr, J. Myers, C. Smith, K. Tucker, C. Winemiller, L. Zach, J. Ljubimova, G. Eley, B. Ayala, M. Jensen, A. Kahn, T. Pihl, D. Pot, Y. Wan, J. Eschbacher, G. Foltz, N. Hansen, P. Hothi, B. Lin, N. Shah, J.-g. Yoon, C. Lau, M. Berens, K. Ardlie, R. Beroukhim, S. Carter, A. Cherniack, M. Noble, J. Cho, K. Cibulskis, D. DiCara, S. Frazer, S. Gabriel, N. Gehlenborg, J. Gentry, D. Heiman, J. Kim, R. Jing, E. Lander, M. Lawrence, P. Lin, W. Mallard, M. Meyerson, R. Onofrio, G. Saksena, S. Schumacher, C. Sougnez, P. Stojanov, B. Tabak, D. Voet, H. Zhang, L. Zou, G. Getz, N. Dees, L. Ding, L. Fulton, R. Fulton, K.-L. Kanchi, E. Mardis, R. Wilson, S. Baylin, D. Andrews, L. Harshyne, M. Cohen, K. Devine, A. Sloan, S. VandenBerg, M. Berger, M. Prados, D. Carlin, B. Craft, K. Ellrott, M. Goldman, T. Goldstein, M. Grifford, D. Haussler, S. Ma, S. Ng, S. Salama, J. Sanborn, J. Stuart, T. Swatloski, P. Waltman, J. Zhu, R. Foss, B. Frentzen, W. Friedman, R. McTiernan, A. Yachnis, D. Hayes, C. Perou, S. Zheng, R. Vegesna, Y. Mao, R. Akbani, K. Aldape, O. Bogler, G. Fuller, W. Liu, Y. Liu, Y. Lu, G. Mills, A. Protodopov, X. Ren, Y. Sun, C.-J. Wu, W. Yung, W. Zhang, J. Zhang, K. Chen, J. Weinstein, L. Chin, R. Verhaak, H. Nouchmehr, D. Weisenberger, M. Bootwalla, P. Lai, T. Triche, D. Van Den Berg, P. Laird, D. Gutmann, N. Lehman, E. VanMeir, D. Brat, J. Olson, G. Mastrogiannakis, N. Devi, Z. Zhang, D. Bigner, E. Lipp, and R. McLendon, "The somatic genomic landscape of glioblastoma," *Cell*, vol. 155, pp. 462–477, Oct. 2013.
- [18] B. Ellingson, A. Lai, R. Harris, J. Selfridge, W. Yong, K. Das, W. Pope, P. Nghiemphu, H. Vinters, L. Liau, *et al.*, "Probabilistic radiographic atlas of glioblastoma phenotypes," *American Journal of neuroradiology*, vol. 34, no. 3, pp. 533–540, 2013.
- [19] S. Huang, I. Ernberg, and S. Kauffman, "Cancer attractors: A systems view of tumors from a gene network dynamics and developmental perspective," *Seminars in Cell & Developmental Biology*, vol. 20, pp. 869–876, Sept. 2009.
- [20] A. Gonzalez, D. A. Leon, Y. Perera, and R. Perez, "On the gene expression landscape of cancer," *PLOS ONE*, vol. 18, p. e0277786, Feb. 2023.
- [21] J. A. Miller, A. Guillozet-Bongaarts, L. E. Gibbons, N. Postupna, A. Renz, A. E. Beller, S. M. Sunkin, L. Ng, S. E. Rose, K. A. Smith, A. Szafer, C. Barber, D. Bertagnolli, K. Bic-

- kley, K. Brouner, S. Caldejon, M. Chapin, M. L. Chua, N. M. Coleman, E. Cudaback, C. Cuhacian, R. A. Dalley, N. Dee, T. Desta, T. A. Dolbeare, N. I. Dotson, M. Fisher, N. Gaudreault, G. Gee, T. L. Gilbert, J. Goldy, F. Griffin, C. Habel, Z. Haradon, N. Hejazinia, L. L. Hellstern, S. Horvath, K. Howard, R. Howard, J. Johal, N. L. Jorstad, S. R. Josephsen, C. L. Kuan, F. Lai, E. Lee, F. Lee, T. Lemon, X. Li, D. A. Marshall, J. Melchor, S. Mukherjee, J. Nyhus, J. Pendergraft, L. Potekhina, E. Y. Rha, S. Rice, D. Rosen, A. Sapru, A. Schantz, E. Shen, E. Sherfield, S. Shi, A. J. Sodt, N. Thatra, M. Tieu, A. M. Wilson, T. J. Montine, E. B. Larson, A. Bernard, P. K. Crane, R. G. Ellenbogen, C. D. Keene, and E. Lein, “Neuropathological and transcriptomic characteristics of the aged brain,” *eLife*, vol. 6, Nov. 2017.
- [22] A. Gonzalez, J. Nieves, D. A. Leon, M. L. Bringas Vega, and P. V. Sosa, “Gene expression rearrangements denoting changes in the biological state,” *Scientific Reports*, vol. 11, Apr. 2021.
- [23] “2019 alzheimer’s disease facts and figures,” *Alzheimer’s & Dementia*, vol. 15, pp. 321–387, Mar. 2019.