## Deures 14/02/2020

## Joan Pau Condal Marco

25 de febrer de 2020

## **Enunciat:**

Es sap que si  $\langle B_1 \rangle = \langle B_2 \rangle$  i  $\#B_1 < \#B_2$ , aleshores  $B_2$  és linealment dependent. Prova que si  $B_1$  i  $B_2$  són bases de F, aleshores  $\#B_1 = \#B_2$ .

## Demostració:

Per demostrar la proposició anterior, utilitzarem el metode de reducció a l'absurd; per tant, suposarem que si  $B_1$  i  $B_2$  són base de F, aleshores  $\#B_1 \neq \#B_2$ . Per la designaltat anterior, obtenim dos casos a demostrar:

1. 
$$\#B_1 < \#B_2$$
:

Si  $\#B_1 < \#B_2$ , sabem que aleshores  $B_2$  és linealment dependent, afirmació que va en contra de la nostra hipótesis inicial i per tant arribem a una **contradicció**.

**2.** 
$$\#B_1 > \#B_2$$
:

Si  $\#B_1 < \#B_2$ , sabem que aleshores  $B_1$  és linealment dependent, afirmació que va en contra de la nostra hipótesis inicial i per tant arribem a una segona **contradicció**.

Per tant, podem afirmar que si  $B_1$  i  $B_2$  són bases de F,  $\#B_1 = \#B_2$ .