

Resultados — Determinantes e previsão do peso de VALE3 nos fundos Itaú (2016–2021)

TCC — FGV EESP

Orientador: Prof. Maurício Ferraresi Jr.

26 de junho de 2026

1 Objetivo e amostra

Modelamos o **peso de VALE3** (participação na carteira, fração em $[0, 1]$) em cada fundo da gestora Itaú, mês a mês. Os coeficientes da regressão transversal funcionam como um **fator latente** θ_t que resume como as posições dependem das características; depois modelamos a dinâmica de θ_t e prevemos.

Amostra: painel fundo $\times$ mês, **2016–2021** (72 meses), gestoras Itaú (Asset Management, DTVM, Unibanco), com mais de 3 cotistas (sem fundos exclusivos): **11.532** observações (11.413 com fluxo) e **623** fundos.

2 Variáveis e tratamentos

Variável	Definição	Tratamento
$w_{i,t}$ (alvo)	peso de VALE3 na carteira (fração)	nível
AUM	patrimônio líquido (R\$)	log
n ^o cotistas	número de cotistas	log
FIC	1 se Fundo de Inv. em Cotas, 0 se FI	dummy
Fluxo/AUM	(captação – resgate) do mês / AUM	razão
Preço	fechamento VALE3 no último pregão do mês anterior	nível (R\$, nominal)
Beta	beta móvel 252 pregões vs. Ibovespa	nível

3 Modelo 1 — Cross-section mês a mês (Fama–MacBeth)

Para *cada mês* t , estimamos por MQO:

$$w_{i,t} = \alpha_t + \beta_t^1 \ln(\text{AUM}_{i,t}) + \beta_t^2 \ln(\text{Cot}_{i,t}) + \beta_t^3 \text{FIC}_i + \beta_t^4 \left(\frac{\text{Fluxo}}{\text{AUM}} \right)_{i,t} + \varepsilon_{i,t}. \quad (1)$$

Isso gera $T = 72$ vetores $\theta_t = (\alpha_t, \beta_t^1, \dots, \beta_t^4)$. O resumo de Fama–MacBeth toma a média no tempo e o erro-padrão da variação entre meses:

$$\hat{\beta}^k = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \beta_t^k, \quad \text{ep}(\hat{\beta}^k) = \frac{\text{dp}(\beta_t^k)}{\sqrt{T}}, \quad t = \frac{\hat{\beta}^k}{\text{ep}(\hat{\beta}^k)}. \quad (2)$$

R^2 médio por mês = 0,152. *** $p < 0,001$. Leitura: fundo maior $\rightarrow$ menos VALE3 (logAUM $-$); mais cotistas $\rightarrow$ mais (+); FIC $\rightarrow$ menos posição direta ($-$); fluxo não explica o *nível*. Sinais idênticos nos 72 meses $\Rightarrow$ fatores estáveis.

Variável	Coef. médio	EP (FM)	t	p	Meses +	Sig.
Intercepto	0,08939	0,00413	21,6	< 0,001	72/72	***
log(AUM)	-0,00376	0,00019	-19,3	< 0,001	0/72	***
log(cotistas)	0,00387	0,00020	19,8	< 0,001	72/72	***
FIC (dummy)	-0,01697	0,00089	-19,2	< 0,001	0/72	***
Fluxo/AUM	-0,00044	0,00309	-0,14	0,886	39/72	n.s.

4 Modelo 2 — Pooled (com preço e beta)

Empilhando os 72 meses, preço e beta (constantes *dentro* de um mês) passam a ser identificados pela variação *entre* meses:

$$w_{i,t} = \alpha + \beta^1 \ln \text{AUM} + \beta^2 \ln \text{Cot} + \beta^3 \text{FIC} + \beta^4 \frac{\text{Fluxo}}{\text{AUM}} + \beta^5 \text{Preço}_t + \beta^6 \text{Beta}_t + \varepsilon_{i,t}. \quad (3)$$

Variável	Estimativa	EP	t	p	Sig.
Intercepto	0,10361	0,00407	25,4	< 0,001	***
log(AUM)	-0,00353	0,00019	-19,0	< 0,001	***
log(cotistas)	0,00390	0,00013	31,0	< 0,001	***
FIC (dummy)	-0,01674	0,00079	-21,1	< 0,001	***
Fluxo/AUM	-0,00033	0,00034	-0,99	0,324	n.s.
Preço VALE3	0,000149	0,000016	9,2	< 0,001	***
Beta VALE3	-0,02368	0,00142	-16,7	< 0,001	***

$R^2 = 0,164$; $n = 11.413$. Preço + (VALE3 cara $\rightarrow$ peso médio maior); Beta - (VALE3 mais arriscada $\rightarrow$ peso menor, aversão a risco). Com 72 meses o beta é claramente negativo; no piloto de 12 meses (2016) saía positivo e fraco — confirmando que 12 pontos eram poucos.

Como o beta é calculado. Não usamos um beta “pronto”. Com retornos diários simples $r_s = P_s/P_{s-1} - 1$ (VALE3 pelo preço ajustado; Ibovespa pelo fechamento), o beta no dia t é a covariância sobre a variância numa janela móvel de 252 pregões:

$$\beta_t = \frac{\text{Cov}(r^{\text{VALE}}, r^{\text{Ibov}})}{\text{Var}(r^{\text{Ibov}})} \quad \text{sobre } s \in \{t - 251, \dots, t\}. \quad (4)$$

5 Passo 2 — dinâmica dos fatores θ_t

Caracterizamos como cada coeficiente evolui. Modelo AR(1) e passeio aleatório:

$$\text{AR}(1): \quad \theta_{k,t} = c_k + \phi_k \theta_{k,t-1} + \eta_{k,t}; \quad \text{Random walk:} \quad \theta_{k,t} = \theta_{k,t-1} + \eta_{k,t}. \quad (5)$$


DF $t < -2,9$ rejeita raiz unitária ($\approx 5\%$) $\Rightarrow$ estacionário. Os fatores são persistentes mas **revertem à média** ($\phi \approx 0,7-0,84$, não ≈ 1): não são passeios aleatórios puros.

6 Modelo 3 — Previsão do peso e matriz de erros

Prevemos $w_{i,t}$ um mês à frente aplicando o *vetor de coeficientes previsto* às características do fundo:

$$\hat{w}_{i,t} = \hat{\theta}_t' x_{i,t}, \quad \hat{\theta}_t = \begin{cases} \theta_{t-1} & (\text{random walk}) \\ \hat{c} + \hat{\phi} \theta_{t-1} & (\text{AR}(1)), \end{cases} \quad (6)$$

Série (θ_t)	média	autocorr.(1)	ϕ (AR1)	DF t	Leitura
Intercepto	0,0894	0,77	0,77	-3,07	reverte à média
log(AUM)	-0,0038	0,76	0,76	-3,11	reverte à média
log(cotistas)	0,0039	0,84	0,83	-2,70	quase random walk
FIC	-0,0170	0,70	0,70	-3,57	reverte à média
Fluxo/AUM	-0,0004	0,37	0,38	-5,59	quase ruído



Coefficientes θ_t (2016–2021); tracejado = média.

contra o *benchmark ingênuo* $\hat{w}_{i,t} = w_{i,t-1}$ (peso do próprio fundo no mês anterior). A **matriz de erros** é $e_{i,t} = w_{i,t} - \hat{w}_{i,t}$. Avaliação pseudo-fora-da-amostra (60 meses, 9.804 obs):

Método de previsão	RMSE	MAE
Fator + random walk	0,0340	0,0256
Fator + AR(1)	0,0337	0,0253
Ingênuo (peso defasado)	0,0159	0,0083

Matriz de erros (Fator+AR1): média $\approx 0,0024$ (≈ 0 , como esperado por MQO); desvio-padrão 0,0336; a média mensal do erro é estacionária (DF $t = -7,6$).

Interpretação

- O **benchmark ingênuo vence**: o peso é *muito persistente no nível do fundo* (a posição “âncora”). O modelo de fator é forte para **explicar** a seção transversal (quais características importam), mas não bate a inércia do próprio fundo para **prever**.

- A matriz de erros tem média ≈ 0 e é estacionária — propriedades que o orientador queria verificar.

7 Modelo 4 — Efeito-fixo de fundo e filtro de Kalman

Testamos o refino natural: somar ao fator um **efeito-fixo de fundo** μ_i (o nível próprio de cada fundo) e prever os fatores por **filtro de Kalman** (local-level, estado-espço estimado por máxima verossimilhança). Comparamos também um modelo que prevê a *variação* Δw a partir das características (incl. fluxo). Avaliação pseudo-fora-da-amostra (9.532 previsões):

Método	RMSE	MAE
M0 Ingênuo (peso defasado)	0,0159	0,0083
M1 Efeito-fixo (μ_i , média)	0,0247	0,0153
M2 FE + Fator (Kalman)	0,0265	0,0162
M3 Variação Δw (com fluxo)	0,0160	0,0084

Conclusão (e o que ela ensina)

- **O ingênuo continua vencendo** — nem o efeito-fixo, nem o Kalman, nem o modelo da variação o superam.
- **O efeito-fixo (média) é pior que o lag:** logo, o peso *não reverte à média no nível do fundo* — ele é **persistente, quase um passeio aleatório** (o último valor prevê melhor que a média histórica).
- **O modelo da variação Δw apenas empata com o ingênuo:** a *mudança* do peso é **essencialmente imprevisível** um mês à frente (nem o fluxo a antecipa de forma útil).
- **Síntese:** o peso de VALE3 é, no nível do fundo, quase um martingale. O modelo de fator é uma ferramenta de **compreensão** (quais características explicam a seção transversal das posições), e não de previsão de curto prazo — a inércia do próprio fundo é o teto prático. A matriz de erros do melhor modelo tem média ≈ 0 (0,0002) e é estacionária (DF $t = -8,7$).

8 Modelo 5 — Opacidade de 90 dias (horizonte de 3 meses)

Os fundos divulgam a carteira com **defasagem trimestral**: em t só se enxerga o peso de ≈ 90 dias atrás. Saber o peso *atual* equivale a **prever $t + 3$ com informação de t** . Refizemos a comparação de previsão para os horizontes $h = 1$ (o que fazíamos) e $h = 3$ (opacidade), com os mesmos modelos. A parte de *explicação* (Modelos 1–2) não muda, por ser contemporânea.

Horizonte	M0 Ingênuo	M1 FE	M2 FE+Kalman	M3 Δw
$h = 1$ (prever $t + 1$)	0,0156	0,0240	0,0255	0,0156
$h = 3$ (opacidade de 90 dias)	0,0207	0,0262	0,0273	0,0210

RMSE da previsão fora da amostra (info até t).

Interpretação

- A 3 meses, o **ingênuo piora** ($0,0156 \rightarrow 0,0207$, $+33\%$) — o peso de 3 meses atrás é um preditor mais defasado — e a *distância* para os modelos estruturais **encolhe**.
- Mesmo assim, o **ingênuo ainda vence** a $h = 3$ ($0,0207 < 0,0262$). O peso é tão persistente que, sob a opacidade trimestral, o último valor divulgado ainda bate a média histórica e os fatores. A conclusão de que o peso é quase um martingale se mantém.

9 Modelo 6 — Margem extensiva (ter ou não ter VALE3)

Até aqui estudamos o peso *dado que* o fundo tem VALE3 (margem intensiva). A **margem extensiva** é a decisão de *ter ou não*. Construímos um painel que inclui os **zeros**: todos os fundo-meses de **Ações** da Itaú (vivos na SH), com peso = participação na CONS ou 0 se o fundo não tem VALE3 (não detém).

Universo: 10.286 fundo-meses, 260 fundos de Ações. **86%** têm VALE3 (subindo de 81% em 2016 a 89% em 2021); 75 entradas e 100 saídas no período. A posse é **muito persistente**: muda em só 1,3% dos meses.

O que explica *ter VALE3* (logit).

$$\Pr(\text{tem VALE3}_{i,t} = 1) = \Lambda(\gamma_0 + \gamma_1 \ln \text{AUM} + \gamma_2 \ln \text{Cot} + \gamma_3 \text{FIC}), \quad \Lambda(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}. \quad (7)$$

Variável	Estimativa	z	p	Sig.
Intercepto	−2,809	−10,2	< 0,001	***
ln(AUM)	0,232	15,1	< 0,001	***
ln(cotistas)	−0,034	−2,8	0,005	**
FIC	1,311	17,5	< 0,001	***

Característica	Ter ou não (extensiva)	Quanto (intensiva)
Tamanho (AUM)	+ mais provável ter	− peso menor
FIC	+ mais provável ter	− peso menor
Cotistas	− (fraco)	+

Achado central: as duas margens têm sinais opostos. Fundos **maiores** e **FICs** são *mais propensos a ter* VALE3, porém com *peso menor* — o padrão de **diversificação** (espalham por muitas ações, incluindo VALE3, cada uma com fatia pequena).

Prever entrar/sair: a persistência de novo. Prevendo a posse 1 mês à frente (fora da amostra): o **ingênuo** (repetir o estado do mês anterior) acerta **98,7%**; o **logit** (características), **87,5%**. Como na margem intensiva, as características **explicam** bem mas **não superam a persistência** para prever. Tanto *ter ou não* quanto *quanto* são quase martingales.