

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ
CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA

Geodésicas e o Teorema de Hopf-Rinow na Geometria Riemanniana

João Paulo Chiari de Gasperi

Welinton Anderson Rocha

Roger Emanuel Moraes Pezzott

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como
requisito parcial para obtenção do título de
Licenciado em Matemática.

Campo Mourão

2026

Sumário

1	Introdução	1
2	Preliminares	2
2.1	Variedades diferenciáveis e Diferenciabilidade	2
2.2	Construção de Variedades	14
2.3	Orientabilidade	16
2.4	Campos de Vetores	19
3	Métricas e Conexões Afins	28
3.1	Métricas Riemannianas	28
3.2	Conexões Afins	34

Capítulo 1

Introdução

PLACEHOLDER CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO HISTÓRICA BLA BLA BLA

Capítulo 2

Preliminares

2.1 Variedades diferenciáveis e Diferenciabilidade

Começaremos por apresentar alguns conceitos fundamentais da Topologia Diferencial, os quais serão indispensáveis para o texto.

O primeiro deles, que é o principal objeto de estudo da Topologia Diferencial e serve como uma generalização das superfícies contidas em $\mathbb{R}^3$, é o conceito de variedade diferenciável. De forma análoga a superfícies, uma variedade diferenciável é um conjunto que se comporta localmente como o espaço euclidiano $\mathbb{R}^n$. A definição formal desse conceito é a seguinte:


Definição 2.1. Uma variedade diferenciável de dimensão n é um conjunto M , e uma família $\{(U_\alpha, \mathbf{x}_\alpha)\}$, onde os U_α são abertos do $\mathbb{R}^n$, e $\mathbf{x}_\alpha : U_\alpha \rightarrow M$ são bijeções, satisfazendo:

1. $\cup_\alpha \mathbf{x}_\alpha(U_\alpha) = M$
2. Se α e β são índices, tais que $\mathbf{x}_\alpha(U_\alpha) \cap \mathbf{x}_\beta(U_\beta) = W \neq \emptyset$ e $\mathbf{x}_\alpha^{-1}(W)$ e $\mathbf{x}_\beta^{-1}(W)$ são abertos do $\mathbb{R}^n$, então $\mathbf{x}_\beta^{-1} \circ \mathbf{x}_\alpha|_{\mathbf{x}_\alpha^{-1}(W)}$ é uma função diferenciável.
3. A família $\{(U_\alpha, \mathbf{x}_\alpha)\}$ é maximal relativamente às condições 1) e 2).

Uma família $\{(V_\alpha, \mathbf{y}_\alpha)\}$ satisfazendo 1) e 2) (não necessariamente maximal) é chamada de estrutura diferencial de M . Note aqui que tal família é compatível com a família maximal de M , isto é, $\{(V_\alpha, \mathbf{y}_\alpha)\} \subset \{(U_\alpha, \mathbf{x}_\alpha)\}$.

Vale a pena comentar que o terceiro item acima existe por motivos técnicos. Por exemplo, normalmente é conveniente, tomando uma parametrização $\mathbf{x} : U \rightarrow M$, restringi-la a um aberto $\bar{U} \subset U$. O terceiro item garante que $\bar{\mathbf{x}} = \mathbf{x}|_{\bar{U}}$ pertence a coleção de parametrizações. Em contrapartida, para construir uma variedade diferenciável, podemos exibir uma família $\{(U_\alpha, \mathbf{x}_\alpha)\}$ que satisfaz as propriedades 1 e 2 apenas. Isso é evidenciado pela seguinte proposição:

Figura 2.1: Diagrama de parametrização de uma variedade diferenciável.



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Proposição 2.1. *Dado um conjunto M e uma estrutura diferencial $\{(U_\alpha, \mathbf{x}_\alpha)\}_{\alpha \in L}$ de M , então M é uma variedade diferenciável munida de uma estrutura diferencial maximal $\{(U_\alpha, \mathbf{x}_\alpha)\}_{\alpha \in L'}$, tal que $L \subset L'$.*

Demonstração. Basta considerar $\{(U_\alpha, \mathbf{x}_\alpha)\}_{\alpha \in L'}$ o conjunto de todas as parametrizações de M que satisfazem 2) com relação as parametrizações em $\{(U_\alpha, \mathbf{x}_\alpha)\}_{\alpha \in L}$. ■

Existe uma forma natural de induzir uma topologia em uma variedade diferenciável de tal maneira que as parametrizações sejam contínuas.

Definição 2.2. Seja M uma variedade diferenciável e $\{(U_\alpha, \mathbf{x}_\alpha)\}_{\alpha \in L}$ sua estrutura diferencial maximal. Definimos uma topologia em M , dizendo que $A \subset M$ é aberto se, e só se, $\mathbf{x}_\alpha^{-1}(A)$ é aberto (em $\mathbb{R}^n$), para todo $\alpha \in L$.

De forma análoga a anterior, para checarmos se um conjunto é aberto na variedade M , basta fazê-lo para uma estrutura diferencial, conforme evidenciado pela próxima proposição.

Proposição 2.2. *$V \subset M$ é aberto se, e somente se, existe uma estrutura diferencial $\{(U_\alpha, \mathbf{y}_\alpha)\}$, tal que $\mathbf{y}_\alpha^{-1}(V \cap \mathbf{y}_\alpha(U_\alpha))$ é aberto em $\mathbb{R}^n$, para todo α .*

Demonstração. Seja M uma variedade diferenciável e $\{(U_\alpha, \mathbf{x}_\alpha)\}$ a estrutura diferencial maximal de M .

Af1: Para qualquer α , temos que $\mathbf{x}_\alpha^{-1} : \mathbf{x}_\alpha(U_\alpha) \rightarrow U_\alpha$ é contínua, isto é, $\mathbf{x}_\alpha$ preserva os conjuntos abertos de U_α . Seja $A \subset U_\alpha$ aberto em U_α (note que A também é aberto em $\mathbb{R}^n$, pois U_α é aberto). Mostremos que $\mathbf{x}_\alpha(A)$ é aberto em M . Tomemos uma parametrização

$\mathbf{x}_{\alpha'} : U_{\alpha'} \rightarrow M$. Temos que

$$\mathbf{x}_{\alpha'}^{-1}(\mathbf{x}_{\alpha}(A) \cap \mathbf{x}_{\alpha'}(U_{\alpha'})) = \mathbf{x}_{\alpha'}^{-1}(\mathbf{x}_{\alpha}(A)) \cap U_{\alpha'}.$$

Se $\mathbf{x}_{\alpha'}^{-1}(\mathbf{x}_{\alpha}(A)) = \emptyset$, temos o desejado. Do contrário, a aplicação $\mathbf{x}_{\alpha'}^{-1} \circ \mathbf{x}_{\alpha}$ é diferenciável e, em particular, contínua. Logo, $\mathbf{x}_{\alpha'}^{-1}(\mathbf{x}_{\alpha}(A))$ é aberto e, como $U_{\alpha'}$ é aberto e a interseção de abertos é aberta, $\mathbf{x}_{\alpha'}^{-1}(\mathbf{x}_{\alpha}(A) \cap \mathbf{x}_{\alpha'}(U_{\alpha'}))$ também o é.

Af2: Para qualquer α , temos que $\mathbf{x}_{\alpha} : U_{\alpha} \rightarrow \mathbf{x}_{\alpha}(U_{\alpha})$ é um homeomorfismo, considerando $\mathbf{x}_{\alpha}(U_{\alpha})$ como subespaço topológico de M . Pela afirmação 1, basta mostrar que se $A \subset \mathbf{x}_{\alpha}(U_{\alpha})$ é aberto, então $\mathbf{x}_{\alpha}^{-1}(A)$ é um aberto do $\mathbb{R}^n$. Como $\mathbf{x}_{\alpha}(U_{\alpha})$ é aberto, A é aberto em M . Logo, por definição, $\mathbf{x}_{\alpha}^{-1}(A \cap \mathbf{x}_{\alpha}(U_{\alpha})) = \mathbf{x}_{\alpha}^{-1}(A)$ é aberto.

Demonstração do resultado: Seja $\{(U_{\beta}, \mathbf{x}_{\beta})\}$ uma estrutura diferencial de M . Se V é aberto, o resultado é evidente. Reciprocamente, pela afirmação 1, como cada $\mathbf{x}_{\beta}$ preserva abertos, temos que $\mathbf{x}_{\beta}(U_{\beta}) \cap V = \mathbf{x}_{\beta}(\mathbf{x}_{\beta}^{-1}(U_{\beta}) \cap V)$ é aberto em $\mathbf{x}_{\beta}(U_{\beta})$ e, consequentemente, em M . Logo,

$$A = \bigcup_{\beta} \mathbf{x}_{\beta}(U_{\beta}) \cap A$$

é aberto em M . ■

Exemplos 2.1. 1. $\mathbb{R}^n$ é uma variedade de dimensão n . Com efeito, basta considerar $I : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ a identidade e notar que $\{(\mathbb{R}^n, I)\}$ é uma estrutura diferencial.

2. O espaço projetivo $P^n(\mathbb{R})$, definido como o conjunto de todas as retas de $\mathbb{R}^{n+1}$ que passam pela origem. 1) Definindo, em $\mathbb{R}^{n+1}$ a relação de equivalência $(x_1, \dots, x_{n+1}) \sim (\lambda x_1, \dots, \lambda x_{n+1}), \forall \lambda \in \mathbb{R}$, podemos pensar em $P^n(\mathbb{R})$ como o conjunto quociente $\frac{\mathbb{R}^{n+1} - \{0\}}{\sim}$. Muniremos tal conjunto de uma estrutura diferencial. 2) Indicando as classes de equivalência de $P^n(\mathbb{R})$ como $[x_1, \dots, x_{n+1}]$, notamos que se $x_i \neq 0$, então $[x_1, \dots, x_{n+1}] = [\frac{x_1}{x_i}, \dots, \frac{x_{n+1}}{x_i}]$. 3) Definimos $V_i = \{[x_1, \dots, x_{n+1}]; x_i \neq 0\}$, $i = 1, \dots, n+1$. 4) Para cada i , definimos $\mathbf{x}_i : V_i \rightarrow P^n(\mathbb{R})$, pondo $\mathbf{x}_i(y_1, \dots, y_n) = [y_1, \dots, y_{i-1}, 1, y_i, \dots, y_n]$. 5) É fácil ver que cada $\mathbf{x}_i$ é uma bijeção sobre sua imagem. Mais ainda, $\cup_i \mathbf{x}_i(V_i) = P^n(\mathbb{R})$. Resta mostrar que a troca de coordenadas é diferenciável. 6) Dados índices $i \neq j$, temos que

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_i^{-1}(V_i \cap V_j) &= \mathbb{R}^n \cap \mathbf{x}_i^{-1}(V_j) \\ &= \mathbf{x}_i^{-1}(V_j) \\ &= \{(y_1, \dots, y_n); [y_1, \dots, y_{i-1}, 1, y_i, \dots, y_n] \in V_j\} \\ &= \{(y_1, \dots, y_n); y_j \neq 0\} \end{aligned}$$

O qual é aberto. Supondo agora, sem perda de generalidade, que $i > j$, temos que

$$\begin{aligned} & \mathbf{x}_j^{-1} \circ \mathbf{x}_i(y_1, \dots, y_n) \mathbf{x}_j^{-1}([y_1, \dots, y_{i-1}, 1, y_i, \dots, y_n]) \\ &= \mathbf{x}_j^{-1} \left(\left[\frac{y_1}{y_j}, \dots, \frac{y_{j-1}}{y_j}, 1, \frac{y_{j+1}}{y_j}, \dots, \frac{y_{i-1}}{y_j}, \frac{1}{y_j}, \frac{y_i}{y_j}, \dots, \frac{y_n}{y_j} \right] \right) \\ &= \left(\frac{y_1}{y_j}, \dots, \frac{y_{j-1}}{y_j}, 1, \frac{y_{j+1}}{y_j}, \dots, \frac{y_{i-1}}{y_j}, \frac{1}{y_j}, \frac{y_i}{y_j}, \dots, \frac{y_n}{y_j} \right) \end{aligned}$$

O qual é diferenciável, pois $y_j \neq 0$.

O espaço projetivo tem esse nome devido ao fato de todas as retas, incluindo as paralelas, terem um ponto em comum. Retomaremos esse fato posteriormente, ao apresentarmos outra forma de construir essa variedade.

A próxima etapa é definir uma noção de diferenciabilidade na variedade.

Definição 2.3. Sejam M_1^n e M_2^m variedades diferenciáveis. $\varphi : M_1 \rightarrow M_2$ é dita diferenciável em $p \in M_1$ se dada $\mathbf{y} : V \rightarrow M_2$ parametrização de $\varphi(p)$ existe $\mathbf{x} : U \rightarrow M_1$ parametrização de p , tal que $\varphi(\mathbf{x}(U)) \subset \mathbf{y}(V)$ e $\tilde{\varphi} = \mathbf{y}^{-1} \circ \varphi \circ \mathbf{x} : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ é diferenciável.

Dizemos que $\varphi : M_1 \rightarrow M_2$ é diferenciável se for diferenciável em todo $p \in M_1$.

Note que, devido ao segundo axioma de estrutura diferencial, a diferenciabilidade de $\tilde{\varphi}$ não depende da escolha de $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$. Com efeito, sendo $\tilde{\varphi} = \mathbf{y}^{-1} \circ \varphi \circ \mathbf{x}$ diferenciável, e $\mathbf{x}', \mathbf{y}'$ parametrizações de p e $\varphi(p)$ respectivamente, com $\varphi(\mathbf{x}'(U')) \subset \mathbf{y}'(V')$, temos que $\mathbf{y}'^{-1} \circ \varphi \circ \mathbf{x}' = \mathbf{y}'^{-1} \circ (\mathbf{y} \circ \mathbf{y}^{-1}) \circ \varphi \circ (\mathbf{x} \circ \mathbf{x}^{-1}) \circ \mathbf{x}' = \mathbf{y}'^{-1} \circ \mathbf{y} \circ (\mathbf{y}^{-1} \circ \varphi \circ \mathbf{x}) \circ \mathbf{x}^{-1} \circ \mathbf{x}'$, o qual é diferenciável.

Como é de se esperar, para verificar se uma função é ou não diferenciável, basta verificar a definição para uma estrutura diferencial específica:

Proposição 2.3. $\varphi : M \rightarrow N$ é diferenciável em $p \in M$ se, e somente se existe uma estrutura diferencial $\{(V_\alpha, \mathbf{y}_\alpha)\}$ de N , tal que, dada uma parametrização $\mathbf{y}_\alpha$ de $\varphi(p)$, existe uma parametrização $\mathbf{x}_\alpha : U_\alpha \rightarrow M$ de p , onde $\varphi(\mathbf{x}_\alpha(U_\alpha)) \subset \mathbf{y}_\alpha(V_\alpha)$ e $\mathbf{y}_\alpha^{-1} \circ \varphi \circ \mathbf{x}_\alpha$ é diferenciável em $\mathbf{x}_\alpha^{-1}(p)$.

Demonstração. Af1: Se existem $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$ parametrizações de p e $\varphi(p)$ respectivamente, tais que $\mathbf{y}^{-1} \circ \varphi \circ \mathbf{x}$ é contínua em $\mathbf{x}^{-1}(p)$. Então, φ é contínua em p . Basta notar que, como $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$ são homeomorfismos sobre suas imagens, $\varphi \circ \mathbf{x} = \mathbf{y} \circ \mathbf{y}^{-1} \circ \varphi \circ \mathbf{x}$ é contínua em $\mathbf{x}^{-1}(p)$ e, de forma análoga, $\varphi = \varphi \circ \mathbf{x} \circ \mathbf{x}^{-1}$ é contínua em p .

Demonstração do resultado: Se φ for diferenciável em p , o resultado segue da definição. Reciprocamente, fixando $p \in M$, seja $\{(V_\alpha, \mathbf{y}_\alpha)\} = \mathcal{E}$ uma estrutura que satisfaz a hipótese. Seja $\mathbf{y} : V \rightarrow N$ uma parametrização de $\varphi(p)$ (não necessariamente na estrutura diferencial). Seja $\mathbf{y}_\alpha$ uma parametrização em $\mathcal{E}$ de $\varphi(p)$. Pela hipótese, existe uma parametrização $\mathbf{x}_\alpha : U_\alpha \rightarrow M$ de p , tal que $\varphi(\mathbf{x}_\alpha(U_\alpha)) \subset \mathbf{y}_\alpha(V_\alpha)$ e $\mathbf{y}_\alpha^{-1} \circ \varphi \circ \mathbf{x}_\alpha$ é diferenciável

em $\mathbf{x}_\alpha^{-1}(p)$. O conjunto $W = \mathbf{y}_\alpha(V_\alpha) \cap \mathbf{y}(V)$ é não vazio, pois $\varphi(p) \in W$. Como N é variedade diferenciável, $\mathbf{y}^{-1} \circ \mathbf{y}_\alpha|_{\mathbf{y}_\alpha^{-1}(W)}$ é diferenciável. Fazendo $U = \mathbf{x}_\alpha^{-1} \circ \varphi^{-1}(W)$, temos, pela Af1, que U é aberto. Também, $U \subset U_\alpha$. Dessa forma, definindo uma parametrização $\mathbf{x} : U \rightarrow M$, pondo $\mathbf{x}(q) = \mathbf{x}_\alpha(q)$, temos que

$$\varphi(\mathbf{x}(U)) \subset W \subset \mathbf{y}(V)$$

e, em uma vizinhança de $\mathbf{x}^{-1}(p)$,

$$\mathbf{y}^{-1} \circ \mathbf{y}_\alpha \circ \mathbf{y}_\alpha^{-1} \circ \varphi \circ \mathbf{x} = \mathbf{y}^{-1} \circ \varphi \circ \mathbf{x}.$$

Logo, $\mathbf{y}^{-1} \circ \varphi \circ \mathbf{x}$ é diferenciável em $\mathbf{x}^{-1}(p)$. ■

Ao considerar uma função $f : \mathbb{R}^n \rightarrow M$ ou $g : M \rightarrow \mathbb{R}^n$, diremos que f ou g são diferenciáveis se forem diferenciáveis como aplicações entre duas variedades, considerando $\mathbb{R}^n$ como a variedade parametrizada pela função identidade.

Com a noção de diferenciabilidade, surge naturalmente uma questão: O que é a diferencial de uma função diferenciável f de uma variedade M em uma variedade N ? Como na análise no $\mathbb{R}^n$, gostaríamos de que, dados um ponto $p \in M$ e uma direção v , a diferencial de f em p na direção v indicasse a direção da mudança de f em relação a $f(p)$ após um deslocamento infinitesimal de p na direção v . No $\mathbb{R}^n$, faz sentido pensar no valor de $f(p + \epsilon v)$ e compará-lo com $f(p)$, a medida que tomamos ϵ arbitrariamente pequeno. Porém, as variedades não são espaços vetoriais, logo, $p + \epsilon v$ não tem sentido. Contornamos isso por pensar em outra definição da diferencial, a qual analisa o comportamento da função f ao longo de uma curva α que passa por p com velocidade (direção) v .

Devemos então tornar precisa a ideia de direção. Inspirados pela Geometria Diferencial, podemos pensar em definir planos tangentes, os quais serão os conjuntos das "direções" em um ponto. Iniciamos tomando uma curva diferenciável $\alpha(t)$ definida na variedade, que passa por p quando $t = 0$. Se estivéssemos falando de uma superfície contida em $\mathbb{R}^3$, poderíamos pensar em α como uma curva em $\mathbb{R}^3$ e considerar seu vetor velocidade $\alpha'(t)$, quando $t = 0$. Entretanto, variedades diferenciais não possuem um espaço ambiente. Resolvemos isso por pensar no vetor velocidade de α como um funcional linear, da seguinte maneira:

Definição 2.4. • **Curva Diferenciável:** Seja M uma variedade diferenciável. Uma função diferenciável $\alpha : (-\epsilon, \epsilon) \subset \mathbb{R} \rightarrow M$, com $\epsilon > 0$ é chamada curva diferenciável.

- **Vetor Tangente:** Sejam $\alpha : (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow M$ curva diferenciável, com $\alpha(0) = p$ e $\mathcal{D} = \{f : M \rightarrow \mathbb{R}; f \text{ diferenciável}\}$. O vetor tangente à curva α em $t = 0$ é o funcional $\alpha'(0) : \mathcal{D} \rightarrow \mathbb{R}$, tal que $\alpha'(0)f = \frac{d(f \circ \alpha)}{dt}|_{t=0}$.

- **Plano Tangente:** Seja $p \in M$. Definimos o plano tangente $T_p M = \{\alpha'(0); \alpha : (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow M \text{ é curva diferenciável, com } \alpha(0) = p\}$.

Para mostrar que um plano tangente é um espaço vetorial, primeiro expressaremos uma direção utilizando um sistema de coordenadas. Seja $\mathbf{x} : U \rightarrow M$ parametrização de $\mathbf{x}(q) = p \in M$. Sendo $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ uma função diferenciável, podemos escrever $f \circ \mathbf{x}(x_1, \dots, x_n) = \tilde{f}(x_1, \dots, x_n)$. Também, $\tilde{\alpha}(t) = \mathbf{x}^{-1} \circ \alpha(t) = (x_1(t), \dots, x_n(t))$. Dessa forma, $f \circ \alpha(t) = f \circ \mathbf{x} \circ \mathbf{x}^{-1} \circ \alpha(t) = \tilde{f} \circ \tilde{\alpha}(t) = \tilde{f}(x_1(t), \dots, x_n(t))$. Logo, $\alpha'(0)f = \frac{d(f \circ \alpha)}{dt}|_{t=0} = \frac{d}{dt}(\tilde{f}(x_1(t), \dots, x_n(t)))|_{t=0}$. Como a função a ser diferenciada na direita é de um aberto de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}^n$, podemos usar a regra da cadeia. Temos então que

$$\alpha'(0)f = \sum_{i=1}^n x'_i(0) \frac{\partial \tilde{f}}{\partial x_i}(\alpha(0)) = \left(\sum_{i=1}^n x'_i(0) \left(\frac{\partial}{\partial x_i} \right)_0 \right) \tilde{f},$$

implicando que

$$\alpha'(0) = \sum_{i=1}^n x'_i(0) \left(\frac{\partial}{\partial x_i} \right)_0.$$

Como todo vetor tangente é uma combinação linear dos funcionais $\left(\frac{\partial}{\partial x_i} \right)_0$, os quais são dados pelas curvas $\alpha_i(t) = \mathbf{x}(q + te_i)$, onde $q = \mathbf{x}^{-1}(p)$ e e_i é o i -ésimo vetor da base canônica de $\mathbb{R}^n$, $T_p M$ é um espaço vetorial. **FAILED TO RESOLVE:**[[Prop 1 - O espaço tangente é um espaço vetorial.]] Note que se $f \in \mathcal{D}$, como na definição acima, $\left(\frac{\partial}{\partial x_i} \right)_0 f = \frac{\partial \tilde{f}}{\partial x_i}(0)$ onde $\tilde{f}$ é a expressão em coordenadas de f , o que justifica a notação empregada. De agora em diante, escreveremos $\frac{\partial}{\partial x_i}$ para indicar tal vetor.

Finalmente podemos falar da diferencial de uma função.

Proposição 2.4. *Sejam M_1^n, M_2^n variedades diferenciáveis, e $\varphi : M_1 \rightarrow M_2$ uma aplicação diferenciável em $p \in M_1$. Definimos a derivada de φ em p como $d\varphi_p : T_p M_1 \rightarrow T_{\varphi(p)} M_2$, para todo $v \in T_p M_1$, com $v = \alpha'(0)$ para alguma curva diferenciável α , com $\alpha(0) = p$, fazendo $d\varphi_p(v) = (\varphi \circ \alpha)'(0)$.*

Mostremos que $d\varphi_p$ está bem definida e é linear. Seja $v \in T_p M_1$ e α uma curva diferenciável em M_1 , tal que $\alpha(0) = p$. Seja $\beta = \varphi \circ \alpha$. Note que β é uma curva diferenciável em M_2 , tal que $\beta(0) = \varphi(p)$. Sejam $\mathbf{x} : U \rightarrow M_1$ parametrização de p e $\mathbf{y} : V \rightarrow M_2$ parametrização de $\varphi(p)$. Temos que $\tilde{\varphi}(x_1, \dots, x_n) := \mathbf{y}^{-1} \circ \varphi \circ \mathbf{x}(x_1, \dots, x_n) = (y_1(x_1, \dots, x_n), \dots, y_m(x_1, \dots, x_n))$. Também, $\tilde{\alpha}(t) := \mathbf{x}^{-1} \circ \alpha(t) = (x_1(t), \dots, x_n(t))$. Representando então β em coordenadas, temos

$$\tilde{\beta}(t) := \mathbf{y}^{-1} \circ \beta(t) = \mathbf{y}^{-1} \circ \varphi \circ \alpha(t) = \mathbf{y}^{-1} \circ \varphi \circ \mathbf{x} \circ \mathbf{x}^{-1} \circ \alpha(t) = \tilde{\varphi} \circ \tilde{\alpha}(t) = (y_1(x_1(t), \dots, x_n(t)), \dots, y_m(x_1(t), \dots, x_n(t))),$$

Logo,

$$\beta'(0) = \sum_{k=1}^m \frac{d}{dt} y_k(x_1(t), \dots, x_n(t))|_{t=0} \left(\frac{\partial}{\partial y_k} \right)_0 = \sum_{k=1}^m \sum_{i=1}^n \frac{\partial y_k}{\partial x_i}(\tilde{\alpha}(0)) \cdot x'_i(0) \cdot \left(\frac{\partial}{\partial y_k} \right)_0$$

Reescrevendo, temos

$$\beta'(0) = \sum_{k=1}^m \left(\frac{\partial}{\partial y_k} \right)_0 \sum_{i=1}^n v_i \cdot \frac{\partial y_k}{\partial x_i}(\tilde{\alpha}(0))$$

onde $v = \sum_{i=1}^n v_i \left(\frac{\partial}{\partial x_i} \right)_0$. Sendo A a matriz $m \times n$, dada por $a_{k,i} = \frac{\partial y_k}{\partial x_i}(\tilde{\alpha}(0))$, temos que $\beta'(0) = A(\alpha'(0))$, ou seja, $A = [d\varphi_v]$, o que mostra que $d\varphi_v$ é linear e em particular, está bem definida.

Com a noção de diferenciabilidade, definimos o morfismo das variedades diferenciáveis:

Definição 2.5. Sejam M_1 e M_2 variedades diferenciáveis. Uma função diferenciável $\varphi : M_1 \rightarrow M_2$ é chamada de difeomorfismo se for bijeção e $\varphi^{-1} : M_2 \rightarrow M_1$ for diferenciável. Se para todo $p \in M_1$, existe um U vizinhança de p em M_1 e V vizinhança de $\varphi(p)$ em M_2 , tal que $\varphi|_U : U \rightarrow V$ é um difeomorfismo, φ é chamada de difeomorfismo local.

Enfim, tornamos preciso o fato de que as variedades diferenciáveis se comportarem localmente como o $\mathbb{R}^n$:

Proposição 2.5. Toda parametrização é um difeomorfismo sobre sua imagem.

Demonstração. Seja $p \in M^n$ e $\mathbf{x} : U \rightarrow M$ uma parametrização de p . Note que, como $\mathbb{R}^n$ é parametrizado pela função identidade, temos que $\mathbf{x}$ é diferenciável se, e somente se, existe uma parametrização $\mathbf{y} : V \rightarrow M$ de p , tal que $\mathbf{x}(I(U)) \subset \mathbf{y}(V)$ e $\mathbf{y}^{-1} \circ \mathbf{x} \circ I$ é diferenciável. Isso é trivialmente satisfeito pelos axiomas de variedade diferenciável. De forma análoga é possível mostrar que $\mathbf{x}^{-1}$ é diferenciável e portanto, $\mathbf{x}$ é um difeomorfismo. ■

Exemplos 2.2. 1. Qualquer aplicação $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ não pode ser um difeomorfismo.

De fato, todo difeomorfismo é, em particular, um homeomorfismo (incentivamos o leitor a demonstrar esse fato). Portanto, se existisse tal difeomorfismo, $\mathbb{R}$ e $\mathbb{R}^2$ seriam homeomorfos, o que é um absurdo.

2. A função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definida por $f(x) = |x|$ não é um difeomorfismo, pois não é diferenciável quando $x = 0$. Já a função $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definida por $g(x) = x^3$ é um homeomorfismo, mas não é um difeomorfismo, pois sua inversa não é derivável em $x = 0$.

3. Se M é uma variedade qualquer, a aplicação identidade $I : M \rightarrow M$ é um difeomorfismo.

Podemos classificar os difeomorfismos da seguinte maneira:

Proposição 2.6. Uma aplicação $\varphi : M_1 \rightarrow M_2$ é um difeomorfismo se, e somente se, for um difeomorfismo local bijetor.

Demonstração. Seja $\varphi : M_1 \rightarrow M_2$ um difeomorfismo local bijetor. φ^{-1} está bem definida. Mostremos que tal função é diferenciável. Seja, então $p \in M_2$. Como φ é bijeção, existe $q \in M_1$, tal que $\varphi(q) = p$. Como φ é difeomorfismo local, existe uma vizinhança U de q em M_1 e uma vizinhança V de p em M_2 , tal que $\varphi|_U : U \rightarrow V$ é um difeomorfismo. Seja $\Phi = (\varphi|_U)^{-1}$. Temos que Φ é diferenciável, pela definição de difeomorfismo. Também, $\Phi = (\varphi|_U)^{-1} = (\varphi^{-1})|_V$, implicando que φ^{-1} é diferenciável em p . Como p é arbitrário, φ^{-1} é diferenciável e φ é um difeomorfismo.

Para a recíproca, basta notar que M_1 e M_2 são abertos em M_1 e M_2 respectivamente. ■

Antes de apresentarmos as próximas definições, convém apresentar alguns resultado que serão úteis na interpretação dessas.

Lema 2.1. *Sejam M_1, M_2 e M_3 variedades diferenciáveis, e $\varphi : M_1 \rightarrow M_2$ e $\psi : M_2 \rightarrow M_3$ aplicações diferenciáveis. Então $\psi \circ \varphi : M_1 \rightarrow M_3$ é diferenciável e $d(\psi \circ \varphi)_p = d\psi_{\varphi(p)} \circ d\varphi_p$.*

Demonstração. Seja $p \in M_1$. Da diferenciabilidade de ψ , para toda parametrização $\mathbf{z} : W \rightarrow M_3$ de $\psi(\varphi(p))$ existe uma parametrização $\mathbf{y} : V \rightarrow M_2$ de $\varphi(p)$, tal que $\psi(\mathbf{y}(V)) \subset \mathbf{z}(W)$ e $\mathbf{z}^{-1} \circ \psi \circ \mathbf{y}$ é diferenciável. Da diferenciabilidade de φ , e da independência de escolha de parametrizações, existe uma parametrização $\mathbf{x} : U \rightarrow M_1$ de p , tal que $\varphi(\mathbf{x}(U)) \subset \mathbf{y}(V)$ e $\mathbf{y}^{-1} \circ \varphi \circ \mathbf{x}$ é diferenciável. Temos que $\psi(\varphi(\mathbf{x}(U))) \subset \psi(\mathbf{y}(V)) \subset \mathbf{z}(W)$ e que $\mathbf{z}^{-1} \circ \psi \circ \varphi \circ \mathbf{x} = (\mathbf{z}^{-1} \circ \psi \circ \mathbf{y}) \circ (\mathbf{y}^{-1} \circ \varphi \circ \mathbf{x})$, e portanto, é diferenciável.

Seja $\alpha : (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow M_1$ uma curva diferenciável, com $\alpha(0) = p$. Seja $\beta = \varphi \circ \alpha$ curva diferenciável em M_2 e $\gamma = \psi \circ \beta$ curva diferenciável em M_3 . Temos que

$$d(\psi \circ \varphi)_p(\alpha'(0)) = (\psi \circ \varphi \circ \alpha)'(0) = \gamma'(0) = (\psi \circ \beta)'(0) = d\psi_{\varphi(p)}(\beta'(0)) = d\psi_{\varphi(p)}(d\varphi_p(\alpha'(0)))$$

, mostrando o desejado. ■

Lema 2.2. *A função identidade de uma variedade é diferenciável e tem derivada igual a identidade.*

Demonstração. Sejam $I : M \rightarrow M$ a função identidade e $p \in M$. Basta tomar quaisquer duas parametrizações de p para ver que I é diferenciável, pois a troca de coordenadas será diferenciável. Também, sendo $v \in T_p M$ e α uma curva diferenciável, com $\alpha(0) = 0$, temos que $dI_p(v) = (I \circ \alpha)'(0) = \alpha'(0) = v$. Logo, dI_p é a função identidade de $T_p M$ ■

Proposição 2.7. *Se $\varphi : M_1 \rightarrow M_2$ é difeomorfismo, então $d\varphi_p : T_p M_1 \rightarrow T_{\varphi(p)} M_2$ é isomorfismo. Em particular, M_1 e M_2 tem a mesma dimensão.*

Demonstração. Seja $\varphi^{-1} : M_2 \rightarrow M_1$ a inversa de φ , a qual é diferenciável. Note que $I_{M_1} = \varphi^{-1} \circ \varphi$. Logo, pelos lema 1 e 2, temos que $I_{T_p M_1} = d(\varphi^{-1} \circ \varphi)_p = d(\varphi^{-1})_{\varphi(p)} \circ d(\varphi)_p$. Também, como $I_{M_2} = \varphi \circ \varphi^{-1}$, temos que $I_{T_{\varphi(p)} M_2} = d(\varphi \circ \varphi^{-1})_p = d(\varphi)_p \circ d(\varphi^{-1})_{\varphi(p)}$. Logo,

$d\varphi_p$ é invertível e tem inversa igual a $d(\varphi^{-1})_{\varphi(p)}$. Em particular, $d\varphi_p$ é um isomorfismo de espaços vetoriais. Para mostrar que a dimensão de M_1 e M_2 são iguais, basta observar que a dimensão do espaço tangente em um ponto de uma variedade é igual a dimensão da variedade, devido ao conjunto $\left\{\left(\frac{\partial}{\partial x_1}\right)_0, \dots, \left(\frac{\partial}{\partial x_n}\right)_0\right\}$ ser base de um espaço tangente. Logo, como a dimensão dos espaços tangentes é a mesma, a dimensão das variedades também é. ■

Uma recíproca local desse resultado é dado pelo próximo Teorema:

Teorema 2.1. *Seja $\varphi : M_1^n \rightarrow M_2^n$ uma aplicação diferenciável e $p \in M_1$, tal que $d\varphi_p : T_p M_1 \rightarrow T_{\varphi(p)} M_2$ é um isomorfismo. Então φ é um difeomorfismo local em p .*

Demonstração. Sejam $\mathbf{x} : U \rightarrow M_1$ e $\mathbf{y} : V \rightarrow M_2$ parametrizações de p e $\varphi(p)$ respectivamente, tais que $\varphi(\mathbf{x}(U)) \subset \mathbf{y}(V)$. Pela definição de diferenciabilidade, $\tilde{\varphi} = \mathbf{y}^{-1} \circ \varphi \circ \mathbf{x} : U \rightarrow V$ é diferenciável. Note que $\tilde{\varphi}(x_1, \dots, x_n) = (y_1(x_1, \dots, x_n), \dots, y_n(x_1, \dots, x_n))$. Logo, a matriz com entradas reais que representa $d\tilde{\varphi}_{\mathbf{x}^{-1}(p)}$ é igual a matriz que representa $d\varphi_p$, e portanto, é injetora. Como $d\varphi_p$ é isomorfismo, $d\tilde{\varphi}_{\mathbf{x}^{-1}(p)}$ também o é. Dessa forma, aplicando o Teorema da função inversa em $\mathbb{R}^n$, temos que existem abertos $U' \subset U$ e $V' \subset V$, tais que $\tilde{\varphi} : U' \rightarrow V'$ é um difeomorfismo, implicando que $\varphi|_{\mathbf{x}(U')} = \mathbf{y} \circ \tilde{\varphi} \circ \mathbf{x}^{-1}|_{\mathbf{x}(U')} : \mathbf{x}(U') \rightarrow \mathbf{y}(V')$ é um difeomorfismo. ■

Além do difeomorfismo, existem outras maneiras de carregar propriedades diferenciáveis de uma variedade para outras.

Definição 2.6. • **Imersão:** Sejam M^m e N^n variedades diferenciáveis e $\varphi : M \rightarrow N$ diferenciável. φ é dito uma Imersão se $d\varphi_p$ é injetiva para todo $p \in M$.

- **Mergulho:** Seja $\varphi : M \rightarrow N$ uma imersão. φ é dita um mergulho se for um homeomorfismo sobre $\varphi(M) \subset N$, onde $\varphi(M)$ tem a topologia induzida por N .
- **Subvariedade:** Se $M \subset N$ e a função inclusão $i : M \rightarrow N$ for um mergulho, M é uma subvariedade de N .

O mergulho apresenta uma forma de identificar uma variedade M “dentro” de outra variedade N .

Proposição 2.8. *Todo Mergulho é um difeomorfismo sobre sua imagem.*

Demonstração. Sejam M^m e N^n variedades diferenciáveis e $\varphi : M \rightarrow N$ um mergulho. Como φ é uma imersão, $d\varphi_p$ é injetiva, para todo $p \in M$. Basta mostrar que $d\varphi_p$ é sobrejetiva, pois pelo teorema da função inversa para variedades diferenciáveis, teremos que φ é um difeomorfismo local e, portanto, um difeomorfismo sobre sua imagem, pois φ é uma bijeção sobre sua imagem. Para isso, mostremos que $\dim(\varphi(M)) = m$ e o resultado

segue do teorema do núcleo e da imagem. Seja $\{(U_\alpha), \mathbf{x}_\alpha\}$ a estrutura diferencial maximal de M . Para cada α , defina

$$\mathbf{y}_\alpha : U_\alpha \ni x \longrightarrow \varphi(\mathbf{x}_\alpha(x)) \in \varphi(M).$$

É fácil ver que $\{(U_\alpha, \mathbf{y}_\alpha)\}$ é uma estrutura diferencial de $\varphi(M)$. ■

Já a imersão cumpre o papel de um mergulho local:

Proposição 2.9. *Seja $\varphi : M_1^n \rightarrow M_2^m$, com $n \leq m$ uma imersão. Para todo $p \in M_1$, existe uma vizinhança V de p em M_1 , tal que $\varphi|_V$ é um mergulho.*

Demonstração. Sejam $\mathbf{x}_1 : U_1 \rightarrow M_1$, $\mathbf{x}_2 : U_2 \rightarrow M_2$ parametrizações de p e $\varphi(p)$ respectivamente, e $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ e $(y_1, \dots, y_m) \in \mathbb{R}^m$. Defina $\tilde{\varphi}(x_1, \dots, x_n) = \mathbf{x}_2^{-1} \circ \varphi \circ \mathbf{x}_1(x_1, \dots, x_n) = (y_1(x_1, \dots, x_n), \dots, y_m(x_1, \dots, x_n))$. Seja $q \in U_1$, tal que $\mathbf{x}_1(q) = p$. Como φ é imersão, $d\varphi_p$ é injetora, logo existe uma reduzida quadrada da matriz $\left(\frac{\partial y_i}{\partial x_j}\right)$ que possui determinante diferente de zero. Sem perda de generalidade, suponhamos que $\frac{\partial(y_1, \dots, y_n)}{\partial(x_1, \dots, x_n)}$ seja tal matriz. (Caso seja outra reduzi da, podemos definir outra parametrização, apenas trocando as coordenadas de posição.) Seja $\Phi : U_1 \times \mathbb{R}^{m-n=k} \rightarrow \mathbb{R}^m$, definida por

$$\Phi(x_1, \dots, x_n, t_1, \dots, t_k) = (y_1(x_1, \dots, x_n), \dots, y_n(x_1, \dots, x_n), y_{n+1}(x_1, \dots, x_n) + t_1, \dots, y_{n+k}(x_1, \dots, x_n) + t_k).$$

Note que $\det d\Phi_q = \frac{\partial(y_1, \dots, y_n)}{\partial(x_1, \dots, x_n)} \neq 0$. Pelo Teorema da Função Inversa (No $\mathbb{R}^n$), existem abertos $W_1 \subset U_1 \times \mathbb{R}^k$ e $W_2 \subset \mathbb{R}^m$, tais que $(q, 0) \in W_1$ e $\Phi(q, 0) \in W_2$ e $\Phi|_{W_1} : W_1 \rightarrow W_2$ é um difeomorfismo. Seja $\tilde{V} = W_1 \cap U_1 = \{x \in W_1; x = (x_1, \dots, x_n, 0, \dots, 0)\}$.

Note que se $(t_1, \dots, t_k) = 0$, então $\Phi(x_1, \dots, x_n, t_1, \dots, t_k) = \tilde{\varphi}(x_1, \dots, x_n)$. Logo, $\Phi|_{\tilde{V}} = \tilde{\varphi}|_{\pi(\tilde{V})} = \mathbf{x}_2 \circ \varphi \circ \mathbf{x}_1|_{\pi(\tilde{V})}$, onde $\pi(x_1, \dots, x_n, t_1, \dots, t_n) = (x_1, \dots, x_n)$. Isto implica que $\tilde{\varphi}|_{\pi(\tilde{V})}$, e portanto, $\varphi|_{\mathbf{x}_1(\pi(\tilde{V}))}$ são difeomorfismos. ■

Exemplos 2.3. 1. Toda aplicação $c : I \rightarrow M$ diferenciável, em que I é um intervalo aberto e M uma variedade diferenciável, cuja derivada não é nula é uma imersão. De fato, como $dc_t : T_t I \rightarrow T_{c(t)} M$ não é nula para todo t , deverá ser injetora, por ser uma transformação linear.

2. Se M é uma variedade diferenciável e $U \subseteq M$ é um aberto, então a função inclusão $i : U \rightarrow M$ é um mergulho, isto é, U é subvariedade de M , quando U é considerado variedade com a estrutura diferencial $\{(U_\alpha, \overline{\mathbf{x}}_\alpha)\}$ induzida pela estrutura $\{(V_\alpha, \mathbf{x}_\alpha)\}$ de M , onde $U_\alpha = \mathbf{x}_\alpha^{-1}(V_\alpha \cap U)$ e $\overline{\mathbf{x}}_\alpha = \mathbf{x}_\alpha|_{U_\alpha}$.

Antes de finalizarmos essa sessão, construiremos, de forma natural, uma estrutura diferencial em um espaço vetorial arbitrário. Isso se mostrará útil posteriormente, quando precisarmos tratar o espaço tangente como uma variedade diferenciável.

Lema 2.3. *Seja V um espaço vetorial de dimensão finita, digamos $\dim V = n$. Então V possui uma estrutura diferencial natural, induzida por qualquer isomorfismo entre $\mathbb{R}^n$ e V . Com efeito, como $\dim \mathbb{R}^n = \dim V$, os espaços são isomorfos, ou seja, existe um isomorfismo $T : \mathbb{R}^n \rightarrow V$. O conjunto $\{(\mathbb{R}^n, T)\}$ é uma estrutura diferencial de V . Seja $T' : \mathbb{R}^n \rightarrow V$ outro isomorfismo. A estrutura diferencial maximal induzida por T' é a mesma que T . De fato, $T^{-1} \circ T' : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ é uma composta de isomorfismos e, portanto, é também um isomorfismo. Como todo isomorfismo é transformação linear é, também, diferenciável, o que conclui a demonstração.*

Também existe uma forma natural de identificar o espaço tangente desse espaço vetorial como o próprio espaço vetorial. A demonstração a seguir é de cunho puramente técnico, mas que decidimos incluir para garantir a completude do texto. Caso o leitor deseje, basta assumir que a identificação realizada a seguir é, de fato, um isomorfismo.

Lema 2.4. *Seja $p \in V$ e $T_p V$ o espaço tangente de V em p . Identificaremos $T_p V \approx V$ da seguinte maneira: Defina $\Phi = \Phi_p : V \rightarrow T_p V$, pondo $\Phi(v) = \alpha'_v(0)$, onde $\alpha' : \mathbb{R} \rightarrow V$ é definida por $\alpha_v(t) = p + tv$.*

Mostremos que Φ é um isomorfismo, isto é, uma transformação linear bijetora.

Sejam $v, w \in V$. Note que $\alpha_{v+w}(t) = T \circ \beta(t)$, onde β é uma curva diferenciável em $\mathbb{R}^n$. Segue que $\beta(t) = T^{-1} \circ \alpha_{v+w}(t) = T^{-1}(p + t(v + w)) = T^{-1}(p) + t(T^{-1}(v) + T^{-1}(w))$. Logo, a derivada de β em $\mathbb{R}^n$ é o vetor $T^{-1}(v) + T^{-1}(w)$. Escrevendo $\beta_v(t) = T^{-1} \circ \alpha_v(t)$ e $\beta_w(t) = T^{-1} \circ \alpha_w(t)$, temos que

$$\beta'(t) = \beta'_v(t) + \beta'_w(t),$$

implicando que $\beta(t) = \beta_v(t) + \beta_w(t)$, pois $\beta(0) = \beta_v(0) = \beta_w(0) = T^{-1}(p)$. Disso, segue que

$$\alpha_{v+w}(t) = T \circ \beta(t) = T(\beta_v(t)) + T(\beta_w(t)) = \alpha_v(t) + \alpha_w(t).$$

Tomemos agora uma função $f : V \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciável. Temos que $\tilde{f} = f \circ T$ é diferenciável.

Assim, podemos escrever $f = \tilde{f} \circ T^{-1}$. Temos, então

$$\begin{aligned}
 \alpha'_{v+w}(0)f &= \left. \frac{d}{dt} f \circ \alpha(t) \right|_{t=0} \\
 &= \left. \frac{d}{dt} \tilde{f} \circ T^{-1} \circ T \circ \beta(t) \right|_{t=0} \\
 &= \left. \frac{d}{dt} \tilde{f} \circ \beta(t) \right|_{t=0} \\
 &= \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \beta'(0)}(0) \\
 &= \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \beta'_v(0) + \beta'_w(0)}(0) \\
 &= \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \beta'_v(0)}(0) + \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \beta'_w(0)}(0) \\
 &= \alpha'_v(0)f + \alpha'_w(0)f.
 \end{aligned}$$

Dessa maneira,

$$\Phi(v + w) = \alpha'_{v+w}(0) = \alpha'_v(0) + \alpha'_w(0) = \Phi(v) + \Phi(w).$$

Dado $c \in \mathbb{R}$, é possível mostrar que $\Phi(cv) = c\Phi(v)$ de forma análoga, fundamentando-se na linearidade do operador derivada direcional das funções de $\mathbb{R}^n$.

Resta mostrar que Φ é bijetora. Seja $v \in V$, com $v \neq 0$. Definimos f , pondo, para cada $t \in \mathbb{R}$, $f(p + tv) = t$. Podemos estender f diferenciavelmente de forma a ter $f : V \rightarrow \mathbb{R}$. Segue que

$$\begin{aligned}
 \Phi(v)f &= \alpha'_v(0)f \\
 &= \left. \frac{d}{dt} f(p + tv) \right|_{t=0} \\
 &= \left. \frac{d}{dt} t \right|_{t=0} \\
 &= 1,
 \end{aligned}$$

implicando que $\Phi(v) \neq 0$. Logo, se $\Phi(v) = 0$, temos que $v = 0$, ou seja, Φ é injetora.

Note, em particular, que $\mathbb{R}^n$ é uma variedade diferenciável em que identificamos o espaço tangente $T_p\mathbb{R}^n$ a um ponto $p \in \mathbb{R}^n$ com o próprio $\mathbb{R}^n$

2.2 Construção de Variedades

Agora, apresentaremos algumas formas de construir outras variedades diferenciáveis a partir de variedades já existentes.

Definição 2.7. Sejam M e N duas variedades diferenciáveis, cujas estruturas diferenciáveis maximais são $\{(U_\alpha, \mathbf{x}_\alpha)\}$ e $\{(V_\beta, \mathbf{y}_\beta)\}$ respectivamente. Construa uma est.diff natural em $M \times N$.

Para cada $(p_1, p_2) \in M \times N$, defina $\mathbf{z}_{p_1, p_2} : U_{p_1} \times V_{p_2} \rightarrow M \times N$ pondo $\mathbf{z}_{p_1, p_2}(q_1, q_2) = (\mathbf{x}_{p_1}(q_1), \mathbf{y}_{p_2}(q_2))$, em que $\mathbf{x}_{p_1}$ e $\mathbf{y}_{p_2}$ são parametrizações de p_1 e p_2 respectivamente.

CONTINUAR DEMONSTRAÇÃO A PARTIR DAS NOTAS!

Também, toda variedade diferenciável M de dimensão n da origem uma diferenciável TM de dimensão $2n$, chamada de fibrado tangente de M .

Definição 2.8. Seja M^n uma variedade diferenciável. Definimos o fibrado tangente de M como o conjunto $TM = \{(p, v); p \in M, v \in T_p M\}$. Seja $\{(U_\alpha), \mathbf{x}_\alpha\}_{\alpha \in L}$ estrutura diferencial maximal de M . Construiremos uma estrutura diferencial em TM . Para cada α , defina

$$\mathbf{y}_\alpha : U_\alpha \times \mathbb{R}^n \ni (q, v) \rightarrow \left(\mathbf{x}(q), \sum v_i \left(\frac{\partial}{\partial x_i} \right)_0 \right) \in TM$$

Mostremos que $\{(U_\alpha \times \mathbb{R}^n), \mathbf{y}_\alpha\}_{\alpha \in L}$ é uma estrutura diferencial de TM . 1) $\cup \mathbf{y}_\alpha(U_\alpha \times \mathbb{R}^n) \subset TM$ trivialmente. Reciprocamente, seja $(p, v) \in TM$. Existe algum α , tal que $\mathbf{x}_\alpha : U_\alpha \rightarrow M$ é parametrização de p , com $p = \mathbf{x}(q)$. Como $v \in T_p M$, então $v = \sum u_i \left(\frac{\partial}{\partial x_i} \right)_0$. Fazendo $u = (u_1, \dots, u_n) \in \mathbb{R}^n$, temos que $\mathbf{y}_\alpha(q, u) = (p, v)$. 2) Seja $(p, v) \in \mathbf{y}_\alpha(U_\alpha \times \mathbb{R}^n) \cap \mathbf{y}_\beta(U_\beta \times \mathbb{R}^n) = W$. Então,

$$(p, v) = (\mathbf{x}_\alpha(q_\alpha), d\mathbf{x}_\alpha(v_\alpha)) = (\mathbf{x}_\beta(q_\beta), d\mathbf{x}_\beta(v_\beta))$$

com $q_\alpha \in U_\alpha$ e $q_\beta \in U_\beta$. Temos então que

$$\mathbf{y}_\beta^{-1} \circ \mathbf{y}_\alpha(q_\alpha, v_\alpha) = \mathbf{y}_\beta^{-1}(\mathbf{x}_\alpha(q_\alpha), d\mathbf{x}_\alpha(v_\alpha)) = (\mathbf{x}_\beta^{-1} \circ \mathbf{x}_\alpha(q_\alpha), d(\mathbf{x}_\beta^{-1} \circ \mathbf{x}_\alpha)_{q_\alpha}(v_\alpha))$$

Isso mostra que a mudança de coordenadas é diferenciável.

Como é comum em estruturas matemáticas, definiremos agora o conceito de variedade quociente. Neste, estabeleceremos uma relação de equivalência em uma variedade e construiremos uma estrutura diferencial no conjunto quociente por tal relação, de forma que a projeção tenha propriedades topológicas interessantes.

A relação de equivalência será feita considerando uma ação de grupo na variedade:

Definição 2.9. Dizemos que um grupo G age em uma variedade diferenciável M se existe $\varphi : G \times M \rightarrow M$, tal que: 1) Para todo $g \in G$, a função $\varphi_g : M \rightarrow M$, definida por

$\varphi_g(x) = \varphi(g, x)$ é um difeomorfismo; 2) Se $g_1, g_2 \in G$, então $\varphi_{g_1 g_2} = \varphi_{g_1} \circ \varphi_{g_2}$, isto é $\varphi(g_1, \varphi(g_2, p)) = \varphi(g_1 g_2, p)$ para todo $p \in M$.

Normalmente, denotamos $\varphi(g, p) = gp$.

Exigiremos que tal ação de grupo tenha uma propriedade interessante, para que posteriormente, a projeção seja um difeomorfismo local.

Definição 2.10. Uma ação é dita propriamente descontínua se todo $p \in M$ possui uma vizinhança $U \subset M$, tal que $U \cap g(U) = \emptyset$, para todo $g \in G$, com $g \neq e$.

Definimos então a variedade quociente, como o esperado.

Definição 2.11. Dados $p_1, p_2 \in M$, definimos a relação $p_1 \sim p_2$ se existe $g \in G$, tal que $p_1 = gp_2$. Tal relação é, trivialmente, de equivalência. Denotamos o conjunto $M/\sim$ das classes de equivalência por M/G e $\pi : M \ni p \rightarrow Gp = \bar{p} \in M/G$ a projeção.

Proposição 2.10. *Sejam M uma variedade diferencial, G um grupo e $\varphi : G \times M \rightarrow M$ uma ação de grupo propriamente descontínua. Então M/G possui estrutura diferencial, de tal modo que a projeção de M em M/G é um difeomorfismo local.*

Demonstração. Para todo $p \in M$, escolha $\mathbf{x} : V \rightarrow M$ parametrização de p , tal que $\mathbf{x}(V) \subset U$, em que $U \subset M$ é uma vizinhança de p , tal que $U \cap g(U) = \emptyset$, para todo $g \neq e$.

$\pi|_U$ é injetiva. Com efeito, se $p_1, p_2 \in U$ e $\pi(p_1) = \pi(p_2)$, então existe $g \in G$, tal que $p_1 = gp_2$. Como $gp_2 = p_1 \in U$, temos que $g = e$ e $p_1 = p_2$. Disso, segue que a aplicação $\mathbf{y} = \pi \circ \mathbf{x} : V \rightarrow M/G$ é injetiva, pois $\mathbf{x}(V) \subset U$.

A família $\{(V, \mathbf{y})\}$ das aplicações dessa forma cobre M/G . Mostremos que tal família é uma estrutura diferencial. Sejam $\mathbf{y}_i = \pi \circ \mathbf{x}_i : V_i \rightarrow M/G$, $i = 1, 2$ com $\mathbf{y}_1(V_1) \cap \mathbf{y}_2(V_2) \neq \emptyset$. Defina $\pi_i = \pi|_{\mathbf{x}_i(V_i)}$, $i = 1, 2$. Tome $q \in \mathbf{y}_1(V_1) \cap \mathbf{y}_2(V_2)$ e faça $r = \mathbf{x}_2^{-1} \circ \pi^{-1}(q) = \mathbf{y}_2^{-1}(q)$. Seja $W \subset V_2$ vizinhança de r , tal que $\pi_2 \circ \mathbf{x}_2(W) \subset \mathbf{y}_1(V_1) \cap \mathbf{y}_2(V_2)$. Então, $\mathbf{y}_1^{-1} \circ \mathbf{y}_2|_W = \mathbf{x}_1^{-1} \circ \pi_1^{-1} \circ \pi_2 \circ \mathbf{x}_2$. Basta, então, mostrar que $\pi_1^{-1} \circ \pi_2$ é diferenciável em $p_2 = \pi_2^{-1}(q)$, pois como q é arbitrário, $\mathbf{y}_1^{-1} \circ \mathbf{y}_2$ será diferenciável em $\mathbf{y}_2^{-1}(\mathbf{y}_1(V_1) \cap \mathbf{y}_2(V_2))$. Para isso, faça $p_1 = \pi_1^{-1} \circ \pi_2(p_2)$. Isso implica que existe $g \in G$, tal que $p_1 = gp_2$. Note que $\pi_1^{-1} \circ \pi_2|_{\mathbf{x}_2(W)} = \varphi_g|_{\mathbf{x}_2(W)}$. Com efeito, sendo $p \in \text{AQUI NÃO SEI COMO MOSTRAR!!!}$

O fato de que π é um difeomorfismo local segue da forma em que a estrutura diferencial acima foi construída. ■

Como de costume, exibiremos alguns exemplos clássicos de variedades, as quais podem ser construídas como quocientes de outras variedades mais simples.

Exemplos 2.4. 1. Seja $M = \mathbb{R}^n$, $G = \mathbb{Z}^n$ munido da adição de vetores e $\varphi : \mathbb{Z}^n \times M \rightarrow M$ definido por $\varphi(z, p) = z + p$. φ é uma ação de grupo descontínua. Com efeito, dado $p = (p_1, \dots, p_n) \in M$, faça $\bar{x}_i = \lfloor x_i \rfloor - x_i$ a parte fracionária de x_i , $r = \frac{1}{2} \min\{\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n\}$ e $U = B(p, r)$ a bola aberta de centro p e raio r . Dado $z =$

- $(z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{Z}^k$, com $z \neq 0$, temos que $|z + p - p| = |z| \geq \min\{|z_1|, \dots, |z_n|\} \geq 1$. Como $r < 1$, temos que $z + p \notin U$. O conjunto $T^n = M/G$ é denominado o n -toro.
2. Seja $C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x^2 + y^2 = 1, \text{ e } |z| = 1\}$ um cilindro de raio 1 e altura 2 contido em $\mathbb{R}^3$. C é uma superfície regular, logo é uma variedade diferenciável. Seja $G = \{1, -1\}$ e $\varphi : G \times C \rightarrow C$ definido por $\varphi(g, p) = gp$. É fácil ver que φ é uma ação de grupo descontínua. O conjunto M/G é denominado a faixa de mobius.
 3. De forma análoga a anterior, sendo T o toro de revolução e $G = \{1, -1\}$, a variedade T/G é denominada a garrafa de Klein.
 4. Podemos também pensar no espaço projetivo como uma variedade quociente. Seja $S^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$ a esfera n dimensional. Definindo o grupo $G = \{1, -1\}$ e a ação produto, temos que S^n/G é difeomorfo a $P^n(\mathbb{R})$. **(CITAR O MANFREDO) ****

Exemplo 2.5. O espaço $P^n(\mathbb{R})$ das retas de $\mathbb{R}^{n+1}$ que passam pela origem é o espaço quociente da esfera S^n pela relação $p \sim -p$.

2.3 Orientabilidade

Na Geometria Diferencial o conceito de orientabilidade é comumente definido a partir de um mapa de Gauss. Isto é, uma superfície $S \subset \mathbb{R}^3$ é dita orientável se existe uma aplicação contínua $N : S \rightarrow S^2$, tal que $N(p)$ é ortogonal a $T_p S$. É possível mostrar que uma superfície é orientável se, e somente se, existe uma família de parametrizações $\{(U_\alpha, \mathbf{x}_\alpha)\}$ de S , tal que $\det(d(\mathbf{x}_\alpha^{-1} \circ \mathbf{x}_\beta)) > 0$ para todo par de parametrizações cuja interseção das imagens não é vazia. Essa equivalência motiva a definição de orientabilidade para variedades diferenciáveis:

Definição 2.12. Seja M uma variedade diferenciável. M é dita orientável se existe uma estrutura diferencial $\{(U_\alpha, \mathbf{x}_\alpha)\}_{\alpha \in L}$ tal que:

- (i) Para todo $\alpha, \beta \in L$ com $\mathbf{x}_\alpha(U_\alpha) \cap \mathbf{x}_\beta(U_\beta) = W \neq \emptyset$, temos que $\det(d(\mathbf{x}_\beta^{-1} \circ \mathbf{x}_\alpha|_{\mathbf{x}_\alpha^{-1}(W)})_q) > 0$ para todo $q \in \mathbf{x}_\alpha^{-1}(W)$.

Do contrário, M é dita não orientável.

Uma escolha de estrutura diferencial que satisfaz (i) é chamada de orientação de M . Duas estruturas diferenciáveis que satisfazem (i) são ditas de mesma orientação se sua união ainda satisfaz (i).

Podemos interpretar uma orientação de uma variedade diferenciável orientável, como uma escolha consistente de orientação de todos os seus espaços tangentes. Com efeito, se M^n é uma variedade diferenciável e $\{(U_\alpha, \mathbf{x}_\alpha)\}$ uma orientação de M , para todo $p \in M$, e quaisquer parametrizações $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$ de p , as bases de $T_p M$ induzidas por $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$, fazendo

$B_1 = \{d\mathbf{x}_{q_1}(e_i); i = 1, \dots, n\}$ e $B_2 = \{d\mathbf{y}_{q_2}(e_i); i = 1, \dots, n\}$ são de mesma orientação, pois a matriz de mudança de bases é igual a $d(\mathbf{y}^{-1} \circ \mathbf{x})$ a qual tem determinante positivo.

Um simples critério para verificar a orientabilidade é dado pela próxima proposição.

Proposição 2.11. *Se M é coberta por duas vizinhanças coordenadas, cuja interseção é conexa, então M é orientável.*

Demonstração. Sejam $\mathbf{x}_i : U_i \rightarrow V_i$, $i = 1, 2$ parametrizações de M , tais que $\mathbf{x}_1(U_1) \cap \mathbf{x}_2(U_2)$ é conexo e $\mathbf{x}_1(U_1) \cup \mathbf{x}_2(U_2) = M$. Se $\det d(\mathbf{x}_\alpha^{-1} \circ \mathbf{x}_\beta) > 0$ já está demonstrado. Do contrário, seja $U'_2 = \{(x_1, \dots, x_n); (-x_1, x_2, \dots, x_n) \in U_2\}$ e $\mathbf{x}'_2(x_1, \dots, x_n) = \mathbf{x}_2(-x_1, x_2, \dots, x_n)$. Note que $\mathbf{x}'_2(U'_2) = \mathbf{x}_2(U_2)$ e $\mathbf{x}_1^{-1} \circ \mathbf{x}'_2 = \mathbf{x}_1^{-1} \circ \mathbf{x}_2 \circ T$, com $T : \mathbb{R}^n \ni (x_1, \dots, x_n) \rightarrow (-x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$.

Logo, para todo $q \in \mathbf{x}_2'^{-1}(V_1 \cap V_2)$, temos que $\det d(\mathbf{x}_1^{-1} \circ \mathbf{x}'_2)_q = \det d(\mathbf{x}_1^{-1} \circ \mathbf{x}_2)_{T(q)} \det T_q = -\det d(\mathbf{x}_1^{-1} \circ \mathbf{x}_2)_{T(q)}$. Como assumimos que $\det d(\mathbf{x}_1^{-1} \circ \mathbf{x}_2) \leq 0$, existe $q \in \mathbf{x}_2'^{-1}(V_1 \cap V_2)$, tal que $\det d(\mathbf{x}_1^{-1} \circ \mathbf{x}_2)_q < 0$. Como $V_1 \cap V_2$ é conexo, pelo teorema do valor intermediário, $\det d(\mathbf{x}_1^{-1} \circ \mathbf{x}_2) < 0$, implicando que $\det d(\mathbf{x}_1^{-1} \circ \mathbf{x}'_2) > 0$, ou seja, M é orientável. ■

Com esse critério, é fácil verificar que a esfera é orientável:

Proposição 2.12. *Seja $S^n = \{(x_1, \dots, x_{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1}; \sum x_i^2 = 1\}$. S^n é orientável. Basta considerar as projeções estereográficas do polo norte e do polo sul.*

Como todo espaço vetorial finitamente gerado tem apenas duas orientações, faz sentido pensar se existe algum limitante para o número de orientações de uma variedade diferenciável. Primeiro, notemos que se uma variedade é orientável, então ela possui pelo menos duas orientações. Intuitivamente, basta selecionar uma orientação da variedade, a qual é uma orientação de todos os planos tangentes da mesma e inverter a orientação do plano tangente.

lemma: Toda variedade orientável admite pelo menos duas orientações.

Demonstração. Seja M^n uma variedade orientável, e $\{(U_\alpha, \mathbf{x}_\alpha)\}_{\alpha \in L}$ uma orientação de M . Para cada $\alpha \in L$, defina $U'_\alpha = \{(x_1, \dots, x_n); (-x_1, x_2, \dots, x_n) \in U_\alpha\}$ e

$$\mathbf{x}'_\alpha : U'_\alpha \ni (x_1, \dots, x_n) \rightarrow \mathbf{x}_\alpha(-x_1, x_2, \dots, x_n) \in M$$

Note que $\{(U'_\alpha, \mathbf{x}'_\alpha)\}_{\alpha \in L}$ é estrutura diferencial de M . Mostremos que tal estrutura é uma orientação, a qual é diferente de $\{(U_\alpha, \mathbf{x}_\alpha)\}_{\alpha \in L}$. Sejam $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, definida por $T(x_1, \dots, x_n) = (-x_1, x_2, \dots, x_n)$ e α, β tais que $\mathbf{x}'_\alpha(U'_\alpha) \cap \mathbf{x}'_\beta(U'_\beta) = W \neq \emptyset$. Temos que

$$\mathbf{x}'_\beta^{-1} \circ \mathbf{x}'_\alpha(x_1, \dots, x_n) = \mathbf{x}'_\beta^{-1} \circ \mathbf{x}_\alpha(-x_1, x_2, \dots, x_n) = \mathbf{x}'_\beta^{-1} \circ \mathbf{x}_\alpha \circ T(x_1, \dots, x_n)$$

Também, existe um único $(y_1, \dots, y_n) \in U'_\beta$, tal que $\mathbf{x}_\beta(-y_1, y_2, \dots, y_n) = \mathbf{x}_\alpha(-x_1, x_2, \dots, x_n)$. Logo,

$$\mathbf{x}'^{-1}_\beta \circ \mathbf{x}'_\alpha(x_1, \dots, x_n) = \mathbf{x}'^{-1}_\beta \circ \mathbf{x}_\beta(-y_1, y_2, \dots, y_n) = \mathbf{x}'^{-1}_\beta \circ \mathbf{x}'_\beta(y_1, \dots, y_n) = (y_1, \dots, y_n)$$

Notando que $\mathbf{x}_\beta^{-1} \circ \mathbf{x}_\alpha(-x_1, x_2, \dots, x_n) = (-y_1, y_2, \dots, y_n) = T \circ \mathbf{x}'^{-1}_\beta \circ \mathbf{x}'_\alpha(x_1, \dots, x_n) = T \circ \mathbf{x}'^{-1}_\beta \circ \mathbf{x}'_\alpha \circ T(-x_1, x_2, \dots, x)$ conclui-se que $\mathbf{x}'^{-1}_\beta \circ \mathbf{x}'_\alpha = T^{-1} \circ \mathbf{x}_\beta^{-1} \circ \mathbf{x}_\alpha \circ T^{-1}$, e portanto,

$$\det(d(\mathbf{x}'^{-1}_\beta \circ \mathbf{x}'_\alpha)) = \det(d(T^{-1} \circ \mathbf{x}_\beta^{-1} \circ \mathbf{x}_\alpha \circ T^{-1})) = \det(d(T^{-1})) \det(d(\mathbf{x}_\beta^{-1} \circ \mathbf{x}_\alpha)) \det(d(T^{-1})) = \det(d(\mathbf{x}_\beta^{-1}))$$

Resta mostrar que a orientação é diferente, isto é, $\{(U_\alpha, \mathbf{x}_\alpha)\} \cup \{(U'_\alpha, \mathbf{x}'_\alpha)\}$ não é orientação. Com efeito, temos que $\mathbf{x}'_\alpha(U'_\alpha) \cap \mathbf{x}_\alpha(U_\alpha) \neq \emptyset$ e $\mathbf{x}'^{-1}_\alpha \circ \mathbf{x}_\alpha = T|_{U_\alpha}$. Logo, $\det(d(\mathbf{x}'^{-1}_\alpha \circ \mathbf{x}_\alpha)) = \det(dT^{-1}) = -1 < 0$. ■

Agora, no caso de M ser conexa, essas duas orientações são as únicas.

Proposição 2.13. *Se M é conexa e orientável, tem exatamente duas orientações*

Demonstração. Sejam $\{(U_\alpha, \mathbf{x}_\alpha)\}$ uma orientação de M e $\{(U'_\alpha, \mathbf{x}'_\alpha)\}$ a orientação obtida no lema anterior. Suponha, por absurdo, que exista uma orientação $\{(V_\alpha, \mathbf{y}_\alpha)\}$ de M distinta das anteriores. Se $\mathbf{y}_\alpha, \mathbf{x}_\beta, \mathbf{x}'_\beta$ são parametrizações de um ponto $p \in M$, então, tomando q tal que $\mathbf{y}_\alpha(q) = p$, temos, $\det d(\mathbf{x}_\beta^{-1} \circ \mathbf{y}_\alpha)_q < 0$ se, e somente se, $\det d(\mathbf{x}'_\beta \circ \mathbf{y}_\alpha)_q > 0$ (1). Sejam $A = \{p \in M; \text{existem parametrizações } \mathbf{y}_\beta, \mathbf{x}_\alpha \text{ de } p, \text{ tal que } \det d(\mathbf{y}_\beta^{-1} \circ \mathbf{x}_\alpha) < 0\}$ e $B = \{p \in M; \text{existem parametrizações } \mathbf{y}_\alpha, \mathbf{x}'_\beta \text{ de } p, \text{ tal que } \det d(\mathbf{y}_\alpha^{-1} \circ \mathbf{x}'_\beta) < 0\}$. Ambos os conjuntos são abertos, pois a determinante da derivada das trocas de coordenadas é contínua. Também, por (1), os conjuntos A e B são disjuntos. Não é difícil ver que $M = A \cup B$ e portanto são uma cisão de M . Como M é conexo, um dos conjuntos precisa ser vazio, e o outro igual a M . Isso implica que a terceira orientação não é distinta das duas primeiras, o que é um absurdo. ■

CITAR ALGUMA DEFINIÇÃO DE COMPONENTE CONEXA Desse fato segue que uma variedade orientável com n partes conexas admite 2^n orientações. Primeiro, mostremos que sendo $N \subseteq M$ uma parte conexa de M , então N é uma variedade diferenciável conexa. Fixemos uma orientação $\{(U_\alpha, \mathbf{x}_\alpha)\}$ de M . Dado $p \in N$, existe uma parametrização $\mathbf{x}_p : U_p \rightarrow M$ de p em M . Fazemos $\overline{\mathbf{x}}_p = \mathbf{x}_p|_{\overline{U_p}}$, onde $\overline{U_p} = \mathbf{x}_p^{-1}(U_p \cap N)$, o qual é aberto. Dessa forma, construímos uma estrutura diferencial de N , a qual também é uma orientação. Pelo resultado acima, N admite duas orientações. Note que se orientarmos cada parte conexa de M conforme feito acima e considerarmos a união dessas orientações, teremos uma orientação de M . Isso mostra o desejado.

Como a orientabilidade é uma propriedade que depende da diferenciabilidade das parametrizações, é de se esperar que a orientabilidade seja preservada por difeomorfismos. Isso é de fato verdade, conforme demonstrado no próximo resultado.

Proposição 2.14. *Sejam M_1 e M_2 variedades diferenciáveis e $\varphi : M_1 \rightarrow M_2$ um difeomorfismo. Então M_1 é orientável se, e somente se M_2 é orientável.*

Demonstração. Basta mostrar que se M_1 for orientável, então M_2 também o será. Tomemos, então, $\{(U_\alpha, \mathbf{x}_\alpha)\}$ uma orientação de M_1 . Note que $\{(U_\alpha, \varphi \circ \mathbf{x}_\alpha)\}$ é uma estrutura diferencial de M_2 . Mostremos que tal coleção é uma orientação. Com efeito, sejam α, β tais que $\varphi \circ \mathbf{x}_\alpha(U_\alpha) \cap \varphi \circ \mathbf{x}_\beta(U_\beta) = W \neq \emptyset$. Temos que $\mathbf{x}_\alpha(U_\alpha) \cap \mathbf{x}_\beta(U_\beta) \neq \emptyset$, logo, $\det d((\varphi \circ \mathbf{x}_\alpha)^{-1} \circ (\varphi \circ \mathbf{x}_\beta)) = \det d(\mathbf{x}_\alpha^{-1} \circ \varphi^{-1} \circ \varphi \circ \mathbf{x}_\beta) = \det d(\mathbf{x}_\alpha^{-1} \circ \mathbf{x}_\beta) > 0$. ■

AQUI EXISTE A OPÇÃO DE APRESENTAR MAIS ALGUNS CRITÉRIOS DE ORIENTABILIDADE, MONSTRANDO QUE A MOBIUS E A KLEIN NÃO SÃO ORIENTÁVEIS (COMO QUOCIENTES), MAS O TORO É

2.4 Campos de Vetores

Definição 2.13. Um campo de vetor W em uma variedade diferenciável M é uma correspondência que associa cada ponto $p \in M$, um vetor $W(p) \in T_p M$.

Podemos pensar em W como uma aplicação $W : M \rightarrow TM$, tal que $W(p) = (p, v) \in TM$.

Pensar em um campo de vetores como uma aplicação no fibrado tangente é útil para definir diferenciabilidade:

Definição 2.14. Dizemos que W é diferenciável se for diferenciável como uma aplicação de M em TM .

Essa definição fica mais natural com a próxima proposição:

Proposição 2.15. *Seja $\mathbf{x} : U \rightarrow M$ uma parametrização de M . Dado $p \in \mathbf{x}(U)$, podemos escrever $W(p) = \sum_{i=1}^n a_i(p) \frac{\partial}{\partial x_i}(p)$, onde $\frac{\partial}{\partial x_i}(p) = d\mathbf{x}_p(e_i)$. Nessa expressão, temos que W é diferenciável se, e somente se, cada $a_i : U \rightarrow \mathbb{R}$ é diferenciável.*

Demonstração. Supondo W diferenciável, temos que é diferenciável como uma função de M em TM , isto é, sendo $\mathbf{x}$ uma parametrização de M , existe uma parametrização $\mathbf{y}$ de TM , tal que $\mathbf{y}(q, v) = \left(\mathbf{y}'(\mathbf{q}), \sum \mathbf{v}_i \frac{\partial}{\partial \mathbf{y}_i}(\mathbf{q}) \right)$ e $\mathbf{y}^{-1} \circ W \circ \mathbf{x} : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow V \subset \mathbb{R}^{2n}$ é diferenciável. Note que $\mathbf{y}^{-1}(W(\mathbf{x}(q))) = \mathbf{y}^{-1} \left(\mathbf{x}(q), \sum a_i(\mathbf{x}(q)) \frac{\partial}{\partial x_i}(\mathbf{x}(q)) \right)$. Escrevendo

$$\sum a_i(\mathbf{x}(q)) \frac{\partial}{\partial x_i}(\mathbf{x}(q)) = \sum b_i(\mathbf{x}(q)) \frac{\partial}{\partial y_i}(\mathbf{x}(q)),$$

em que $(b_1, \dots, b_n) = \left[\frac{\partial y_j}{\partial x_i} \right] (a_1, \dots, a_n)$, temos que $\mathbf{y}^{-1} \circ W \circ \mathbf{x}(q) = (\mathbf{y}'^{-1} \circ \mathbf{x}(q), b_1(\mathbf{x}(q)), \dots, b_n(\mathbf{x}(q)))$. Como tal função é diferenciável, temos que cada $b_i \circ \mathbf{x}$ é diferenciável e, conseqüentemente, cada a_i também o é.

Para a recíproca, basta notar que cada $\frac{\partial}{\partial x_i}(p) = d\mathbf{x}_{\mathbf{x}^{-1}(p)}(e_i)$ é diferenciável e prosseguir de forma análoga. ■

Também pode ser conveniente considerar um campo de vetores como uma transformada de funções da seguinte maneira:

Observação 2.1. Seja $\mathcal{D}$ o conjunto das funções reais diferenciáveis definidas em M e $\mathcal{F}$ o conjunto das funções reais definidas em M (não necessariamente diferenciáveis). Dados $p \in M$, um campo de vetores W , uma vizinhança parametrizada $\mathbf{x}(U)$ e escrevendo $W(p) = \sum a_i(p) \frac{\partial}{\partial x_i}(p)$, para qualquer $f \in \mathcal{D}$, temos, identificando a expressão em coordenadas de f na parametrização $\mathbf{x}$ como a própria f ,

$$W(p)f = \left(\sum a_i(p) \frac{\partial}{\partial x_i}(p) \right) f = \sum a_i(p) \frac{\partial f}{\partial x_i}(p).$$

Definimos então $Wf = \sum a_i \frac{\partial f}{\partial x_i}$ e pensamos em $W : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{F}$. Note que W é diferenciável se, e só se, $Wf \in \mathcal{D}$ para todo $f \in \mathcal{D}$. Com efeito, W é diferenciável se, e só se, cada a_i é diferenciável. Como f é diferenciável, cada $\frac{\partial f}{\partial x_i}(p)$ é diferenciável. Logo, se W é diferenciável, Wf também o é. Reciprocamente, para cada i , tomamos, em uma vizinhança de p , $f_i(q) = t$, tal que $\mathbf{x}(q' + te_i) = p$, com $q' = \mathbf{x}^{-1}(p)$. Segue que $\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(p) = \delta_{i,j}$ e, portanto, $Wf_i = a_i$.

Para evitar ambiguidades, denotamos, para todo $p \in M$, $W(p) = W_p$. Dessa forma, dado $f \in \mathcal{D}$, temos $Wf(p) = W(p)f = W_p f$.

Dada uma função diferenciável $f : M \rightarrow \mathbb{R}$, podemos pensar em Wf como a derivada de f na direção de W . Com efeito, fixando $p \in M$, se $\alpha : (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow M$ é uma curva diferenciável, com $\alpha(0) = p$ e $\alpha'(0) = W(p)$, escrevendo $\tilde{\alpha} = \mathbf{x}^{-1} \circ \alpha$ e $\tilde{f} = f \circ \mathbf{x}$,

$$\left. \frac{d}{dt} f \circ \alpha(t) \right|_{t=0} = \left. \frac{d}{dt} \tilde{f} \circ \tilde{\alpha}(t) \right|_{t=0} = \sum_{i=1}^n \tilde{\alpha}'_i(0) \frac{\partial \tilde{f}}{\partial x_i}(\tilde{\alpha}_i(0)).$$

Note que $\tilde{\alpha}'_i(0) = a_i(p)$. O resultado segue identificando $\frac{\partial f}{\partial x_i}(p)$ com $\frac{\partial \tilde{f}}{\partial x_i}(\mathbf{x}^{-1}(p))$.

Um exemplo interessante surge quando consideramos $M = \mathbb{R}^n$, identificamos, para todo $p \in \mathbb{R}^n$ o espaço tangente $T_p \mathbb{R}^n$ com $\mathbb{R}^n$ e definimos $W_p = e_i$. Dada qualquer função diferenciável $f : U \rightarrow \mathbb{R}$, onde U é um aberto de $\mathbb{R}^n$, temos que $Wf = \frac{\partial f}{\partial x_i}$.

Se W for diferenciável, como mostrado acima, $Wf \in \mathcal{D}$. Logo, tem sentido considerar a função $VWf = V(Wf)$, onde V é outro campo vetorial em M . Isso nos permite pensar na composta de campos vetoriais, definindo $(VW)f = V(Wf)$. Entretanto, perceba que a composta de campos vetoriais não é um campo vetorial, pois sua expressão em coordenadas envolve derivadas de segunda ordem. Isso é exemplificado na próxima proposição, a qual simultaneamente, introduz um outro campo vetorial a partir de dois já existentes.

Lema 2.5. *Sejam X e Y campos vetoriais diferenciáveis em uma variedade diferenciável*

M . Existe um único campo vetorial Z , tal que para todo $f \in \mathcal{D}$, temos que $Zf = (XY - YX)f$.

Demonstração. Primeiro mostremos a unicidade. Seja Z um campo que satisfaz a hipótese, $\mathbf{x} : U \rightarrow M$ uma parametrização de $p \in M$, $X = \sum a_i \frac{\partial}{\partial x_i}$ e $Y = \sum b_j \frac{\partial}{\partial x_j}$. Para todo $f \in \mathcal{D}$, temos

$$\begin{aligned} XYf &= X \left(\sum_j b_j \frac{\partial f}{\partial x_j} \right) \\ &= \sum_i a_i \left(\frac{\partial \sum_j b_j \frac{\partial f}{\partial x_j}}{\partial x_i} \right) \\ &= \sum_i a_i \sum_j \frac{\partial b_j \frac{\partial f}{\partial x_j}}{\partial x_i} \\ &= \sum_i a_i \sum_j \left(b_j \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} + \frac{\partial b_j}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_j} \right) \\ &= \sum_{i,j} a_i b_j \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} + \sum_{i,j} a_i \frac{\partial b_j}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_j}. \end{aligned}$$

De forma análoga, temos que

$$YXf = \sum_{i,j} a_i b_j \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} + \sum_{i,j} b_j \frac{\partial a_i}{\partial x_j} \frac{\partial f}{\partial x_i}$$

Assim,

$$Zf = XYf - YXf = \sum_{i,j} \left(a_i \frac{\partial b_j}{\partial x_i} - b_j \frac{\partial a_i}{\partial x_j} \right) \frac{\partial f}{\partial x_i} \quad (*)$$

trocando índices do somatório de baixo.

Agora, mostremos a existência: Defina Z_α em cada vizinhança parametrizada $\mathbf{x}_\alpha(U_\alpha)$ de M utilizando a expressão (*). Pela unicidade, se α, β são índices tais que $\mathbf{x}_\alpha(U_\alpha) \cap \mathbf{x}_\beta(U_\beta) \neq \emptyset$, então $Z_\alpha = Z_\beta$ em $\mathbf{x}_\alpha(U_\alpha) \cap \mathbf{x}_\beta(U_\beta)$. Podemos então definir Z em toda a variedade M , pondo $Zf = Z_\alpha f$. ■

Intuitivamente, o campo colchetes mede a “não comutatividade” dos campos X e Y . O colchetes é uma operação bem interessante em uma Álgebra de Lie, a qual será apresentada posteriormente. Para o desenvolvimento da teoria das Geodésicas, os colchetes serão de grande importância quando analisarmos as conexões, nos auxiliando na classificação de algumas delas. A demonstração acima faz uso de uma estratégia bem interessante, onde primeiro assumimos a existência e demonstramos a unicidade, depois definimos localmente os colchetes, utilizando-se da unicidade para garantir uma boa definição global. Essa estratégia se repetirá diversas vezes durante esse texto, e portanto, vale a pena enunciá-la:

Lema 2.6. *ENUNCIAR E DEMONSTRAR*

Proposição 2.16. *Sejam X, Y, Z campos vetoriais diferenciáveis em M , $a, b \in \mathbb{R}$ e $f, g : M \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciáveis. Então:*

1. $[X, Y] = -[Y, X];$
2. $[aX + bY, Z] = a[X, Z] + b[Y, Z];$
3. $[[X, Y], Z] + [[Y, Z], X] + [[Z, X], Y] = 0;$
4. $[fX, gY] = fg[X, Y] + fX(g)Y - gY(f)X;$

Demonstração. 1. $[X, Y] = XY - YX = -(YX - XY) = -[Y, X].$

2.

$$\begin{aligned}
 [aX + bY, Z] &= (aX + bY)Z - Z(aX + bY) \\
 &= aXZ + bYZ - Z(aX) - Z(bY) \\
 &= aXZ + bYZ - aZX - bZY \\
 &= a(XZ - ZX) + b(YZ - ZY) \\
 &= a[X, Z] + b[Y, Z]
 \end{aligned}$$

4. GIGANTE 5.

$$\begin{aligned}
 [fX, gY] &= fX(gY) - gY(fX) \\
 &= f \sum a_i \frac{\partial gY}{\partial x_i} - g \sum b_j \frac{\partial fX}{\partial x_j} \\
 &= f \sum a_i \left(g \frac{\partial Y}{\partial x_i} + \frac{\partial g}{\partial x_i} Y \right) - g \sum b_j \left(f \frac{\partial X}{\partial x_j} + \frac{\partial f}{\partial x_j} X \right) \\
 &= \sum a_i f g \frac{\partial Y}{\partial x_i} + a_i f \frac{\partial g}{\partial x_i} Y - b_j f g \frac{\partial X}{\partial x_j} - b_j g \frac{\partial f}{\partial x_j} X \\
 &= \sum a_i f g \frac{\partial Y}{\partial x_i} + \sum \left[a_i f \frac{\partial g}{\partial x_i} \right] Y - \sum b_j f g \frac{\partial X}{\partial x_j} - \sum \left[b_j g \frac{\partial f}{\partial x_j} \right] X \\
 &= f g \sum a_i \frac{\partial Y}{\partial x_i} + f \sum \left[a_i \frac{\partial g}{\partial x_i} \right] Y - f g \sum b_j \frac{\partial X}{\partial x_j} - g \sum \left[b_j \frac{\partial f}{\partial x_j} \right] X \\
 &= f g XY + f X(g)Y - f g YX - g Y(f)X \\
 &= f g [XY - YX] + f X(g)Y - g Y(f)X \\
 &= f g [X, Y] + f X(g)Y - g Y(f)X.
 \end{aligned}$$

■


Antes de apresentarmos outra interpretação do colchete, convém apresentar uma generalização do Teorema de Equações diferenciais do $\mathbb{R}^n$ para variedades e alguns lemas:

Teorema 2.2. *Seja X um campo diferenciável de vetores em uma variedade diferenciável M e seja $p \in M$. Existe uma vizinhança $U \subset M$ de p , um intervalo $(-\delta, \delta)$, com $\delta > 0$ e $\varphi : (-\delta, \delta) \times U \rightarrow M$, tais que a curva $t \rightarrow \varphi(t, q)$ definida para todo $t \in (-\delta, \delta)$ é a única curva que satisfaz $\frac{\partial \varphi}{\partial t}(t, q) = X(\varphi(t, q))$ e $\varphi(0, q) = q$.*

Uma curva $\alpha : (-\delta, \delta) \rightarrow M$ que satisfaz as condições $\alpha'(t) = X(\alpha(t))$ e $\alpha(0) = q$ é chamada de trajetória do campo X que passa por q para $t = 0$.

Dizemos que $\varphi_t : M \rightarrow M$, definida por $\varphi_t(q) = \varphi(t, q)$ é o fluxo local de X .

Figura 2.2: Diagrama do fluxo local de um campo vetorial X em uma variedade diferenciável M .



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Lema 2.7. *Seja M uma variedade diferenciável, $\varphi : M \rightarrow M$ uma aplicação diferenciável, $v \in T_p M$ e $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciável. Então, $(d\varphi_p(v)f) = v(f \circ \varphi(p))$.*

Demonstração. Com efeito, seja $\alpha : (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow M$ uma curva diferenciável, com $\alpha(0) = p$ e $\alpha'(0) = v$. Temos que

$$\begin{aligned}
 (d\varphi_p(v)f) &= (d\varphi_p(\alpha'(0))f) \\
 &= (\varphi \circ \alpha)'(0)f \\
 &= (f \circ (\varphi \circ \alpha))'(0) \\
 &= ((f \circ \varphi) \circ \alpha)'(0) \\
 &= \alpha'(0)(f \circ \varphi) \\
 &= v(f \circ \varphi)
 \end{aligned}$$

■

Lema 2.8. *Seja $h : (-\delta, \delta) \times U \rightarrow \mathbb{R}$ uma aplicação diferenciável, com $h(0, q) = 0$, para todo $q \in U$. Existe $g : (-\delta, \delta) \times U \rightarrow \mathbb{R}$, com $h(t, q) = tg(t, q)$. Em particular, $g(0, q) = \frac{\partial h(t, q)}{\partial t} \Big|_{t=0}$*

Demonstração. Escrevendo $h(s, q)$, defina

$$g(t, q) = \int_0^1 \frac{\partial h}{\partial s}(ts, q) ds.$$

Note que

$$tg(t, q) = \int_0^1 \frac{\partial h}{\partial s}(ts, q) t ds$$

e que

$$h(t, q) = \int_0^t \frac{\partial h}{\partial s}(s, q) ds.$$

Fazendo $s = tu$, temos que $ds = tdu$, logo, aplicando uma substituição por u , segue que

$$h(t, q) = \int_0^1 \frac{\partial h}{\partial s}(tu, q) t du = tg(t, q).$$

■

Proposição 2.17. *Sejam X e Y campos diferenciáveis de vetores em uma variedade diferenciável M . Seja $p \in M$ e φ_t o fluxo local de X em uma vizinhança U de p . Então,*

$$[X, Y]_p = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} (Y_{\varphi_t(p)} - d\varphi_{t_p} Y_p)$$

Demonstração. Seja f uma função real diferenciável em uma vizinhança de p . Defina $h(t, q) := f(\varphi_t(q)) - f(q)$. Note que $h(0, q) = 0$, logo, pelo lema Lema 2.8, existe g , tal que $tg(t, q) = f(\varphi_t(q)) - f(q)$. Segue que

$$f \circ \varphi_t(q) = tg(t, q) + f(q). \quad (*)$$

Também pelo lema, temos que

$$\begin{aligned} g(0, q) &= \frac{\partial h(t, q)}{\partial t} \Big|_{t=0} = \frac{\partial f \circ \varphi_t(q) - f(q)}{\partial t} \Big|_{t=0} \\ &= \frac{\partial f \circ \varphi(t, q)}{\partial t} \Big|_{t=0} \\ &\stackrel{\text{def}}{=} \frac{\partial \varphi}{\partial t}(0, q) f \\ &= X(\varphi(0, q)) f \\ &= X(q) f = X_q f = Xf(q) \end{aligned} \quad (**)$$

Do Lema 2.7, segue que

$$\begin{aligned}
 (d\varphi_{t_p} Y_p) f &= Y_p(f \circ \varphi_t) \\
 &\stackrel{(*)}{=} Y_p(tg(t, \cdot) + f) \\
 &= Y_p f + Y_p(tg(t, \cdot)) \\
 &= (Yf)(p) + (tYg(t, \cdot))(p) \quad (***)
 \end{aligned}$$

Também, convém notar que, sendo g uma função diferenciável em uma vizinhança de p , temos que

$$\begin{aligned}
 X_p g &= X_{\varphi_0(p)} g = X(\varphi_0(p)) g \\
 &= \frac{\partial \varphi}{\partial t}(0, p) g \\
 &= \left. \frac{\partial (g \circ \varphi(t, p))}{\partial t} \right|_{t=0} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(\varphi(h, p)) - g(p)}{h} \quad (****)
 \end{aligned}$$

Segue que

$$\begin{aligned}
 \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} (Y_{\varphi_t(p)} - d\varphi_{t_p} Y_p) f &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} ((Y_{\varphi_t(p)}) f - (d\varphi_{t_p} Y_p) f) \\
 &\stackrel{(***)}{=} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} \{ (Y_{\varphi_t(p)}) f - [(Yf)(p) + (tYg(t, \cdot))(p)] \} \\
 &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{Y_{\varphi_t(p)} f - (Yf)(p)}{t} - (Yg(t, \cdot))(p) \\
 &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{Yf(\varphi_t(p)) - (Yf)(p)}{t} - (Yg(t, \cdot))(p) \\
 &\stackrel{****}{=} X_p Yf - \lim_{t \rightarrow 0} (Yg(t, \cdot))(p) \\
 &= X_p Yf - (Yg(0, \cdot))(p) \\
 &\stackrel{(**)}{=} X_p Yf - (YXf(\cdot))(p) \\
 &= X_p Yf - YXf(p) \\
 &= XYf(p) - YXf(p) \\
 &= (XYf - YXf)(p) \\
 &= (XY - YX)_p f \\
 &= [X, Y]_p f
 \end{aligned}$$


o que concluí a demonstração. ■

Observe que $Y_{\varphi_t(p)}$ indica o valor do campo Y ao longo de uma trajetória do campo X , partindo de p após um tempo t , enquanto $(d\varphi_t)_p(Y_p)$ indica o deslocamento infinitesimal

ao seguir uma trajetória do campo X por um tempo t , partindo de um ponto a uma distância infinitesimal de p na direção de Y_p .

MELHORAR ESSA DESCRIÇÃO AQUI, CREIO NAO ESTAR CLARO, PENSAREI MAIS SOBRE DEPOIS!

Figura 2.3: Diagrama do operador colchetes.



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Finalizaremos esse capítulo apresentando alguns resultados topológicos acerca das variedades diferenciáveis. Eles serão úteis posteriormente para mostrar que toda variedade diferenciável possui uma métrica.

Retomemos, primeiramente, alguns axiomas topológicos:

Axioma 2.1.

- **Hausdorff:** Dados $p, q \in M$ distintos, existem vizinhanças U e V de p e q respectivamente, tais que $U \cap V = \emptyset$.
- **Base enumerável:** Existe um conjunto enumerável $\mathcal{B}$ de abertos de M , tal que todo aberto U de M pode ser escrito como reunião enumerável de elementos de $\mathcal{B}$.

Definição 2.15. Seja M uma variedade diferenciável e $\{V_\alpha\}$ uma família de abertos de M , com $\cup_\alpha V_\alpha = M$. Tal família é dita localmente finita se para todo $p \in M$ existe U vizinhança de p , tal que $U \cap V_\alpha \neq \emptyset$ para uma quantidade finita de α .

Definição 2.16. Seja $f : M \rightarrow \mathbb{R}$. Dizemos que o suporte de f é o fecho do conjunto $f^{-1}(\mathbb{R} - \{0\})$ e escrevemos $\text{supp}(f)$.

Definição 2.17. Seja $\{f_\alpha\}$ uma família de funções reais definidas em M . $\{f_\alpha\}$ é dita partição diferenciável da unidade se:

1. Para todo α , $f_\alpha \geq 0$ e $\text{supp}(f_\alpha) \subset V_\alpha$, onde $V_\alpha = X_\alpha(U_\alpha)$ é uma vizinhança parametrizada;
2. A família $\{V_\alpha\}$ é localmente finita;

3. $\sum_{\alpha} f_{\alpha}(p) = 1$, para todo $p \in M$.

A afirmação 3) tem sentido pois, dado $p \in M$, existe uma vizinhança U de p , tal que $U \cap V_{\alpha} \neq \emptyset$ para uma quantidade finita de α , isto é, existe um conjunto $A = \{\alpha_1, \dots, \alpha_k\}$, tal que $U \cap V_{\alpha} = \emptyset$ se, e somente se, $\alpha \in A$. Logo, se $\alpha \notin A$, temos que $U \cap V_{\alpha} = \emptyset$, implicando que $p \notin V_{\alpha}$, isto é, $p \notin \text{supp}(f_{\alpha})$ e, portanto, $f_{\alpha}(p) = 0$. Dessa forma, $\sum_{\alpha} f_{\alpha}(p) = \sum_{i=1}^k f_{\alpha_i}(p)$.

Teorema 2.3. *Uma variedade diferenciável M possui partição diferenciável da unidade se, e somente se, toda componente conexa de M é Hausdorff e tem base enumerável.*

Demonstração. Consultar **PLACEHOLDER: INCERIR REFERÊNCIA** ■

Além desses, convém mencionar a existência das funções bump, as quais são úteis quando temos algo definido localmente e quisermos estender a definição continuamente.

Lema 2.9. *Considerando o espaço euclidiano $\mathbb{R}^n$, dados $p \in \mathbb{R}^n$ e uma bola aberta $B(p, r) \subset \mathbb{R}^n$, existe uma vizinhança U de p , tal que seu fecho $\overline{U} \subset B(p, r)$ e uma função diferenciável $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, tais que $0 \leq f(q) \leq 1$ para todo $q \in \mathbb{R}^n$ e*

$$f(q) = \begin{cases} 1, & \text{se } q \in \overline{U} \\ 0, & \text{se } q \notin B_r(p). \end{cases}$$

Um fato análogo pode ser demonstrado para variedades diferenciáveis.

Com isso, exibimos todas as preliminares acerca das variedades diferenciáveis necessárias.

Capítulo 3

Métricas e Conexões Afins

O objetivo desse capítulo é o de explicitar a noção de métrica riemanniana, a qual generaliza a primeira forma fundamental estudada em Geometria Diferencial. Aqui, deixamos de estudar topologia diferencial e passamos, de fato, a estudar Geometria Riemanniana, quando analisamos variedades riemannianas, as quais são variedades diferenciáveis munidas de uma métrica.

Uma métrica riemanniana em uma variedade diferenciável é uma regra para definir um produto interno definido positivo em cada espaço tangente, que varia diferenciavelmente em um sentido a ser formalizado. A grosso modo, uma métrica riemanniana permite calcular distâncias e ângulos em uma variedade diferenciável, assim como uma métrica em um espaço euclidiano.

Mostramos que toda variedade diferenciável bem comportada pode ser munida de uma métrica riemanniana, tornando-se uma variedade riemanniana. Esse resultado é interessante pois estende a aplicabilidade desse capítulo e dos posteriores a uma grande classe de variedades diferenciáveis. Posteriormente, quando apresentamos o teorema de Hopf-Rinow, vemos que tais ferramentas da Geometria Riemanniana nos ajudam a deduzir certas propriedades das próprias variedades diferenciáveis.

Também introduzimos o conceito de conexão, o qual serve como uma forma de identificar vetores em diferentes espaços tangentes, permitindo estender o conceito de diferenciabilidade ao longo de campos vetoriais. Mostramos o teorema de Levi-Civita, que afirma que toda variedade riemanniana possui uma única conexão compatível com a topologia e com a métrica da variedade, em um sentido a ser tornado preciso.

3.1 Métricas Riemannianas

Iniciamos por formalizar a noção de métrica:

Definição 3.1. Seja M uma variedade diferenciável. Uma métrica Riemanniana é uma correspondência que associa a cada $p \in M$, um produto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle_p$, isto é, uma aplicação

bilinear $\langle \cdot, \cdot \rangle_p : T_p M \times T_p M \rightarrow \mathbb{R}$ que varia diferencialmente com respeito a p e que satisfaz:

1. Simétrica: $\langle u, v \rangle_p = \langle v, u \rangle_p$;
2. Definida positiva: $\langle v, v \rangle_p \geq 0$ e $\langle v, v \rangle_p = 0$ se, e somente se, $v = 0$.

Variar diferencialmente com respeito a p significa que, dada uma parametrização $\mathbf{x} : U \rightarrow M$, em que $\mathbf{x}(x_1, \dots, x_n) = q$ e $\frac{\partial}{\partial x_i}(q) = d\mathbf{x}_q(0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$, então $g_{ij}(x_1, \dots, x_n) = \left\langle \frac{\partial}{\partial x_i}(q), \frac{\partial}{\partial x_j}(q) \right\rangle_q$ é diferenciável em U .

Dizemos que uma variedade diferenciável munida de uma métrica riemanniana é uma variedade riemanniana.

A transformação que preserva propriedades derivadas da métrica é denominada isometria, e é definida da seguinte maneira:

Definição 3.2.

- Sejam M, N variedades diferenciáveis. Um difeomorfismo $f : M \rightarrow N$ é chamado **isometria** se

$$\langle u, v \rangle_p = \langle df_q(u), df(q)(v) \rangle_p, \text{ para todo } u, v \in T_p M. \quad (1)$$

- Dizemos que $f : M \rightarrow N$ é uma **isometria local** se, para todo $p \in M$, existe uma vizinhança U de p em M , tal que (1) é satisfeito para todo $q \in U$ e $u, v \in T_q M$.
- Dizemos que M é **localmente isométrica** a N se, para todo $p \in M$, existe uma vizinhança U de p em M e uma isometria $f : U \rightarrow f(U) \subset N$, isto é, existe um difeomorfismo $f : U \rightarrow f(U)$, que satisfaz (1).

Note que M localmente isométrica a N não implica que N é localmente isométrica a M . De fato: **PLACEHOLDER: CITAR EXEMPLO. É UM EXERCÍCIO DO LIVRO, AINDA NÃO CONSEGUI RESOLVER!**

Exemplos 3.1.

1. $M = \mathbb{R}^n$, com $\frac{\partial}{\partial x_i}$ identificado com e_i . Definimos uma métrica em M , pondo

$$g_{ij} = \langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se } i = j, \\ 0, & \text{se } i \neq j. \end{cases}$$

A bilinearidade e simetria seguem trivialmente e o fato da métrica ser diferenciável segue do fato de ser constante, fixados i, j . Essa métrica é denominada de métrica canônica ou euclidiana.

2. Variedades Imersas: Seja $f : M^n \rightarrow N^{n+k}$ uma imersão, isto é, f é diferenciável e df_p é injetora para todo $p \in M$. Se N é uma variedade riemanniana, podemos induzir uma métrica em M , pondo $\langle u, v \rangle_p = \langle df_p(u), df_p(v) \rangle_{f(p)}$. De fato, isso define uma métrica:

- A bilinearidade segue do fato de df_p ser linear;
- A simetria segue da métrica de N ;
- Para mostrar que é positiva definida, tome $v \in T_p M$. Temos então que $\langle v, v \rangle_p = \langle df_p(v), df_p(v) \rangle_{f(p)} \geq 0$. No caso de ser igual a 0, temos que $df_p(v) = 0$ e, como df_p é injetiva, $v = 0$. Note que precisamos da injetividade de df_p apenas para mostrar o fato de que a métrica é definida positiva.
- Podemos juntar os exemplos 1. e 2; para construir uma métrica na esfera S^n . Com efeito, a função inclusão $i : S^n \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ é um mergulho, em particular, é uma imersão. Logo, munimos $\mathbb{R}^{n+1}$ da métrica canônica e S^n da métrica induzida por tal.
- Considere o semiplano superior aberto $\mathbb{R}_+^2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; y > 0\}$ munido da estrutura diferencial $\{(\mathbb{R}_+^2, Id)\}$ com a métrica $\langle u, v \rangle_{(x,y)} = \frac{1}{y} \langle u, v \rangle_{\mathbb{R}^2}$, onde $\langle u, v \rangle_{\mathbb{R}^2}$ denota a métrica euclidiana em $\mathbb{R}^2$. Essa variedade riemanniana é chamada de modelo de semiplano de Poincaré e ela serve como modelo da geometria hiperbólica de Lobachevsky. **PLACEHOLDER: REFERÊNCIA.**
- Análogamente ao semiplano de Poincaré, temos o disco de Poincaré, o qual é construído tomando $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x^2 + y^2 < 1\}$, munindo-o com a estrutura diferencial identidade e com a métrica $\langle u, v \rangle_{(x,y)} = \frac{4\langle u, v \rangle_{\mathbb{R}^2}}{(1 - (x^2 + y^2))^2}$, temos outro modelo da geometria hiperbólica. A idealização dessa variedade é encontrada no livro *Ciência e Hipótese* (Poincaré, 1905), onde a métrica riemanniana é substituída pela dilatação térmica. Poincaré explica intuitivamente da seguinte maneira:

Observemos, em primeiro lugar, que embora do ponto de vista da nossa geometria comum este mundo seja finito, para os seus habitantes ele parecerá infinito. À medida que se aproximam da superfície da esfera, eles tornam-se mais frios e, ao mesmo tempo, cada vez menores. Os passos que dão são, portanto, também cada vez menores, de modo que nunca poderão alcançar a fronteira da esfera (p.65)¹.

Exemplo 3.2. Sejam M_1 e M_2 variedades riemannianas. Definimos uma métrica na variedade produto $M_1 \times M_2$ pondo

$$\langle u, v \rangle_{(p,q)} = \langle d\pi_1(u), d\pi_1(v) \rangle_p + \langle d\pi_2(u), d\pi_2(v) \rangle_q$$

onde $\pi_1 : M_1 \times M_2 \rightarrow M_1$ e $\pi_2 : M_1 \times M_2 \rightarrow M_2$ são as projeções.

¹Traduzido pelos autores.

O segundo item do Exemplo 3.1 será utilizado posteriormente, quando estudarmos o mapa exponencial.

É interessante observar que, na Geometria Diferencial, a primeira forma fundamental é um exemplo de métrica riemanniana, a qual pode ser obtida definindo em $\mathbb{R}^3$ a métrica euclidiana e induzindo tal métrica numa superfície, a qual está imersa em $\mathbb{R}^3$.

PLACEHOLDER: AQUI EXISTE A POSSIBILIDADE DE COLOCAR O EXEMPLO GIGANTESCO DE GRUPOS DE LIE. CREIO NÃO SER NECESSÁRIO POR QUE NÃO CONTRIBUI NADA PARA O OBJETIVO DO TCC

Agora, generalizamos a noção de curva diferenciável para a de curva parametrizada.

Definição 3.3.

- **Curva parametrizada:** Uma aplicação diferenciável $c : I \rightarrow M$, onde $I \subset \mathbb{R}$ é um intervalo aberto é chamada de curva parametrizada.
- **Segmento:** Se $a, b \in I$ e $a < b$, dizemos que $c|_{[a,b]}$ é um segmento da curva c . Também nos referiremos a $c([a, b]) \subset M$ como segmento.

De agora em diante, utilizaremos o termo curva diferenciável tanto para se referir à aplicações $c : (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow M$ diferenciáveis quanto à curvas parametrizadas.

Agora, dada uma curva diferenciável, buscamos analisar sua velocidade e, posteriormente, sua aceleração. Na Geometria Diferencial, isso é feito considerando a curva como uma curva em $\mathbb{R}^3$ e tomando sua derivada usual. Na Geometria Riemanniana, como não dispomos de um espaço ambiente euclidiano, definimos a velocidade observando os espaços tangentes. Primeiramente, de forma mais geral, definimos campos de vetores ao longo de curvas:

Definição 3.4. Se $c : I \rightarrow M$ é uma curva parametrizada, uma aplicação V , que leva cada $t \in I$ a um vetor $V(t) \in T_{c(t)}M$ é um campo de vetores ao longo da curva c .

Dizemos que V é diferenciável se, para todo $f \in \mathcal{D}$, a função $V(t)f$ é diferenciável em I .

Perceba que, tomando X um campo vetorial diferenciável em M , podemos definir $V(t) = X(c(t))$. Se isso acontecer, dizemos que V é um campo induzido por X . A recíproca nem sempre é verdade, isto é, nem todo campo ao longo de uma curva é induzido. De fato, considere a curva diferenciável

$$c : (-\pi, \pi) \ni t \rightarrow (\cos t, \sin 2t) \in \mathbb{R}^2$$

e o campo $c'(t) = (\sin t, 2 \cos 2t)$ ao longo de c . Temos que $c\left(-\frac{\pi}{2}\right) = c\left(\frac{\pi}{2}\right)$, mas $c'\left(-\frac{\pi}{2}\right) \neq c'\left(\frac{\pi}{2}\right)$. Logo, não existe campo diferenciável $X \in \chi(\mathbb{R}^2)$, tal que $c' = X \circ c$.

Note que, nesse caso, o campo ao longo da curva não é induzido pois assume diferentes valores no mesmo ponto (em tempos diferentes). E se forçarmos a curva a ser simples, isto é, c injetora? Ainda é possível encontrar um contra-exemplo:


$$c : (-1, 1) \ni t \rightarrow (t^2, t^3) \in \mathbb{R}^2$$

e $c'(t) = (2t, 3t^2)$. Aqui, a impossibilidade de encontrar um campo diferenciável que induz c' se dá pelo fato c formar um bico em torno da origem, o que só acontece pois $c'(0) = 0$. Com efeito, se $X \in \chi(\mathbb{R}^2)$ é um campo diferenciável, tal que $c'(t) = X(c(t))$, escrevendo $X(x, y) = (P(x, y), Q(x, y))$, temos que $P(c(t)) = 2t$. Logo, derivando em ambos os lados,

$$\frac{\partial P}{\partial x}(c(t)) \frac{\partial t^2}{\partial t}(t) + \frac{\partial P}{\partial y}(c(t)) \frac{\partial t^3}{\partial t}(t) = 2,$$

o que é um absurdo quando $t = 0$.

Figura 3.1: Gráficos das funções $c(t) = (t^2, t^3)$ e $c'(t) = (2t, 3t^2)$.



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Ajustamos então nossa pergunta: Se c é uma curva simples e regular, isto é, injetora, com derivada não nula, e V um campo ao longo de c , existe um campo X , tal que $V = X \circ c$? A resposta agora é positiva, se assumirmos que c está definida em um intervalo compacto (incentivamos o leitor a encontrar um contraexemplo quando uma curva é simples e regular, porém definida em um intervalo não fechado). Precisamos primeiro estender a noção de vetor derivada para curvas em variedades diferenciáveis:

Definição 3.5. O campo velocidade de uma curva parametrizada é o campo

$$\frac{dc}{dt}(t) := dc_t \left(\frac{d}{dt}(t) \right),$$

onde $\frac{d}{dt}(t) = 1$, na identificação do espaço tangente de I com $\mathbb{R}$.

Agora, conseguimos enunciar o resultado:

Teorema 3.1. *Seja $c : [a, b] \rightarrow M$ uma curva parametrizada regular simples, isto é, com $\frac{dc}{dt}(t) \neq 0$, para todo $t \in I$ e c injetora. Se V é um campo vetorial diferenciável ao longo de c , existe $Y \in \chi(M)$, tal que $V = Y \circ c$.*

Demonstração. ■

Esse resultado será útil posteriormente, quando reduziremos noções envolvendo campos em uma variedade apenas para campos ao longo de curvas.

Com a noção de métrica e de curva, podemos definir comprimentos na variedade:

Definição 3.6. Se $c : I \rightarrow M$ é uma curva parametrizada e $c|_{[a,b]}$ um segmento, definimos o comprimento do segmento como

$$l_a^b(c) = \int_a^b \left\langle \frac{dc}{dt}(t), \frac{dc}{dt}(t) \right\rangle_{c(t)}^{\frac{1}{2}} dt.$$

Em breve, mostraremos certas curvas interessantes que minimizam localmente o comprimento. Tais curvas, denominadas geodésicas, são de grande interesse no nosso estudo.

O próximo resultado, de cunho técnico, exibirá que toda variedade diferenciável Hausdorff, de base enumerável admite uma métrica riemanniana.

Teorema 3.2. *Seja M uma variedade diferenciável Hausdorff e de base enumerável (Axioma 2.1). Então, M é uma variedade riemanniana, isto é, existe uma métrica riemanniana em M .*

Demonstração. Pelo Teorema 2.3, M possui partição da unidade, isto é, existe uma coleção $\{f_\alpha\}$, com $f_\alpha : M \rightarrow \mathbb{R}$, tal que, $f_\alpha \geq 0$ e $\text{supp } f_\alpha \subset V_\alpha = \mathbf{x}_\alpha(U_\alpha)$, para todo α . Mais ainda, a coleção $\{V_\alpha\}$ é localmente finita e $\sum_\alpha f_\alpha(p) = 1$, para todo $p \in M$.

Definimos $\langle \cdot, \cdot \rangle^\alpha$ em cada $V_\alpha = \mathbf{x}_\alpha(U_\alpha)$, pondo, para $p \in V_\alpha$,

$$\langle u, v \rangle_p^\alpha = \left\langle (d\mathbf{x}_\alpha)_p^{-1}(u), (d\mathbf{x}_\alpha)_p^{-1}(v) \right\rangle,$$

em que o produto interno da direita é o produto interno euclidiano, identificando $T_{\mathbf{x}_\alpha^{-1}(p)}U_\alpha$ com $\mathbb{R}^n$, conforme feito em Lema 2.4

Mostremos que isso define uma métrica riemanniana em cada V_α : A simetria e o fato de ser positiva definida seguem do produto interno euclidiano. Para mostrar a diferenciabilidade, tomemos uma parametrização $\mathbf{y}$ em uma vizinhança de p . Escrevendo $\frac{\partial}{\partial y_i}(q) = d\mathbf{y}_q(0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$, temos que

$$\left\langle \frac{\partial}{\partial y_i}(q), \frac{\partial}{\partial y_j}(q) \right\rangle_{\mathbf{y}(q)}^\alpha = \left\langle d\mathbf{x}_\alpha^{-1} \circ d\mathbf{y}_q \left(\frac{\partial}{\partial y_i}(q) \right), d\mathbf{x}_\alpha^{-1} \circ d\mathbf{y}_q \left(\frac{\partial}{\partial y_j}(q) \right) \right\rangle,$$

o qual varia diferencialmente em q , pelos axiomas de variedade diferenciável.

Definimos agora uma métrica global em M , pondo

$$\langle u, v \rangle_p = \sum_{\alpha} f_{\alpha}(p) \langle u, v \rangle_p^{\alpha}.$$

É fácil ver que tal aplicação é simétrica e positiva definida. A diferenciabilidade segue do fato da soma e produto de funções diferenciáveis ser diferenciável. ■

3.2 Conexões Afins

Nessa seção daremos um passo pra trás e analizaremos outra ideia da topologia diferencial: conexões afins. Já vimos campos vetoriais e curvas em variedades, junto com funções diferenciáveis e suas derivadas. Também podemos pensar em como uma função varia ao longo de um campo vetorial. Existe, entretanto, uma técnica do cálculo diferencial que ainda não está clara nas variedades: como podemos somar e subtrair vetores em diferentes espaços tangentes? Ou melhor, como derivar um campo vetorial em relação a outro campo vetorial?

Para fixar as ideias, considere uma variedade M , pontos $p, q \in M$ e seus espaços tangentes $T_p M$ e $T_q M$. Buscamos uma maneira de identificar vetores de $T_p M$ com vetores de $T_q M$. Um palpite para fazer isso é, se p, q pertencem a mesma vizinhança parametrizada, escrever um vetor $v \in T_p M$ como $v = \sum v_i X_i(p)$ e o identificar com o vetor $u = \sum v_i X_i(q) \in T_q M$. Essa identificação é um isomorfismo de espaços vetoriais, porém não é independente da parametrização. Outra forma, mais interessante, é levar em consideração a trajetória que o vetor percorre na variedade. Mais precisamente, dados $p, q \in M$, pensemos em uma transformação $\Gamma(\alpha, v) = u$, que recebe um caminho diferenciável α ligando p a q e um vetor $v \in T_p M$ e devolve um vetor $u \in T_q M$. Exigimos também que

1. $\Gamma(\alpha \circ \beta, v) = \Gamma(\beta, \Gamma(\alpha, v))$;
2. $\Gamma(\alpha, \cdot) : T_p M \rightarrow T_q M$ seja isometria de espaços vetoriais;
3. $\Gamma(\alpha|_{[t_0, t]}, v)$ varie diferenciavelmente em t .

Γ é chamado de transporte paralelo de v ao longo de α .

Esta abordagem, de grande valor histórico, apesar de intuitiva, introduz algumas dificuldades quando realizamos cálculos. Por exemplo, não é simples definir e demonstrar propriedades acerca de derivadas de campos vetoriais ao longo de outros campos.

Dito isso, seguiremos a tradição moderna e introduziremos a noção de conexão, a qual é equivalente a noção de transporte paralelo, de uma forma que será explicitada.

Definição 3.7. Seja M uma variedade diferenciável. Definimos $\chi(M)$ como o conjunto de todos os campos de vetores em M de classe C^∞ .

Definição 3.8. Uma conexão afim em uma variedade M é uma aplicação

$$\nabla : \chi(M) \times \chi(M) \ni (X, Y) \rightsquigarrow \nabla_X Y \in \chi(M),$$

que, sendo $f, g \in \mathcal{D}(M)$ e $X, Y, Z \in \chi(M)$, satisfaz as seguintes propriedades:

1. $\nabla_{fX+gY} Z = f\nabla_X Z + g\nabla_Y Z$;
2. $\nabla_X (Y + Z) = \nabla_X Y + \nabla_X Z$;
3. $\nabla_X (fY) = f\nabla_X Y + (Xf)Y$.

Isto é, ∇ é linear na primeira entrada, distribui para a soma na segunda e satisfaz uma certa identidade para o produto.

Intuitivamente, uma conexão é uma noção da derivada de um campo vetorial ao longo de outro campo vetorial. A propriedade 1 é a linearidade da direção da derivada, a propriedade 2 é análoga a regra da soma usual e a propriedade 3 é análoga a regra do produto usual. Apresentaremos adiante que toda variedade riemanniana admite uma única conexão afim que atende certas propriedades, o que remove a ambiguidade da escolha de uma conexão em uma variedade e realça a importância do estudo das conexões afins.

Exemplo 3.3. Quando $M = \mathbb{R}^n$, identificando e_i com X_i e, sendo $X = \sum \alpha_i e_i$ e $Y = \sum \beta_j e_j$ campos vetoriais diferenciáveis,

$$\nabla_X Y = \sum_j \left(\sum_i \alpha_i \frac{\partial \beta_j}{\partial x_i} \right) e_j$$

é uma conexão afim. Mais ainda, sendo $p \in \mathbb{R}^n$ e $c : (-\epsilon, \epsilon) : \mathbb{R}^n$ dada por $c(t) = X(p)t + p$, temos que

$$(\nabla_X Y)_p = (Y \circ c)'(0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{Y(c(t)) - Y(p)}{t}.$$

De fato,

$$\begin{aligned}
 (Y \circ c)'(0) &= \left. \frac{d}{dt} Y(c_1(t), \dots, c_n(t)) \right|_{t=0} \\
 &= \sum_i \frac{\partial Y}{\partial x_i}(c(t)) \frac{dc_i}{dt}(t) \Big|_{t=0} \\
 &= \sum_i \frac{\partial Y}{\partial x_i}(p) \frac{dc_i}{dt}(0) \\
 &= \sum_i \left(\sum_j \frac{\partial \beta_j}{\partial x_i}(p) e_j \right) \alpha_i(p) \\
 &= \sum_j \left(\sum_i \alpha_i(p) \frac{\partial \beta_j}{\partial x_i}(p) \right) e_j \\
 &= (\nabla_X Y)_p.
 \end{aligned}$$

Em outras palavras, a conexão Levi-Civita de $\mathbb{R}^n$ coincide com a derivada usual.

Esse exemplo permite olhar para as conexões afins como uma generalização da ideia de derivada direcional no $\mathbb{R}^n$. Como é de se esperar, imitando a sua análoga para os espaços euclidianos, a conexão afim é uma propriedade local. Isto é, $(\nabla_X Y)_p$ depende apenas de Y e do valor que X assume em p :

Lema 3.1. *Seja $p \in M$ e $v \in T_p M$. Se $X, Y \in \chi(M)$ são tais que $X_p = Y_p$, então, para qualquer campo $Z \in \chi(M)$, temos que*

$$(\nabla_X Z)_p = (\nabla_Y Z)_p.$$

Demonstração. Seja $\mathbf{x}$ uma parametrização de uma vizinhança de p . Temos que

$$X = \sum x_i X_i \quad Y = \sum y_j X_j,$$

onde $X_i = \frac{\partial}{\partial x_i}$. Logo, utilizando as propriedades da conexão,

$$\begin{aligned}
 \nabla_X Y &= \nabla_{\sum x_i X_i} \left(\sum y_j X_j \right) \\
 &= \sum_i x_i \left(\nabla_{X_i} \left(\sum_j y_j X_j \right) \right) \\
 &= \sum_{i,j} x_i \nabla_{X_i} (y_j X_j) \\
 &= \sum_{i,j} x_i (y_j \nabla_{X_i} X_j + (X_i y_j) X_j) \\
 &= \sum_{i,j} x_i y_j \nabla_{X_i} X_j + \sum_{i,j} x_i (X_i y_j) X_j.
 \end{aligned}$$

Como, para cada par i, j , o campo $\nabla_{X_i} X_j \in \chi(M)$, podemos escrever

$$\nabla_{X_i} X_j = \sum \Gamma_{i,j}^k X_k,$$

onde os $\Gamma_{i,j}^k$ são funções reais diferenciáveis definidas na vizinhança coordenada. Dessa forma,

$$\begin{aligned} \nabla_X Y &= \sum_{i,j} x_i y_j \left(\sum_k \Gamma_{i,j}^k X_k \right) + \sum_{i,j} x_i (X_i y_j) X_j \\ &= \sum_k \left(\sum_{i,j} x_i y_j \Gamma_{i,j}^k \right) X_k + \sum_{i,j} x_i (X_i y_j) X_j. \end{aligned}$$

Observe que, para todo j , temos $X(y_j) = (\sum x_i X_i) y_j = \sum x_i (X_i y_j)$. Assim, trocando os índices do segundo somatório e utilizando essa igualdade, segue que

$$\nabla_X Y = \sum_k \left(\sum_{i,j} x_i y_j \Gamma_{i,j}^k \right) X_k + \sum_k X(y_k) X_k = \sum_k \left[\left(\sum_{i,j} x_i y_j \Gamma_{i,j}^k \right) + X(y_k) \right] X_k.$$

Em outras palavras, $(\nabla_X Y)_p$ depende apenas de $x_i(p)$, $y_k(p)$ e das derivadas $X(y_k)(p)$.

Escrevendo então $Z = \sum z_i X_i$, temos que

$$\begin{aligned} (\nabla_X Z)_p &= \sum_k \left[\left(\sum_{i,j} x_i z_j \Gamma_{i,j}^k \right) + X(z_k) \right] X_k \Big|_p \\ &= \sum_k \left[\left(\sum_{i,j} y_i z_j \Gamma_{i,j}^k \right) + Y(z_k) \right] X_k \Big|_p \\ &= (\nabla_Y Z)_p. \end{aligned}$$

■

Antes de enunciarmos o próximo resultado, mostremos outro lema técnico:

Lema 3.2. *Seja $p \in M$ e $v \in T_p M$. Existe um campo vetorial $X \in \chi(M)$, tal que $X_p = v$.*

Demonstração. Seja $\mathbf{x} : U \rightarrow V$ uma parametrização em torno de p e $X_i = \frac{\partial}{\partial x_i}$. Podemos escrever

$$v = \sum v_i X_i(p).$$

Note que podemos pensar em v_i como uma função constante de V em $\mathbb{R}$. Defina o campo X em V , pondo

$$X_q = \sum v_i(q) X_i(q).$$

Note que X é diferenciável, pois X_i e v_i são diferenciáveis. Também, não é difícil ver que $X_p = v$. Podemos então estender X de forma que esteja definido em toda variedade M .

Para isso, tomemos $\bar{U} \subset U$ compacto, conforme feito em Lema 2.9, de forma que $p \in \bar{U}$, e $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ uma função bump, com suporte compacto em $\bar{U}$. O campo $\bar{X} = fX$ é o que procuramos. ■

Tomando $p \in M$ e $v \in T_p M$ e utilizando o Lema 3.2 e o Lema 3.1, dado $Y \in \chi(M)$ podemos pensar em $(\nabla_v Y)_p$ substituindo v por um campo $X \in \chi(M)$, com $X_p = v$. De fato,

$$(\nabla_X Y)_p = \sum_k \left[\left(\sum_{i,j} x_i y_j \Gamma_{i,j}^k \right) + X(y_k) \right] X_k \Big|_p = \sum_k \left[\left(\sum_{i,j} v_i y_j \Gamma_{i,j}^k \right) + v(y_k) \right] X_k.$$

Dessa observação, conseguimos enunciar e demonstrar o resultado seguinte:

Proposição 3.1. *Seja M uma variedade diferencial, com uma conexão afim ∇ . Existe uma única correspondência que associa um campo vetorial V ao longo de uma curva parametrizada $c : I \rightarrow M$ a outro campo $\frac{DV}{dt}$, chamado de derivada covariante, ao longo de c , tal que, sendo V e W campos ao longo de c e $f : I \rightarrow \mathbb{R}$:*

1. $\frac{D}{dt}(V + W) = \frac{D}{dt}V + \frac{D}{dt}W$;
2. $\frac{D}{dt}(fV) = \frac{df}{dt}V + f \frac{DV}{dt}$;
3. Se $V = Y(c(t))$, com $Y \in \chi(M)$, então $\frac{DV}{dt}(t) = \nabla_{\frac{dc}{dt}(t)} Y(c(t))$.

Demonstração. Seguindo o Lema 2.6, mostraremos primeiro a unicidade e depois definiremos $\frac{D}{dt}$ em vizinhanças coordenadas. Suponha que exista $\frac{D}{dt}$ satisfazendo 1, 2 e 3. Seja $\mathbf{x} : U \rightarrow M$ uma parametrização, tal que $\mathbf{x}(U) \cap c(I) \neq \emptyset$ e seja $\tilde{c}(t) = \mathbf{x}^{-1} \circ c(t) = (x_1(t), \dots, x_n(t))$ a expressão em coordenadas de c em um aberto de I contido em $\mathbf{x}(U)$. Sejam $X_i = \frac{\partial}{\partial x_i}$ e V um campo vetorial ao longo de c . Escrevendo $V = \sum v_j X_j$, temos, pelas propriedades da derivada covariante, que

$$\frac{DV}{dt} = \frac{D}{dt} \left(\sum_j v_j X_j \right) = \sum_j \frac{D}{dt} (v_j X_j) = \sum_j \frac{dv_j}{dt} X_j + \sum_j v_j \frac{DX_j}{dt}.$$

Note que

$$\frac{DX_j}{dt} = \nabla_{\frac{dc}{dt}} X_j = \nabla_{\sum_i \frac{dx_i}{dt} X_i} X_j = \sum_i \frac{dx_i}{dt} \nabla_{X_i} X_j$$

implicando que

$$\frac{DV}{dt} = \sum_j \frac{dv_j}{dt} X_j + \sum_{i,j} v_j \frac{dx_i}{dt} \nabla_{X_i} X_j. \quad (*)$$

Tal expressão de $\frac{DV}{dt}$ depende apenas da expressão em coordenadas de c , do campo V e da conexão ∇ e, portanto, é única.

Agora, definimos $\frac{DV}{dt}$ em toda vizinhança parametrizada utilizando a equação (*). O resultado segue do Lema 2.6. ■

Esse resultado estende a noção de conexão para campos definidos ao longo de curvas diferenciáveis. Isso permite, por exemplo, que calculemos acelerações de curvas computando a derivada covariante do campo velocidade de uma curva c . A terceira propriedade da derivada covariante afirma que, calcular a covariante de um campo induzido, nada mais é do que calcular a conexão afim desse campo ao longo da curva $c(t)$. A derivada covariante também é análoga a derivada covariante da Geometria Diferencial, com a única diferença sendo que na Geometria Riemanniana, precisamos da noção de conexão, a qual é dispensável nas superfícies diferenciáveis devido a presença do espaço ambiente.

Dando sequência, retomamos a noção de transporte paralelo:

Definição 3.9. Seja M uma variedade diferenciável com uma conexão afim ∇ . Um campo vetorial V ao longo de uma curva c é dito paralelo quando $\frac{DV}{dt} = 0$.

Proposição 3.2. *Sejam M uma variedade diferenciável com uma conexão afim ∇ , $c : I \rightarrow M$ uma curva parametrizada e $V_0 \in T_{c(t_0)}M$. Então, existe um único campo de vetores paralelo V ao longo de c , tal que $V(t_0) = V_0$.*

Demonstração. Caso particular: $c(I)$ está contido em uma vizinhança parametrizada $\mathbf{x}(U)$. Sejam $\tilde{c}(t) = \mathbf{x}^{-1} \circ c(t) = (x_1(t), \dots, x_n(t))$ e $V_0 = \sum V_0^j X_j$, onde $X_j = \frac{\partial}{\partial x_j}(c(t_0))$. Pela demonstração de Proposição 3.1, temos que um campo V em $\mathbf{x}(U)$ ao longo de c , com $V(t_0) = V_0$ é paralelo se, e somente se,

$$0 = \frac{DV}{dt} = \sum_j \frac{dv^j}{dt} X_j + \sum_{i,j} \frac{dx_i}{dt} v^j \nabla_{X_i} X_j.$$

Fazendo $\nabla_{X_i} X_j = \sum_k \Gamma_{i,j}^k X_k$, temos que

$$0 = \sum_j \frac{dv^j}{dt} X_j + \sum_{i,j,k} \frac{dx_i}{dt} v^j \Gamma_{i,j}^k X_k.$$

Trocando o índice do primeiro somatório para k , segue que

$$0 = \sum_k \left\{ \frac{dv^k}{dt} + \sum_{i,j} v^j \frac{dx_i}{dt} \Gamma_{i,j}^k \right\} X_k,$$

isto é, para todo $k = 1, \dots, n$,

$$0 = \frac{dv^k}{dt} + \sum_{i,j} v^j \frac{dx_i}{dt} \Gamma_{i,j}^k. \quad (*)$$

Dessa forma, V é paralelo se, e somente se satisfaz a equação $(*)$, para todo $k = 1, \dots, n$.

Note que, para todo k ,

$$\frac{dv^k}{dt} = \begin{bmatrix} \sum_i \Gamma_{i,1}^k \frac{dx_i}{dt} & \cdots & \sum_i \Gamma_{i,n}^k \frac{dx_i}{dt} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix}.$$

Logo,

$$\begin{bmatrix} \frac{dv^1}{dt} \\ \vdots \\ \frac{dv^n}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_i \Gamma_{i,1}^1 \frac{dx_i}{dt} & \cdots & \sum_i \Gamma_{i,n}^1 \frac{dx_i}{dt} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum_i \Gamma_{i,1}^n \frac{dx_i}{dt} & \cdots & \sum_i \Gamma_{i,n}^n \frac{dx_i}{dt} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix},$$

isto é, o sistema de equações é linear e, portanto, possui uma única solução. Em outras palavras, existe um único campo V que satisfaz as condições desejadas. **PLACEHOLDER: CITAR ALGUM LIVRO QUE CONTÉM ESSA DEMONSTRAÇÃO**

Caso geral: Seja $c : I \rightarrow M$ curva parametrizada. Fixando $t_0 \in I$, para todo $t_1 \in I$ tal que $t_0 \leq t_1$, o intervalo $[t_0, t_1]$ é compacto. Logo, como c é contínua, $c([t_0, t_1])$ é compacto isto é, podemos cobrir o segmento com finitas vizinhanças coordenadas, digamos $\mathbf{x}_i(U_i)$ com $i = 1, \dots, m$. Pelo que foi argumentado no caso particular, existe um único V_i paralelo ao longo de c em cada $\mathbf{x}_i(U_i)$. O resultado segue aplicando o Lema 2.6 no segmento $c([t_0, t_1])$. ■

O transporte paralelo, conforme já comentado, identifica diferentes espaços tangentes através de um caminho na variedade. É possível mostrar que as noções de conexão afim e transporte paralelo são equivalentes observando que

$$(\nabla_X Y)_p = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\Gamma(\alpha|_{[0,t]}, Y(\alpha(t)))^{-1} - Y(p)}{t}$$

com α curva diferenciável tal que $\alpha(0) = p$ e $\alpha'(t) = X(\alpha(t))$, é, de fato, uma conexão afim e seu transporte paralelo é dado por Γ . O leitor interessado pode consultar **PLACEHOLDER: ACHAR ALGUM LIVRO QUE TEM ISSO AQUI DEMONSTRADO**. Note a semelhança desta fórmula com a derivada de campos vetoriais usual do $\mathbb{R}^n$.

Dada uma variedade diferencial com partição de unidade, existem diversas conexões afins nesta. De fato, seja $\{(U_\alpha, \mathbf{x}_\alpha)\}$ uma estrutura diferencial de uma variedade M , de forma que os $V_\alpha = \mathbf{x}_\alpha(U_\alpha)$ formem uma família localmente finita. Em cada V_α podemos definir uma conexão ∇^α tomando uma matriz $M_k^\alpha = [\Gamma_{i,j}^{\alpha,k}]$ e pondo $\nabla_{X_i}^\alpha X_j = \sum \Gamma_{i,j}^{\alpha,k} X_k$. Definimos uma conexão afim global pondo $(\nabla_X Y)_p = \sum_\alpha f_\alpha(p)(\nabla_X^\alpha Y)_p$, conforme feito na demonstração do Teorema 3.2. Devido a isso, o comportamento do transporte paralelo é imprevisível. Entretanto, o transporte paralelo assume uma forma muito mais intuitiva na conexão de Levi-Civita, a qual será introduzida adiante.

Agora, voltaremos a falar de variedades riemannas, buscando relacionar o conceito de métrica com o de conexão afim.

Definição 3.10. Seja M uma variedade Riemanniana de métrica $\langle, \rangle$ e conexão ∇ . A conexão é dita compatível com a métrica quando, para toda curva parametrizada c e quaisquer pares de campos de vetores paralelos P e P' ao longo de c tivermos

$$\langle P, P' \rangle = \text{constante}.$$

Essa noção generaliza a regra de Leibniz para produtos internos na geometria diferencial. A próxima proposição torna isso evidente e motiva tal definição:

Proposição 3.3. *Uma conexão ∇ em uma variedade Riemanniana com uma métrica $\langle, \rangle$ é compatível se, e somente se, para todo V, W campos diferenciáveis ao longo da curva parametrizada $c : I \rightarrow M$ tivermos*

$$\frac{d}{dt} \langle V, W \rangle = \left\langle \frac{DV}{dt}, W \right\rangle + \left\langle V, \frac{DW}{dt} \right\rangle. \quad (*)$$

Demonstração. Se vale (*), então tomando dois campos P e P' paralelos ao longo de uma curva parametrizada c , temos que

$$\frac{d}{dt} \langle P, P' \rangle = 0 + 0 = 0.$$

Como tal função está definida em um intervalo, o qual é conexo, temos que $\langle P, P' \rangle$ é constante. Reciprocamente, seja $\{P_1(t_0), \dots, P_n(t_0)\}$ uma base ortonormal de $T_{c(t_0)}M$ em relação ao produto interno $\langle, \rangle_{c(t_0)}$. Utilizando Proposição 3.2, extendemos cada $P_i(t_0)$ a um campo $P_i(t)$ paralelo ao longo de c . Da hipótese, segue que $\langle P_i(t), P_j(t) \rangle = \langle P_i(t_0), P_j(t_0) \rangle = \delta_{i,j}$, isto é, $\{P_1(t), \dots, P_n(t)\}$ é uma base ortonormal de $T_{c(t)}M$, para todo $t \in I$. Podemos então escrever $V = \sum v_i P_i$ e $W = \sum w_j P_j$, com $v_i = \langle V, P_i \rangle$ e $w_j = \langle W, P_j \rangle$. Segue que

$$\frac{DV}{dt} = \frac{D(\sum v_i P_i)}{dt} = \sum \frac{Dv_i P_i}{dt} = \sum \frac{dv_i}{dt} P_i + v_i \frac{DP_i}{dt} = \sum \frac{dv_i}{dt} P_i,$$

notando que $\frac{DP_i}{dt} = 0$. De forma análoga, é possível mostrar que

$$\frac{DW}{dt} = \sum \frac{dw_j}{dt} P_j.$$

Assim,

$$\begin{aligned}
 \left\langle \frac{DV}{dt}, W \right\rangle + \left\langle V, \frac{DW}{dt} \right\rangle &= \sum_i \frac{dv_i}{dt} \langle P_i, W \rangle + \sum_i \frac{dw_i}{dt} \langle V, P_i \rangle \\
 &= \sum_i \frac{dv_i}{dt} w_i + \frac{dw_i}{dt} v_i \\
 &= \frac{d}{dt} \left(\sum_i v_i w_i \right) \\
 &= \frac{d}{dt} \langle V, W \rangle,
 \end{aligned}$$

em que a última desigualdade vale devido a expressão de V e W na base ortonormal. ■

Outra equivalência da compatibilidade é dada pelo corolário seguinte:

Corolário 3.1. *Uma conexão ∇ em uma variedade Riemanniana M munida com uma métrica $\langle, \rangle$ é compatível com a métrica se, e somente se, para quaisquer $X, Y, Z \in \chi(M)$,*

$$X \langle Y, Z \rangle = \langle \nabla_X Y, Z \rangle + \langle Y, \nabla_X Z \rangle. \quad (*)$$

Demonstração. Suponha que ∇ é compatível com a métrica. Sejam $p \in M$ e $c : I \rightarrow M$ uma curva parametrizada, com $c(t_0) = p$ e $\frac{dc}{dt}(t_0) = X_p$. Temos que

$$\begin{aligned}
 X_p \langle Y, Z \rangle &= \left. \frac{d}{dt} \langle Y(c(t)), Z(c(t)) \rangle \right|_{t=t_0} \\
 &= \left\langle \frac{D(Y \circ c)}{dt}(t), Z(c(t)) \right\rangle + \left\langle Y(c(t)), \frac{D(Z \circ c)}{dt}(t) \right\rangle \Big|_{t=t_0} \quad \text{pela [[3.2 - Prop 3 - Leibniz para}} \\
 &= \left\langle \frac{D(Y \circ c)}{dt}(t_0), Z_p \right\rangle + \left\langle Y_p, \frac{D(Z \circ c)}{dt}(t_0) \right\rangle \\
 &= \left\langle \left(\nabla_{\frac{dc}{dt}(t_0)} Y \right)_p, Z_p \right\rangle + \left\langle Y_p, \left(\nabla_{\frac{dc}{dt}(t_0)} Z \right)_p \right\rangle \quad \text{pel}
 \end{aligned}$$

Logo, como $\frac{dc}{dt}(t_0) = X_p$, pelo Lema 3.2, temos que

$$X_p \langle Y, Z \rangle = \langle (\nabla_X Y)_p, Z_p \rangle + \langle Y_p, (\nabla_X Z)_p \rangle = (\langle \nabla_X Y, Z \rangle + \langle Y, \nabla_X Z \rangle)_p,$$

que é o que procuramos.

Reciprocamente, sejam $c : I \rightarrow M$ uma curva parametrizada e V, W campos diferenciáveis ao longo de c .

Note que se X, Y, Z são campos definidos em um aberto U de M , então vale $(*)$ para X, Y, Z . De fato, tomando $p \in U$, por Lema 2.9, existe uma função diferenciável $f : M \rightarrow [0, 1]$ com suporte compacto contido em U e contendo p . Definimos então $\overline{X} = \overline{Y} = \overline{Z} = 0$, se $q \notin U$ e $\overline{X} = fX, \overline{Y} = fY, \overline{Z} = fZ$ caso contrário. Aplicamos $(*)$

nestes campos o que torna evidente que a igualdade vale em p para os campos originais. Como p é arbitrário, temos o desejado.

Note também que, utilizando a definição de vetor tangente, a hipótese, e a relação da covariante com campos induzidos temos que

$$\begin{aligned} \left. \frac{d}{dt} \langle X_i \circ c, X_j \circ c \rangle \right|_{t=t_0} &= \frac{dc}{dt}(t_0) \langle X_i, X_j \rangle \\ &= \langle \nabla_{\frac{dc}{dt}(t_0)} X_i, X_j \rangle + \langle X_i, \nabla_{\frac{dc}{dt}(t_0)} X_j \rangle \\ &= \left\langle \frac{D(X_i \circ c)}{dt}, X_j \right\rangle + \left\langle X_i, \frac{D(X_j \circ c)}{dt} \right\rangle \Big|_{t=t_0}. \end{aligned}$$

Agora, escreva $V = \sum v_i(X_i \circ c)$ e $W = \sum w_j(X_j \circ c)$. Temos que

$$\begin{aligned} \left\langle \frac{DV}{dt}, W \right\rangle + \left\langle V, \frac{DW}{dt} \right\rangle \Big|_{t=t_0} &= \sum_{i,j} v_i w_j \left\langle \frac{D(X_i \circ c)}{dt}, X_j \right\rangle + \sum_{i,j} v_i w_j \left\langle X_i, \frac{D(X_j \circ c)}{dt} \right\rangle \\ &= \sum_{i,j} v_i w_j \frac{d}{dt} \langle X_i \circ c, X_j \circ c \rangle \\ &= \frac{d}{dt} \left\langle \sum_i v_i(X_i \circ c), \sum_j w_j(X_j \circ c) \right\rangle \\ &= \frac{d}{dt} \langle V, W \rangle, \end{aligned}$$

que é o que queríamos mostrar. ■

Intuitivamente, esse corolário diz que a regra de Leibniz também vale quando derivamos o produto interno de dois campos vetoriais ao longo de outro campo vetorial.

É evidente que buscamos sempre uma conexão afim compatível com a métrica. Outra propriedade interessante de uma conexão afim é a simetria:

Definição 3.11. Uma conexão afim ∇ em uma variedade diferenciável M é dita simétrica quando

$$\nabla_X Y - \nabla_Y X = [X, Y]$$

para todo $X, Y \in \chi(M)$.

Podemos caracterizar as conexões afins simétricas analisando seu comportamento nos vetores induzidos por uma parametrização.

Proposição 3.4. Em uma parametrização $\mathbf{x} : U \rightarrow M$, uma conexão afim ∇ é simétrica se, e só se,

$$\nabla_{X_i} X_j - \nabla_{X_j} X_i = [X_i, X_j] = X_i(X_j) - X_j(X_i) = 0,$$

para todo $i \neq j$.

Demonstração. Se ∇ for simétrica, a implicação é trivial. Agora, supondo que vale a igualdade, sejam $X, Y \in \chi(M)$. Escrevendo $X = \sum \alpha_i X_i$ e $Y = \sum \beta_j X_j$, temos que

$$\nabla_X Y = \nabla_{(\sum \alpha_i X_i)} \left(\sum \beta_j X_j \right) = \sum_{i,j} \alpha_i (\beta_j \nabla_{X_i} X_j + (X_i \beta_j) X_j).$$

Logo,

$$\begin{aligned} \nabla_X Y - \nabla_Y X &= \sum_{i,j} \alpha_i (\beta_j \nabla_{X_i} X_j + (X_i \beta_j) X_j) - \sum_{i,j} \beta_j (\alpha_i \nabla_{X_j} X_i + (X_j \alpha_i) X_i) \\ &= \sum_{i,j} \alpha_i \beta_j (\nabla_{X_i} X_j - \nabla_{X_j} X_i) + \sum_{i,j} \alpha_i (X_i \beta_j) X_j - \sum_{i,j} \beta_j (X_j \alpha_i) X_i \\ &= \sum_{i,j} \alpha_i (X_i \beta_j) X_j - \sum_{i,j} \beta_j (X_j \alpha_i) X_i, \end{aligned}$$

implicando que, para qualquer $f \in \mathcal{D}(M)$,

$$\begin{aligned} (\nabla_X Y - \nabla_Y X)f &= \left(\sum_{i,j} \alpha_i (X_i \beta_j) X_j - \sum_{i,j} \beta_j (X_j \alpha_i) X_i \right) f \\ &= \sum_{i,j} \alpha_i (X_i \beta_j) X_j f - \sum_{i,j} \beta_j (X_j \alpha_i) X_i f \\ &= \sum_{i,j} \alpha_i \frac{\partial \beta_j}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_j} - \sum_{i,j} \beta_j \frac{\partial \alpha_i}{\partial x_j} \frac{\partial f}{\partial x_i} \\ &= (XY - YX)f \\ &= [X, Y]f, \end{aligned}$$

onde a penultima desigualdade segue trocando os índices do segundo somatório. ■

O nome da propriedade é justificado pelo seguinte corolário:

Corolário 3.2. *Em uma parametrização $\mathbf{x} : U \rightarrow M$, uma conexão afim ∇ é simétrica se, e só se, escrevendo $\nabla_{X_i} X_j = \sum \Gamma_{i,j}^k X_k$, temos, $\Gamma_{ij}^k = \Gamma_{ji}^k$.*

Demonstração. Imediato da Proposição 3.4. ■

A Proposição 3.4 nos ajuda a compreender melhor o comportamento de uma conexão simétrica. Fica claro que uma conexão simétrica preserva uma propriedade interessante do cálculo no $\mathbb{R}^n$: derivadas parciais comutam. Na terminologia das conexões, isso se torna $\nabla_{X_i} X_j = \nabla_{X_j} X_i$. Também, impor simetria sobre uma conexão implica automaticamente que a conexão é compatível com uma certa estrutura intrínseca da variedade diferenciável: o colchetes. Isto é, a “não comutatividade” da conexão é exatamente a “não comutatividade” medida pelo colchetes.

Agora, apresentaremos um dos resultados centrais desse capítulo: o Teorema de Levi-Civita. Esse resultado garante que, dada qualquer variedade riemanniana, existe exatamente uma conexão afim que é compatível com a métrica e simétrica.

Teorema 3.3 (Levi-Civita). *Dada M uma variedade riemanniana, existe uma única conexão afim ∇ em M , tal que:*

1. ∇ é simétrica;
2. ∇ é compatível com a métrica riemanniana.

Demonstração. Mostremos primeiro a unicidade. Suponha que ∇ exista. Pela compatibilidade da métrica, para quaisquer $X, Y, Z \in \chi(M)$, temos que:

$$X \langle Y, Z \rangle = \langle \nabla_X Y, Z \rangle + \langle Y, \nabla_X Z \rangle \quad (1)$$

$$Y \langle Z, X \rangle = \langle \nabla_Y Z, X \rangle + \langle Z, \nabla_Y X \rangle \quad (2)$$

$$Z \langle X, Y \rangle = \langle \nabla_Z X, Y \rangle + \langle X, \nabla_Z Y \rangle. \quad (3)$$

Calculando $(1) + (2) - (3)$ e utilizando a compatibilidade e a simetria da conexão, temos

$$\begin{aligned} X \langle Y, Z \rangle + Y \langle Z, X \rangle - Z \langle X, Y \rangle &= \langle \nabla_X Y, Z \rangle + \langle Y, \nabla_X Z \rangle + \langle \nabla_Y Z, X \rangle + \langle Z, \nabla_Y X \rangle \\ &\quad - \langle \nabla_Z X, Y \rangle - \langle X, \nabla_Z Y \rangle \\ &= \langle \nabla_X Y, Z \rangle + \langle Y, \nabla_X Z \rangle + \langle \nabla_Y Z, X \rangle + \langle Z, \nabla_Y X \rangle \\ &\quad - \langle \nabla_Z X, Y \rangle - \langle X, \nabla_Z Y \rangle + \langle \nabla_X Y, Z \rangle - \langle \nabla_X Y, Z \rangle \\ &= \langle \nabla_X Z, Y \rangle - \langle \nabla_Z X, Y \rangle + \langle \nabla_Y Z, X \rangle - \langle \nabla_Z Y, X \rangle \\ &\quad + \langle \nabla_X Y, Z \rangle - \langle \nabla_Y X, Z \rangle + 2 \langle Z, \nabla_Y X \rangle \\ &= \langle \nabla_X Z - \nabla_Z X, Y \rangle + \langle \nabla_Y Z - \nabla_Z Y, X \rangle + \langle \nabla_X Y - \nabla_Y X, Z \rangle \\ &\quad + 2 \langle Z, \nabla_Y X \rangle \\ &= \langle [X, Z], Y \rangle + \langle [Y, Z], X \rangle + \langle [X, Y], Z \rangle + 2 \langle Z, \nabla_Y X \rangle. \end{aligned}$$

Resolvendo para $\langle Z, \nabla_Y X \rangle$, segue que

$$\begin{aligned} \langle Z, \nabla_Y X \rangle &= \frac{1}{2} \{ X \langle Y, Z \rangle + Y \langle Z, X \rangle - Z \langle X, Y \rangle \\ &\quad - \langle [X, Z], Y \rangle - \langle [Y, Z], X \rangle - \langle [X, Y], Z \rangle \}. \end{aligned} \quad (4)$$

Por fim, resta observar que

$$\nabla_Y X = \sum \langle P_i, \nabla_Y X \rangle P_i,$$

onde $\{P_i\}$ é uma base ortonormal de $T_p M$. Por (4), temos que a expressão de $\nabla_X Y$

depende apenas de X, Y e da base ortonormal escolhida, implicando na unicidade.

Agora, para mostrar a existência, seja $\mathbf{x} : U \rightarrow V$ um sistema de coordenadas de $V \subseteq M$. Definimos, para cada par $X_i = \frac{\partial}{\partial x_i}$ e $X_j = \frac{\partial}{\partial x_j}$,

$$\nabla_{X_i} X_j = \sum \langle P_i, \nabla_{X_i} X_j \rangle P_i,$$

onde P_i é uma base ortonormal e $\langle P_i, \nabla_{X_i} X_j \rangle$ denota a expressão em (4). O resultado segue do Lema 2.6. ■

De agora em diante, sempre que considerarmos uma variedade riemanniana, assumiremos que a variedade está munida com a conexão compatível com a métrica e simétrica. Tal conexão é chamada de conexão riemanniana ou conexão Levi-Civita.

Chamaremos os coeficientes $\Gamma_{i,j}^k$ de uma conexão Levi-Civita de símbolos de Christoffel.

Perceba a grandesa desse resultado: ele afirma que existe uma conexão que, de certa maneira, é intrínseca a variedade riemanniana. Quando consideramos a conexão Levi-Civita, não estamos fazendo uma conexão arbitrária entre planos tangentes, mas sim, estabelecendo um referencial que permite estudar propriedades de tal variedade riemanniana. Podemos calcular os símbolos de Christoffel em uma parametrização apenas utilizando os produtos internos desta. De fato, escrevendo $g_{i,j} = \langle X_i, X_j \rangle$, temos que

$$\langle X_l, \nabla_{X_i} X_j \rangle = \left\langle X_l, \sum_k \Gamma_{i,j}^k X_k \right\rangle = \sum_k \Gamma_{i,j}^k g_{l,k}.$$

Isso implica que

$$\begin{bmatrix} \langle X_1, \nabla_{X_i} X_j \rangle \\ \vdots \\ \langle X_n, \nabla_{X_i} X_j \rangle \end{bmatrix} = M \begin{bmatrix} \Gamma_{i,j}^1 \\ \vdots \\ \Gamma_{i,j}^n \end{bmatrix},$$

com

$$M = \begin{bmatrix} g_{1,1} & \cdots & g_{1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ g_{n,1} & \cdots & g_{n,n} \end{bmatrix}.$$

Como M é uma matriz de Gram, ela é invertível. Digamos que

$$M^{-1} = \begin{bmatrix} g^{1,1} & \cdots & g^{1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ g^{n,1} & \cdots & g^{n,n} \end{bmatrix}.$$

Segue que

$$\begin{bmatrix} \Gamma_{i,j}^1 \\ \vdots \\ \Gamma_{i,j}^n \end{bmatrix} = M^{-1} \begin{bmatrix} \langle X_1, \nabla_{X_i} X_j \rangle \\ \vdots \\ \langle X_n, \nabla_{X_i} X_j \rangle \end{bmatrix}$$

e, portanto,

$$\Gamma_{i,j}^k = \sum_l \langle X_l, \nabla_{X_i} X_j \rangle g^{k,l}. \quad (*)$$

A partir da equação 4 do Teorema 3.3,

$$\begin{aligned} \langle X_l, \nabla_{X_i} X_j \rangle &= \frac{1}{2} \left\{ X_j \langle X_i, X_l \rangle + X_i \langle X_l, X_j \rangle - X_l \langle X_j, X_i \rangle \right. \\ &\quad \left. - \langle [X_j, X_l], X_i \rangle - \langle [X_i, X_l], X_j \rangle - \langle [X_j, X_i], X_l \rangle \right\} \\ &= \frac{1}{2} \left\{ X_j g_{i,l} + X_i g_{l,j} - X_l g_{j,i} \right\}. \end{aligned} \quad (**)$$

De (*) e (**) segue que

$$\Gamma_{i,j}^k = \frac{1}{2} \sum_l \left\{ \frac{\partial}{\partial x_j} g_{i,l} + \frac{\partial}{\partial x_i} g_{l,j} - \frac{\partial}{\partial x_l} g_{j,i} \right\} g^{k,l}.$$

Conforme comentado anteriormente, analisemos exemplos de conexões Levi-Civita e de transporte paralelo.

Exemplos 3.4. 1. A conexão definida no Exemplo 3.3 é Levi-Civita. Com efeito,

$$\nabla_{e_i} e_j = \sum_l \left(\sum_k \delta_{k,i} \frac{\partial \delta_{l,j}}{\partial x_k} \right) e_l = \sum_l \frac{\partial \delta_{l,j}}{\partial x_i} e_l = \frac{\partial 1}{\partial x_i} e_j = 0,$$

isto é, todos os símbolos de Christoffel da conexão são nulos e, portanto, a conexão é simétrica. Para mostrar que é compatível com a métrica, observe que a derivada covariante, utilizando a expressão obtida na demonstração da Proposição 3.1, coincide com a derivada usual e, portanto, vale a regra de Leibniz, isto é, a conexão é compatível com a métrica. 2. Sendo $S \subseteq \mathbb{R}^3$ uma superfície regular e X, Y campos de vetores em S , definimos

$$(\nabla_X Y)_p = \text{proj}_{T_p M}(D_X Y(p)),$$

em que proj é a projeção ortogonal e D é a derivada usual de $\mathbb{R}^3$. É possível mostrar que essa é a conexão Levi-Civita da superfície e seus símbolos de Christoffel em uma parametrização coincidem com os estudados na Geometria Diferencial. 3. Pelo exemplo 2, conseguimos pensar no transporte paralelo estabelecido pela conexão Levi-Civita de maneira análoga a que fazemos na Geometria Diferencial. Em outras palavras, o transporte paralelo de um vetor ao longo da curva c é, do ponto de vista de um habitante da variedade, uma forma de movimentar o vetor de um ponto até o outro de maneira que eles permaneçam paralelos conforme ilustrado na imagem. **PLACEHOLDER: IMAGEM DO TRANSPORTE PARALELO NA ESFERA, FAZENDO ANALOGIA DO CARRO.**

Esse capítulo deixa claro a importância do estudo das métricas riemannianas e das conexões e como esses conceitos carregam propriedades semelhantes as que temos no

cálculo no $\mathbb{R}^n$, incluindo propriedades de derivação em produtos internos e derivadas de campos vetoriais ao longo de outros campos.

Referências Bibliográficas

POINCARÉ, Henri. **Science and hypothesis**. London: The Walter Scott Publishing Co., Ltd, 1905.