$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$T_n = a + (n-1)d$$

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$y = mx + c$$

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$$

$$\overline{x} = \frac{\Sigma fx}{n}$$

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$$

$$V = (\text{base A}) \times \text{Height}$$

$$V = \pi r^2 h$$

$$A = 2\pi r^2 + 2\pi rh$$

$$A = P(1 + in)$$

$$A = P(1 - in)$$

$$A = P(1 + i)^n$$

$$A = P(1 - i)^n$$

$$M\left(\frac{x_1 + x_2}{2}; \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$$

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$m = \tan\theta$$

$$\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}$$

$$P(A \text{ or } B) = P(A) + P(B) - P(A \text{ and } B)$$

$$V = \frac{1}{3} \times (\text{base A}) \times \text{Height}$$

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

$$A = 4\pi r^2$$