



Universidad Nacional Autónoma de México

FACULTAD DE CIENCIAS

MATEMÁTICAS PARA LAS CIENCIAS APLICADAS 1

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

4TA LISTA DE PROBLEMAS

Cuarto Parcial

Autores:

Ramírez Mendoza Joaquín Rodrigo

Villalobos Juárez Gontrán Eliut

Treviño Puebla Héctor Jerome

Noviembre 2024

4ta lista de problemas

Ramírez Mendoza Joaquín Rodrigo
Treviño Puebla Héctor Jerome
Villalobos Juárez Gontrán Eliut

24 de noviembre de 2024

Ejercicio 13 Capítulo 5 ABD

13.- Evalua la integral:

$$\int \frac{x}{(x^2 - 1)\sqrt{x^4 - 2x^2}} dx$$

Haciendo la sustitución de:

$$u = x^2 - 1$$

Así:

$$\frac{du}{dx} = \frac{d}{dx} x^2 - 1$$

$$\frac{du}{dx} = 2x$$

$$du = 2x dx$$

Para resolver esta integral, completaremos el T.C.P. (Trinomio Cuadrado Perfecto) que se encuentra adentro de la raíz de esta forma:

$$x^4 - 2x^2 = x^4 - 2x^2 + 1 - 1$$

$$x^4 - 2x^2 = (x^4 - 2x^2 + 1) - 1$$

$$x^4 - 2x^2 = (x^2 - 1)^2 - 1$$

Así nuestra integral resulta:

$$\int \frac{x}{(x^2 - 1)\sqrt{(x^2 - 1)^2 - 1}} dx$$

Ahora, podemos hacer uso de la Fórmula de 18 (Del formulario autorizado):

$$\int \frac{du}{u\sqrt{u^2 - a^2}} = \frac{1}{a} \operatorname{arcsec} \frac{u}{a} + c$$

Usando:

$$u^2 = (x^2 - 1)^2$$

$$a^2 = 1$$

$$u = (x^2 - 1)$$

$$a = 1$$

$$du = 2x dx$$

De esta forma:

$$\begin{aligned} \int \frac{du}{u\sqrt{u^2 - a^2}} &= \int \frac{x}{(x^2 - 1)\sqrt{(x^2 - 1)^2 - 1}} dx \\ \int \frac{du}{u\sqrt{u^2 - a^2}} &= \frac{1}{2} \int \frac{2x dx}{(x^2 - 1)\sqrt{(x^2 - 1)^2 - 1}} \end{aligned}$$

Tenemos:

$$\begin{aligned} \frac{1}{a} \operatorname{arcsec} \frac{u}{a} + c &= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{1} \operatorname{arcsec} \left(\frac{x^2 - 1}{1} \right) + c \right] \\ \frac{1}{a} \operatorname{arcsec} \frac{u}{a} + c &= \frac{1}{2} \operatorname{arcsec}(x^2 - 1) + c \end{aligned}$$

Resultado:

$$\int \frac{x}{(x^2 - 1)\sqrt{x^4 - 2x^2}} dx = \frac{1}{2} \operatorname{arcsec}(x^2 - 1) + c$$

Ejercicio 23 Capítulo 5 ABD

23. Utiliza una herramienta de calculo para encontrar las aproximaciones las aproximaciones del área bajo la curva $y = f(x)$ en el intervalo indicado usando $n = 10$ subintervalos, utilizando los puntos extremos izquierdo, derecho y el punto medio. Sea $y = f(x) = \ln x, [1, 2]$

23.1 Aproximación por el extremo izquierdo

Sabemos que el area definida en los puntos extremos está dada por la suma de sus particiones descritas como:

$$\sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x = \Delta x \sum_{i=1}^n f(x_i^*)$$

donde $\Delta x = \frac{(b-a)}{n}$ y $x_i^* = x_{i-1} = a + (i-1)\Delta x$

$$\begin{aligned} A &\approx \sum_{i=1}^{10} \ln(x_i^*) \Delta x = \Delta x \sum_{i=1}^{10} \ln(a + (i-1)\Delta x) \\ &= \Delta x \sum_{i=1}^{10} \ln(1 + (i-1)0.1) \end{aligned}$$

| $n = 10, \Delta x = \frac{2-1}{10} = 0.1$ | | | |
|---|--------------------|------------------------------|-------------|
| i | $i \cdot \Delta x$ | $x_i = 1 + i \cdot \Delta x$ | $f(x_i)$ |
| 1 | 0.1 | 1.1 | 0 |
| 2 | 0.2 | 1.2 | 0.09531018 |
| 3 | 0.3 | 1.3 | 0.182321557 |
| 4 | 0.4 | 1.4 | 0.262364264 |
| 5 | 0.5 | 1.5 | 0.336472237 |
| 6 | 0.6 | 1.6 | 0.405465108 |
| 7 | 0.7 | 1.7 | 0.470003629 |
| 8 | 0.8 | 1.8 | 0.530628251 |
| 9 | 0.9 | 1.9 | 0.587786665 |
| 10 | 1 | 2 | 0.641853886 |
| suma = 3.512205777 | | | |
| $A \approx \Delta x \sum_{i=1}^n = 0.351220578$ | | | |

Tabla 1: Metodo de Aproximación por el extremo izquierdo x_i

\therefore El área resultante con este método es 0.351220578 unidades de area.

23.2 Aproximación por el extremo derecho

$$\sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x = \Delta x \sum_{i=1}^n f(x_i^*)$$

donde $\Delta x = \frac{(b-a)}{n}$ y $x_i^* = a + i \Delta x$

$$\begin{aligned} A &\approx \sum_{i=1}^{10} \ln(x_i^*) \Delta x = \Delta x \sum_{i=1}^{10} \ln(a + i \cdot \Delta x) \\ &= \Delta x \sum_{i=1}^{10} \ln(1 + i \cdot 0.1) \end{aligned}$$

| $n = 10, \Delta x = \frac{2-1}{10} = 0.1$ | | | |
|---|------------------------|----------------------------------|-------------|
| i | $(i-1) \cdot \Delta x$ | $x_i = 1 + (i-1) \cdot \Delta x$ | $f(x_i)$ |
| 1 | 0 | 1 | 0.09531018 |
| 2 | 0.1 | 1.1 | 0.182321557 |
| 3 | 0.2 | 1.2 | 0.262364264 |
| 4 | 0.3 | 1.3 | 0.336472237 |
| 5 | 0.4 | 1.4 | 0.405465108 |
| 6 | 0.5 | 1.5 | 0.470003629 |
| 7 | 0.6 | 1.6 | 0.530628251 |
| 8 | 0.7 | 1.7 | 0.587786665 |
| 9 | 0.8 | 1.8 | 0.641853886 |
| 10 | 0.9 | 1.9 | 0.693147181 |
| suma = 4.205352958 | | | |
| $A \approx \Delta x \sum_{i=1}^n = 0.420535296$ | | | |

Tabla 2: Metodo de Aproximación por el extremo derecho x_i

\therefore El área resultante con este método es 0.420535296 unidades de area.

23.3 Aproximación por punto medio

$$\sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x = \Delta x \sum_{i=1}^n f(x_i^*)$$

donde $\Delta x = \frac{(b-a)}{n}$ y $x_i^* = a + (i - \frac{1}{2})\Delta x$

$$\begin{aligned} A &\approx \sum_{i=1}^{10} \ln(x_i^*) \Delta x = \Delta x \sum_{i=1}^{10} \ln(a + (i - \frac{1}{2})\Delta x) \\ &= \Delta x \sum_{i=1}^{10} \ln(1 + (i - \frac{1}{2}) * 0.1) \end{aligned}$$

| $n = 10, \Delta x = \frac{2-1}{10} = 0.1$ | | | |
|---|------------------------------------|--|-------------|
| i | $(i - \frac{1}{2}) \cdot \Delta x$ | $x_i = 1 + (i - \frac{1}{2}) \cdot \Delta x$ | $f(x_i)$ |
| 1 | 0.05 | 1.05 | 0.048790164 |
| 2 | 0.15 | 1.15 | 0.139761942 |
| 3 | 0.25 | 1.25 | 0.223143551 |
| 4 | 0.35 | 1.35 | 0.300104592 |
| 5 | 0.45 | 1.45 | 0.371563556 |
| 6 | 0.55 | 1.55 | 0.438254931 |
| 7 | 0.65 | 1.65 | 0.500775288 |
| 8 | 0.75 | 1.75 | 0.559615788 |
| 9 | 0.85 | 1.85 | 0.615185639 |
| 10 | 0.95 | 1.95 | 0.667829373 |
| suma = 3.865024825 | | | |
| $A \approx \Delta x \sum_{i=1}^n = 0.386502483$ | | | |

Tabla 3: Metodo de Aproximación por el punto medio x_i

\therefore El área resultante con este método es 0.386502483 unidades de area.

Ejercicio 42 Capitulo5

Calcular el área bajo la curva $y = \frac{1}{x}$ en el intervalo $[1, e^3]$.

El área bajo la curva está dada por la integral definida:

$$\int_1^{e^3} \frac{1}{x} dx$$

Plantear la integral

Tenemos:

$$\int_1^{e^3} \frac{1}{x} dx$$

Calcular la integral indefinida

Sabemos que:

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$$

Evaluar la integral definida

Sustituimos los límites de integración:

$$\int_1^{e^3} \frac{1}{x} dx = [\ln x]_1^{e^3}$$

Sustituir los límites

Evaluamos en los límites:

$$[\ln x]_1^{e^3} = \ln(e^3) - \ln(1)$$

Simplificar

Sabemos que:

$$\ln(e^3) = 3 \quad \text{y} \quad \ln(1) = 0$$

Por lo tanto:

$$\ln(e^3) - \ln(1) = 3 - 0 = 3$$

Resultado final

El área bajo la curva es:

$$\boxed{3}$$

Ejercicio 53 Capítulo 5 ABD

53.- Usa la parte 2 del Teorema Fundamental del Calculo y (donde sea necesario) la Fórmula 18 de la Sección 5.10 para encontrar las derivadas:

Recordando:

2da Parte del Teorema Fundamental del Calculo en el ABD:

$$\frac{d}{dx} \left[\int_a^b f(t) dt \right] = f(x)$$

Fórmula 18 Sección 5.10 ABD:

$$\frac{d}{dx} \left[\int_a^{g(x)} f(t) dt \right] = f(g(x))g'(x)$$

Para el caso de este ejercicio (53) haremos uso de la fórmula 18:

$$\frac{d}{dx} \left[\int_2^{\text{sen}(x)} \frac{1}{1+t^3} dt \right]$$

Con:

$$\begin{aligned} g(x) &= \text{sen}(x) \\ g'(x) &= \cos(x) \end{aligned}$$

Así:

$$f(g(x)) = \frac{1}{1 + \text{sen}^3(x)}$$

Por lo tanto:

$$f(g(x))g'(x) = \frac{1}{1 + \text{sen}^3(x)} (\cos(x))$$

El resultado es:

$$\frac{d}{dx} \left[\int_2^{\text{sen}(x)} \frac{1}{1+t^3} dt \right] = \frac{\cos(x)}{1 + \text{sen}^3(x)}$$

Ejercicio 56 Capítulo 5 ABD

Sea $F(x) = \int_0^x \frac{t^2 - 3}{t^4 + 7} dt$

- Encuentra los intervalos en los cuales F está aumentando y aquellos en los cuales F está disminuyendo.
- Encuentra los intervalos abiertos en los cuales F es cóncava hacia arriba y aquellos en los cuales F es cóncava hacia abajo.
- Encuentra los valores de x , si los hay, en los cuales la función F tiene extremos absolutos.
- Usa un CAS para graficar F , y confirma que los resultados en las partes (a), (b) y (c) son consistentes con la gráfica.

a) Regiones de crecimiento y decrecimiento Encontremos los puntos críticos por la prueba de la primer derivada Sabemos que, Por el teorema fundamental del cálculo

$$\begin{aligned} \frac{dF}{dx} = \frac{x^2 - 3}{x^4 + 7} = 0 &\iff x^2 - 3 = 0 \\ x^2 &= 3 \\ x &= \pm\sqrt{3} \end{aligned}$$

El análisis de signos de los intervalos

| Análisis de los intervalos | | | | |
|----------------------------|-----------------|---------------|-------|------------------|
| intervalo | Punto de prueba | $f'(x)$ | signo | conclusión |
| $(-\infty, -\sqrt{3}]$ | -2 | $\frac{+}{+}$ | + | f es creciente |
| $[-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$ | 0 | $\frac{-}{+}$ | - | f es decreciente |
| $[\sqrt{3}, \infty)$ | 2 | $\frac{+}{+}$ | + | f es creciente |

Tabla 4: tabla de análisis de signos de las regiones de crecimiento y decrecimiento.

\implies El análisis nos dice que f es creciente en el intervalo $(-\infty, -\sqrt{3}]$, decreciente en el intervalo $[-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$ y creciente nuevamente en el intervalo $[\sqrt{3}, \infty)$.

b) Análisis de concavidad.

Por la prueba de la segunda derivada podemos hacer el análisis.

$$\begin{aligned} \frac{d^2F}{dt^2} &= \frac{(t^4 + 7)(2t) - (t^2 - 3)(4t^3)}{(t^4 + 7)^2} \\ &= \frac{2t((t^4 + 7) - 2t^2(t^2 - 3))}{(t^4 + 7)^2} \\ &= \frac{-2t(-(t^4 + 7) + 2t^2(t^2 - 3))}{(t^4 + 7)^2} \\ &= \frac{-2t(2t^2(t^2 - 3) - (t^4 + 7))}{(t^4 + 7)^2} \\ &= \frac{-2t(2t^4 - 6t^2 - t^4 - 7)}{(t^4 + 7)^2} = 0 \\ &= \frac{-2t(t^4 - 6t^2 - 7)}{(t^4 + 7)^2} = 0 \iff -2t = 0 \text{ ó } t^4 - 6t^2 - 7 = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{Sea } u = x^2 &\implies u^2 - 6u - 7 = 0 \\
&\implies (u + 1)(u - 7) = 0 \\
&\implies u + 1 = 0 \quad u - 7 = 0 \\
&\implies u = -1 \quad u = +7 \\
&\implies x^2 = -1 \quad x^2 = +7 \\
&\implies x = \sqrt{-1} \quad x = \pm\sqrt{7} \\
&\implies x = \pm i \quad x = \pm\sqrt{7}
\end{aligned}$$

Como el polinomio tiene 3 raíces reales y dos imaginarias, consideraremos solo las raíces en el dominio de los reales. El análisis de signos de los intervalos

| Análisis de los intervalos | | | | |
|----------------------------|-----------------|---------------|-------|---------------------------|
| intervalo | Punto de prueba | $f'(x)$ | signo | conclusión |
| $(-\infty, -\sqrt{7}]$ | -3 | $\frac{+}{+}$ | + | f es concava hacia arriba |
| $(-\sqrt{7}, 0]$ | -1 | $\frac{+}{-}$ | - | f es concava hacia abajo |
| $(0, \sqrt{7}]$ | 1 | $\frac{-}{+}$ | + | f es concava hacia arriba |
| $(\sqrt{7}, \infty)$ | 3 | $\frac{-}{+}$ | - | f es concava hacia abajo |

Tabla 5: tabla de análisis de signos de las regiones de concavidad.

Concluimos que el análisis de concavidad: f es concava hacia arriba en $(-\infty, -\sqrt{7}]$ y $(0, \sqrt{7}]$ y f es concava hacia abajo en $(-\sqrt{7}, 0]$ y en $(\sqrt{7}, \infty)$

c) Sabemos que, por el teorema: Si f tiene un extremo absoluto en un intervalo abierto (a, b), entonces debe ocurrir en un punto crítico de f. Evaluemos los puntos críticos, tale que Para $x = -\sqrt{3}$

$$F(-\sqrt{3}) = \int_0^{-\sqrt{3}} \frac{t^2 - 3}{t^4 + 7} dt$$

Con ayuda de un graficador podermos determinar que


$$= 0.4558$$

$$\begin{aligned}
F(\sqrt{3}) &= \int_0^{\sqrt{3}} \frac{t^2 - 3}{t^4 + 7} dt \\
&= -0.4558
\end{aligned}$$

\therefore Concluimos que $-\sqrt{3}$ es un máximo absoluto y $\sqrt{3}$ es un mínimo absoluto.

| | | | | | |
|---|---|--|---------|---|--------|
| <pre>syms t f = (t^2 - 3) / (t^4 + 7); % Evaluar la integral definida en x = sqrt(3) integral_positivo = int(f, t, 0, sqrt(3)); valor_numerico_positivo = double(integral_positivo); disp('Valor numérico de la integral en x = sqrt(3)'); disp(valor_numerico_positivo); % Evaluar la integral definida en x = -sqrt(3) integral_negativo = int(f, t, 0, -sqrt(3)); valor_numerico_negativo = double(integral_negativo); disp('Valor numérico de la integral en x = -sqrt(3)'); disp(valor_numerico_negativo);</pre> | <table><tr><td>Valor numérico de la integral en x = sqrt(3)</td></tr><tr><td>-0.4558</td></tr><tr><td>Valor numérico de la integral en x = -sqrt(3)</td></tr><tr><td>0.4558</td></tr></table> | Valor numérico de la integral en x = sqrt(3) | -0.4558 | Valor numérico de la integral en x = -sqrt(3) | 0.4558 |
| Valor numérico de la integral en x = sqrt(3) | | | | | |
| -0.4558 | | | | | |
| Valor numérico de la integral en x = -sqrt(3) | | | | | |
| 0.4558 | | | | | |

d)Graficamos y Concluimos que es correcto



Ejercicio 64 Capítulo 5 ABD

Encontrar el valor promedio de $f(x) = e^x + e^{-x}$ en el intervalo $[\ln \frac{1}{2}, \ln 2]$.

El valor promedio de una función está dado por:

$$f_{\text{promedio}} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

En este caso, $f(x) = e^x + e^{-x}$, $a = \ln \frac{1}{2}$ y $b = \ln 2$.

Planteamiento

Sustituimos en la fórmula:

$$f_{\text{promedio}} = \frac{1}{\ln 2 - \ln \frac{1}{2}} \int_{\ln \frac{1}{2}}^{\ln 2} (e^x + e^{-x}) dx$$

Simplificar los límites del denominador

Sabemos que:

$$\ln 2 - \ln \frac{1}{2} = \ln 2 - \ln 2^{-1} = \ln 2 + \ln 2 = 2 \ln 2$$

Por lo tanto:

$$f_{\text{promedio}} = \frac{1}{2 \ln 2} \int_{\ln \frac{1}{2}}^{\ln 2} (e^x + e^{-x}) dx$$

Calcular la integral indefinida

$$\int (e^x + e^{-x}) dx = \int e^x dx + \int e^{-x} dx$$

Resolviendo cada término:

$$\int e^x dx = e^x, \quad \int e^{-x} dx = -e^{-x}$$

Por lo tanto:

$$\int (e^x + e^{-x}) dx = e^x - e^{-x} + C$$

Evaluar la integral definida

Sustituimos los límites:

$$\int_{\ln \frac{1}{2}}^{\ln 2} (e^x + e^{-x}) dx = [e^x - e^{-x}]_{\ln \frac{1}{2}}^{\ln 2}$$

Sustituir los límites en la función

Evalúamos:

$$[e^x - e^{-x}]_{\ln \frac{1}{2}}^{\ln 2} = (e^{\ln 2} - e^{-\ln 2}) - (e^{\ln \frac{1}{2}} - e^{-\ln \frac{1}{2}})$$

Simplificamos:

$$e^{\ln 2} = 2, \quad e^{-\ln 2} = \frac{1}{2}, \quad e^{\ln \frac{1}{2}} = \frac{1}{2}, \quad e^{-\ln \frac{1}{2}} = 2$$

Por lo tanto:

$$(e^{\ln 2} - e^{-\ln 2}) - (e^{\ln \frac{1}{2}} - e^{-\ln \frac{1}{2}}) = \left(2 - \frac{1}{2}\right) - \left(\frac{1}{2} - 2\right)$$

Simplificamos:

$$\left(2 - \frac{1}{2}\right) - \left(\frac{1}{2} - 2\right) = \frac{3}{2} + \frac{3}{2} = 3$$

Calcular el valor promedio

Sustituimos en la fórmula del promedio:

$$f_{\text{promedio}} = \frac{1}{2 \ln 2} \cdot 3 = \frac{3}{2 \ln 2}$$

Resultado final

El valor promedio es:

$$\boxed{\frac{3}{2 \ln 2}}$$

Ejercicio 68 Capítulo 5 ABD

68.- Una partícula se mueve a lo largo del eje-s. Use la información dada para encontrar la función posición de la partícula:

Información dada:

$$a(t) = 4\cos(2t)$$

$$v(0) = -1$$

$$s(0) = -3$$

Sabemos que al Integrar la Aceleración obtendremos la función de la velocidad de la partícula:

$$v(t) = \int a(t)dt$$

$$v(t) = \int 4\cos(2t)dt$$

$$v(t) = 4 \int \cos(2t)dt$$

Con:

$$u = 2t$$

$$du = 2dt$$

$$v(t) = 4 \frac{1}{2} \int \cos(2t)2dt$$

$$v(t) = \frac{4}{2} \int \cos(2t)2dt$$

$$v(t) = 2\sin(2t) + c$$

Para hallar la constante de integración (c) y dar a $v(t)$, ocuparemos la evaluación que nos dieron de la velocidad en el tiempo $t = 0$.

$$v(0) = -1 = 2\sin(0) + c$$

$$-1 = 2(0) + c$$

$$-1 = c$$

Así:

$$v(t) = 2\sin(2t) - 1$$

Hacemos un proceso semejante para hallar la función posición $s(t)$. Sabemos que al integrar la velocidad, obtendremos la posición.

$$s(t) = \int v(t)dt$$

$$s(t) = \int (2\text{sen}(2t) - 1)dt$$

$$s(t) = \int 2\text{sen}(2t)dt - \int dt$$

Con:

$$u = 2t$$

$$du = 2dt$$

$$s(t) = \frac{2}{2} \int \text{sen}(2t)dt - t + c$$

$$s(t) = -\frac{2}{2}\cos(2t) - t + c$$

$$s(t) = -\cos(2t) - t + c$$

Para hallar la c , seguimos un proceso semejante al anterior:

$$s(0) = -3 = -\cos(2(0)) - (0) + c$$

$$-3 = -\cos(0) + c$$

$$-3 = -1 + c$$

$$-3 + 1 = c$$

$$-2 = c$$

Así conseguimos la función posición $s(t)$ que buscábamos:

$$s(t) = -\cos(2t) - t - 2$$

Ejercicio 73 Capítulo 5 ABD

73. Una partícula se mueve con una velocidad de $v(t)\frac{m}{s}$ a lo largo de un eje s. Halla el desplazamiento y la distancia recorrida por la partícula en el intervalo de un tiempo dado.

Sabemos que la velocidad es la derivada de la posición. Calcularemos la diferencia de las posiciones para tener el desplazamiento total. Sea $v(t) = \frac{1}{2} - \frac{1}{t^2}, 1 \leq t \leq 3$

$$\begin{aligned}
 x(3) - x(1) &= \int_1^3 v(t) dt = \int_1^3 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{t^2} \right) dt \\
 &= \int_1^3 \frac{1}{2} dt - \int_1^3 \frac{1}{t^2} dt \\
 &= \frac{1}{2} t \Big|_1^3 - \int_1^3 t^{-2} dt \\
 &= \frac{1}{2} t \Big|_1^3 + t^{-1} \Big|_1^3 \\
 &= \frac{1}{2} t \Big|_1^3 + \frac{1}{t} \Big|_1^3 \\
 &= \frac{1}{2} t \Big|_1^3 + \frac{1}{t} \Big|_1^3 \\
 &= \frac{3}{2} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - 1 \\
 &= \frac{1}{3} \text{ m. de desplazamiento}
 \end{aligned}$$

\therefore el desplazamiento total es de $\frac{1}{3}$ m. de desplazamiento

Ahora sabemos que la posición se describe como $x(t) = \frac{t}{2} + \frac{1}{t}$

Podemos notar que el desplazamiento no siempre es en línea recta por lo que debemos preguntarnos: ¿Cuándo pasa que $v(t) = 0$?

$$\begin{aligned}
 v(t) = 0 &\iff \frac{1}{2} - \frac{1}{t^2} = 0 \iff \frac{1}{t^2} = \frac{1}{2} \\
 &\frac{2}{t^2} = 1 \\
 &2 = t^2 \\
 &t^2 = 2 \\
 &t = \sqrt{2}
 \end{aligned}$$

Debemos evaluar t en los límites

$$\begin{aligned}
 v(1) &= \frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2} \\
 v(3) &= \frac{1}{2} - \frac{1}{3^2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{9} = \frac{9-2}{18} = \frac{7}{18}
 \end{aligned}$$

Como la partícula fue cambiando de dirección después de que se detuviera, para hallar la distancia recorrida,

debemos sumar las áreas por debajo y por encima del eje.

$$\begin{aligned}
 \text{distancia} &= \left| x(3) - x(1) \right| = \int_1^3 |(v(t))| dt \\
 \therefore \int_1^{\sqrt{2}} \left| \frac{1}{2} - \frac{1}{t^2} \right| dt + \int_{\sqrt{2}}^3 \left| \frac{1}{2} - \frac{1}{t^2} \right| dt &= \int_1^{\sqrt{2}} \frac{1}{t^2} - \frac{1}{2} dt + \int_{\sqrt{2}}^3 \frac{1}{2} - \frac{1}{t^2} dt \\
 &= \left[\int_1^{\sqrt{2}} t^{-2} dt - \int_1^{\sqrt{2}} \frac{1}{2} dt \right] + \left[\int_{\sqrt{2}}^3 \frac{1}{2} dt - \int_{\sqrt{2}}^3 t^{-2} dt \right] \\
 &= \left[-\frac{1}{t} - \frac{t}{2} \right] \Big|_1^{\sqrt{2}} + \left[\frac{t}{2} - \frac{1}{t} \right] \Big|_{\sqrt{2}}^3 \\
 &= \left[\left(-\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{\sqrt{2}}{2} \right) - \left(-\frac{1}{1} - \frac{1}{2} \right) \right] + \left[\left(\frac{3}{2} - \frac{1}{3} \right) - \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \right] \\
 &= \left[-\frac{2\sqrt{2}}{2} + \frac{3}{2} \right] + \left[\frac{11}{6} - \frac{2\sqrt{2}}{2} \right] \\
 &= -\sqrt{2} + \frac{3}{2} + \frac{11}{6} - \sqrt{2} \\
 &= \frac{3}{2} + \frac{11}{6} - 2\sqrt{2} \\
 &= \frac{18 + 22}{12} - 2\sqrt{2} \\
 &= \frac{40}{12} - 2\sqrt{2} \\
 &= \frac{10}{3} - 2\sqrt{2}
 \end{aligned}$$

Se concluye entonces que la distancia total recorrida por la practica es $\frac{10}{3} - 2\sqrt{2} \simeq 0.50490 \text{ m}$

Ejercicio 76 capítulo 5 ABD

La función de velocidad dada es:

$$v(t) = \frac{2}{5}\sqrt{5t+1} + \frac{8}{5}.$$

Queremos calcular el **desplazamiento** y la **distancia** recorrida por la partícula en el intervalo $[0, 3]$.

Desplazamiento

El desplazamiento se calcula como la integral de la velocidad:

$$\text{Desplazamiento} = \int_0^3 v(t) dt.$$

Sustituimos $v(t)$ en la integral:

$$\int_0^3 v(t) dt = \int_0^3 \left(\frac{2}{5}\sqrt{5t+1} + \frac{8}{5} \right) dt.$$

Separando la integral:

$$\int_0^3 v(t) dt = \frac{2}{5} \int_0^3 \sqrt{5t+1} dt + \frac{8}{5} \int_0^3 1 dt.$$

Primera integral: $\int_0^3 \sqrt{5t+1} dt$

Sea $u = 5t + 1$, por lo tanto:

$$du = 5 dt \quad y \quad dt = \frac{1}{5} du.$$

Cuando $t = 0$, $u = 1$; y cuando $t = 3$, $u = 16$. Sustituyendo:

$$\int_0^3 \sqrt{5t+1} dt = \int_1^{16} \sqrt{u} \cdot \frac{1}{5} du = \frac{1}{5} \int_1^{16} u^{1/2} du.$$

La integral de $u^{1/2}$ es:

$$\int u^{1/2} du = \frac{2}{3} u^{3/2}.$$

Entonces:

$$\frac{1}{5} \int_1^{16} u^{1/2} du = \frac{1}{5} \left[\frac{2}{3} u^{3/2} \right]_1^{16} = \frac{2}{15} \left[u^{3/2} \right]_1^{16}.$$

Evaluamos los límites:

$$\frac{2}{15} \left[16^{3/2} - 1^{3/2} \right] = \frac{2}{15} \left[(16)^{3/2} - 1 \right].$$

Sabemos que $16^{3/2} = (16^{1/2})^3 = 4^3 = 64$, entonces:

$$\frac{2}{15} [64 - 1] = \frac{2}{15} \cdot 63 = \frac{126}{15} = \frac{42}{5}.$$

Segunda integral: $\int_0^3 1 dt$

La integral es directa:

$$\int_0^3 1 dt = [t]_0^3 = 3 - 0 = 3.$$

Combinando ambas integrales

Sustituyendo los resultados en la expresión original:

$$\int_0^3 v(t) dt = \frac{2}{5} \cdot \frac{42}{5} + \frac{8}{5} \cdot 3 = \frac{84}{25} + \frac{24}{5}.$$

Simplificamos $\frac{24}{5}$ a denominador 25:

$$\frac{24}{5} = \frac{120}{25}.$$

Entonces:

$$\int_0^3 v(t) dt = \frac{84}{25} + \frac{120}{25} = \frac{204}{25}.$$

Por lo tanto, el desplazamiento es:

| |
|-------------------------------------|
| Desplazamiento = $\frac{204}{25}$ m |
|-------------------------------------|

Distancia recorrida

La distancia recorrida es la misma que el desplazamiento, ya que $v(t) \geq 0$ en todo el intervalo $[0, 3]$. Entonces:

$$\text{Distancia} = \int_0^3 |v(t)| dt = \int_0^3 v(t) dt = \boxed{\frac{204}{25} \text{ m}}$$

Ejercicio 85 Capítulo 5 ABD

85.- Evalua la integral hacienodo una sustitución apropiada:

$$\int_0^1 \text{sen}^2(\pi x) \cos(\pi x) dx$$

Para la sustitución tomaremos a u como:

$$u = \text{sen}(\pi x)$$

Así:

$$\begin{aligned} \frac{du}{dx} &= \frac{d}{dx} \text{sen}(\pi x) \\ \frac{du}{dx} &= \cos(\pi x) \pi \\ du &= \pi \cos(\pi x) dx \end{aligned}$$

Así podemos usar la Fórmula 2 del formulario autorizado:

$$\int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + c$$

Con esto:


$$\begin{aligned} \int u^n du &= \int_0^1 \text{sen}^2(\pi x) \cos(\pi x) dx \\ \int_0^1 \text{sen}^2(\pi x) \cos(\pi x) dx &= \frac{1}{\pi} \int_0^1 \text{sen}^2(\pi x) \pi \cos(\pi x) dx \\ \int_0^1 \text{sen}^2(\pi x) \cos(\pi x) dx &= \frac{1}{\pi} \int_0^1 \text{sen}^2(\pi x) \pi \cos(\pi x) dx \\ \int_0^1 \text{sen}^2(\pi x) \cos(\pi x) dx &= \frac{1}{\pi} \left[\frac{\text{sen}^3(\pi x)}{3} \right]_0^1 \\ \int_0^1 \text{sen}^2(\pi x) \cos(\pi x) dx &= \frac{1}{\pi} \left[\frac{\text{sen}^3(\pi(1))}{3} - \frac{\text{sen}^3(\pi(0))}{3} \right] \\ \int_0^1 \text{sen}^2(\pi x) \cos(\pi x) dx &= \frac{1}{\pi} \left[\frac{\text{sen}^3(\pi)}{3} - \frac{\text{sen}^3(0)}{3} \right] \\ \int_0^1 \text{sen}^2(\pi x) \cos(\pi x) dx &= \frac{1}{\pi} \left[\frac{0}{3} - \frac{0}{3} \right] \\ \int_0^1 \text{sen}^2(\pi x) \cos(\pi x) dx &= \frac{1}{\pi} [0] \end{aligned}$$

Así el resultado de la integral es:

$$\int_0^1 \text{sen}^2(\pi x) \cos(\pi x) dx = 0$$

Capítulo 6 ABD ejercicio 7

a) Establezca una suma de integrales definidas que represente el área sombreada total entre las curvas $y = f(x)$ e $y = g(x)$ en la siguiente figura. b) Encuentra el área total encerrada entre $y = x^3$ e $y = x$ en el intervalo $[-1, 2]$.



Si f y g son funciones continuas en el intervalo $[a, b]$, y si $f(x) \geq g(x)$ para todo x en $[a, b]$, entonces el área de la región delimitada por $y = f(x)$ arriba, $y = g(x)$ abajo, a la izquierda por la línea $x = a$, y a la derecha por la línea $x = b$ es

$$A = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$$

Entonces se puede observar que $f(x) \geq g(x)$ en el intervalo $[a, b]$ \therefore el área de la región dada $f(x)$ y $g(x)$ es

$$A_1 = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$$

Por otro lado se puede observar que $f(x) \leq g(x) \forall x \in [b, c]$ \therefore el área está dada como

$$A_2 = \int_b^c [g(x) - f(x)] dx$$

Del mismo modo, el análisis de la región acotada por el intervalo $[c, d]$, observamos que $f(x) \geq g(x) \forall x \in [c, d]$ \therefore el área se describe como

$$A_3 = \int_c^d [f(x) - g(x)] dx$$

Entonces el área total está dada por la suma de estas tres áreas individuales tal que

$$A_T = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx + \int_b^c [g(x) - f(x)] dx + \int_c^d [f(x) - g(x)] dx$$

De este modo tenemos en cuenta los casos cuando $f(x) \geq g(x)$ y $f(x) \leq g(x)$

b) Encuentra el área total encerrada entre $y = x^3$ e $y = x$ en el intervalo $[-1, 2]$. Sean $y = f(x) = x$ y $y = g(x) = x^3$ ¿Cuándo pasa que son iguales?

$$f(x) = g(x) \iff x_1 = x_2^3$$

$$f(x) = g(x) \iff 0 = x_2^3 - x$$

$$f(x) = g(x) \iff 0 = x(x-1)(x+1)$$

Son iguales en $x = 0$, $x = 1$ y $x = -1$

Procedemos a hacer el análisis de desigualdades

| Análisis de los intervalos | | | | |
|----------------------------|-----------------|--------|--------|-------------|
| intervalo | Punto de prueba | $f(x)$ | $g(x)$ | desigualdad |
| $(-1, 0]$ | $-1/2$ | $-1/2$ | $-1/8$ | $f < g$ |
| $(0, 1]$ | $1/2$ | $1/2$ | $1/8$ | $f > g$ |
| $(1, 2]$ | $3/2$ | $3/2$ | $27/8$ | $f < g$ |

Tabla 6: tabla de análisis de signos de las regiones

Entonces aplicando la definición anterior, el área total está dada por

$$\begin{aligned}
 A_T &= \int_{-1}^0 [g(x) - f(x)]dx + \int_0^1 [f(x) - g(x)]dx + \int_1^2 [g(x) - f(x)]dx \\
 A_T &= \int_{-1}^0 [x^3 - x]dx + \int_0^1 [x - x^3]dx + \int_1^2 [x^3 - x]dx \\
 A_T &= \int_{-1}^0 x^3 dx - \int_{-1}^0 x dx + \int_0^1 x dx - \int_0^1 x^3 dx + \int_1^2 x^3 dx - \int_1^2 x dx \\
 A_T &= \left(\frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2} \right) \Big|_{-1}^0 + \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4} \right) \Big|_0^1 + \left(\frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2} \right) \Big|_1^2 \\
 A_T &= -\left(\frac{-1^4}{4} - \frac{-1^2}{2} \right) + \left(\frac{1^2}{2} - \frac{1^4}{4} \right) + \left(\frac{2^4}{4} - \frac{2^2}{2} \right) - \left(\frac{1^4}{4} - \frac{1^2}{2} \right) \\
 A_T &= \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + (4 - 2) + \frac{1}{4} \\
 A_T &= \frac{1}{2} + 2 + \frac{1}{4} \\
 A_T &= 0.5 + 2 + 0.25 \\
 A_T &= 2.75
 \end{aligned}$$

el área total es 2.75 unidades de área

Ejercicio 13 Capítulo 6 ABD

13.- Encuentra la longitud del arco en el segundo cuadrante de la curva:

$$x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = 4$$

De: $x = -8$ hasta $x = -1$.

Para esto, ocuparemos la fórmula:

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

Para tener la curva en Función de x , despejamos de la curva dada:

$$\begin{aligned} x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} &= 4 \\ y^{\frac{2}{3}} &= 4 - x^{\frac{2}{3}} \\ (y^{\frac{2}{3}})^{\frac{3}{2}} &= (4 - x^{\frac{2}{3}})^{\frac{3}{2}} \\ y &= (4 - x^{\frac{2}{3}})^{\frac{3}{2}} \end{aligned}$$

Ahora, para evaluar la integral, necesitamos la 1er derivada de esta función de x

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} (4 - x^{\frac{2}{3}})^{\frac{3}{2}} \\ y' &= \frac{3}{2} (4 - x^{\frac{2}{3}})^{\frac{3}{2} - \frac{1}{2}} \frac{d}{dx} (4 - x^{\frac{2}{3}}) \\ y' &= \frac{3}{2} (4 - x^{\frac{2}{3}})^{\frac{1}{2}} \left(-\frac{2}{3} x^{-\frac{1}{3}} \right) \\ y' &= -(4 - x^{\frac{2}{3}})^{\frac{1}{2}} (x^{-\frac{1}{3}}) \\ y' &= \frac{-(4 - x^{\frac{2}{3}})^{\frac{1}{2}}}{x^{\frac{1}{3}}} \end{aligned}$$

Ya que hemos derivado al función podemos evaluarla en la integral como se indica, resolveremos:

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx = \int_{-8}^{-1} \sqrt{1 + \left[\frac{-(4 - x^{\frac{2}{3}})^{\frac{1}{2}}}{x^{\frac{1}{3}}} \right]^2} dx$$

Desarrollando:

$$L = \int_{-8}^{-1} \sqrt{1 + \left[\frac{-(4 - x^{\frac{2}{3}})^{\frac{1}{2}}}{x^{\frac{1}{3}}} \right]^2} dx$$

$$L = \int_{-8}^{-1} \sqrt{1 + \left[\frac{(-(4 - x^{\frac{2}{3}})^{\frac{1}{2}})^2}{(x^{\frac{1}{3}})^2} \right]} dx$$

$$L = \int_{-8}^{-1} \sqrt{1 + \frac{(4 - x^{\frac{2}{3}})^{\frac{2}{2}}}{x^{\frac{2}{3}}}} dx$$

$$L = \int_{-8}^{-1} \sqrt{1 + \frac{4 - x^{\frac{2}{3}}}{x^{\frac{2}{3}}}} dx$$

$$L = \int_{-8}^{-1} \sqrt{\frac{x^{\frac{2}{3}} + 4 - x^{\frac{2}{3}}}{x^{\frac{2}{3}}}} dx$$

$$L = \int_{-8}^{-1} \sqrt{\frac{4}{x^{\frac{2}{3}}}} dx$$

$$L = \int_{-8}^{-1} \frac{\sqrt{4}}{\sqrt{x^{\frac{2}{3}}}} dx$$

$$L = \int_{-8}^{-1} \frac{2}{(x^{\frac{2}{3}})^{\frac{1}{2}}} dx$$

$$L = \int_{-8}^{-1} \frac{2}{x^{\frac{1}{3}}} dx$$

$$L = 2 \int_{-8}^{-1} \frac{1}{x^{\frac{1}{3}}} dx$$

$$L = 2 \int_{-8}^{-1} x^{-\frac{1}{3}} dx$$

$$L = 2 \int_{-8}^{-1} x^{-\frac{1}{3}} dx$$

$$L = 2 \left[\frac{3x^{\frac{2}{3}}}{2} \right]_{-8}^{-1}$$

$$L = 2 \left[\frac{3(-8)^{\frac{2}{3}}}{2} - \frac{3(-1)^{\frac{2}{3}}}{2} \right]$$

$$L = 2 \left[\frac{3(2^{\frac{6}{3}})}{2} - \frac{3(1)}{2} \right]$$

Continuación:

$$L = 2 \left[\frac{3(2^{\frac{6}{3}})}{2} - \frac{3(1)}{2} \right]$$

$$L = 2 \left[\frac{3(2^2)}{2} - \frac{3}{2} \right]$$

$$L = 2 \left[\frac{3(4)}{2} - \frac{3}{2} \right]$$

$$L = 2 \left[\frac{12}{2} - \frac{3}{2} \right]$$

$$L = 2 \left[\frac{12 - 3}{2} \right]$$

$$L = 2 \left[\frac{9}{2} \right]$$

$$L = 9 \text{ unidades}$$

Capítulo 6 ABD Ejercicio 16

Dada la curva $27x - y^3 = 0$ entre $y = 0$ y $y = 2$, queremos encontrar la superficie generada en tres casos distintos.

Parte (a): Revolución alrededor del eje x

La fórmula general para la superficie de revolución alrededor del eje x es:

$$S = \int 2\pi y \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy.$$

De la ecuación de la curva, despejamos x :

$$x = \frac{y^3}{27}.$$

Derivamos x respecto a y :

$$\frac{dx}{dy} = \frac{3y^2}{27} = \frac{y^2}{9}.$$

Sustituimos en la fórmula de S :

$$S = \int_0^2 2\pi y \sqrt{1 + \left(\frac{y^2}{9}\right)^2} dy.$$

Parte (b): Revolución alrededor del eje y

La fórmula general para la superficie de revolución alrededor del eje y es:

$$S = \int 2\pi x \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx.$$

De la ecuación de la curva, despejamos y :

$$y = (27x)^{1/3}.$$

Derivamos y respecto a x :

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{3}(27x)^{-2/3} \cdot 27 = 9x^{-2/3}.$$

Sustituimos en la fórmula de S :

$$S = \int_0^{8/27} 2\pi x \sqrt{1 + (9x^{-2/3})^2} dx.$$

Parte (c): Revolución alrededor de la línea $y = -2$

Cuando la rotación es alrededor de $y = -2$, ajustamos la distancia al eje de rotación sumando 2 a y . La fórmula de la superficie es:

$$S = \int 2\pi(y+2) \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy.$$

Sustituimos:

$$S = \int_0^2 2\pi(y+2) \sqrt{1 + \left(\frac{y^2}{9}\right)^2} dy.$$

capitulo 6 ABD ejercicio 19

Un resorte ejerce una fuerza de $0.5N$ cuando se estira $0.25m$ más allá de su longitud natural. Suponiendo que se aplica la ley de Hooke. a) ¿Cuánto trabajo se realizó para estirar el resorte hasta esta longitud? b) ¿Cuánto más allá de su longitud natural se puede estirar el resorte con $25J$ de trabajo?

Sabemos que $W = \int_a^b F(x)dx$ donde $F = F(x)$ es la fuerza. \therefore

$$\begin{aligned} F &= F(x) = k \cdot x \\ 0.5 &= k \cdot (0.25) \\ \implies k &= \frac{0.5}{0.25} = 2 \end{aligned}$$

Susutituimos en la integral.

$$\begin{aligned} W &= \int_0^{0.25} 2x dx = 2 \int_0^{0.25} x dx \\ &= 2 \frac{x^2}{2} \Big|_0^{0.25} = x^2 \Big|_0^{0.25} \\ &= (0.25)^2 = \left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{1}{16} J \end{aligned}$$

Concluimos que $16J$ es el trabajo realizado.

b) ¿Cuándo pasa que $W = 25J$?

Sabemos que el trabajo está descrito como la ecuación $W = x^2$ para nuestro resorte.

$$\implies x^2 = 25 \iff x = \sqrt{25} = 5 \text{ m}$$

Por lo tanto 5 m es la longitud a la que se estira el resorte al aplicarle un trabajo de $25J$

Capitulo 7 ABD ejercicio 8

Evaluar la integral $\int_0^1 \frac{x^3}{\sqrt{x^2+1}} dx$

a) Usando integración por partes.

$$\frac{x^3}{\sqrt{x^2+1}} = x^3(x^2+1)^{-\frac{1}{2}} \therefore \text{definimos las partes tales que } u = x^2, dv = x(x^2+1)^{-\frac{1}{2}} dx, du = 2x dx$$

$$v = \int x(x^2+1)^{-\frac{1}{2}} dx$$

$$u = x^2 + 1 \quad du = 2x dx \implies x dx = \frac{1}{2} du$$

$$v = \frac{1}{2} \int u^{-1/2} du$$

$$= \frac{1}{2} \frac{u^{1/2}}{\frac{1}{2}} = u^{1/2}$$

$$\therefore v = (x^2+1)^{1/2}$$

\therefore Aplicando la formula de integración por partes tenemos que

$$x^2 \cdot \sqrt{x^2+1} \Big|_0^1 - 2 \int_0^1 (x^2+1)^{1/2} x dx$$

$$\text{definimos } u = x^2 + 1 \quad du = 2x dx \implies x dx = \frac{1}{2} du, u(0) = 1, u(1) = 2$$

$$\implies x^2 \cdot \sqrt{x^2+1} \Big|_0^1 - \int_1^2 u^{1/2} du = x^2 \cdot \sqrt{x^2+1} \Big|_0^1 - \frac{u^{3/2}}{3/2} \Big|_1^2$$

$$= x^2 \cdot \sqrt{x^2+1} \Big|_0^1 - \frac{2}{3} u^{3/2} \Big|_1^2 = \sqrt{2} - \frac{2}{3} (2^{3/2} - 1)$$

$$= \sqrt{2} - \frac{4\sqrt{2}}{3} + \frac{2}{3} = \frac{3\sqrt{2}}{3} - \frac{4\sqrt{2}+2}{3}$$

$$= \frac{3\sqrt{2} - 4\sqrt{2} + 2}{3}$$

$$= \frac{-\sqrt{2} + 2}{3}$$

b) Usando la sustitución $u = \sqrt{x^2+1}$

$$\implies u^2 = x^2 + 1 \therefore x^2 = u^2 - 1, 2x dx = 2u du \implies x dx = u du, u(0) = 1, u(2) = \sqrt{2}$$

$$\int_0^1 \frac{x^3}{\sqrt{x^2+1}} dx = \int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt{x^2+1}} x dx = \left(\frac{u^3}{3} - u \right) \Big|_1^{\sqrt{2}}$$

$$= \int_1^{\sqrt{2}} \frac{u^2 - 1}{u} u du = \left(\frac{\sqrt{2}^3}{3} - \sqrt{2} \right) - \left(\frac{1}{3} - 1 \right)$$

$$= \int_1^{\sqrt{2}} u^2 - 1 du = \left(\frac{2\sqrt{2}}{3} - \frac{3\sqrt{2}}{3} \right) + \left(\frac{2}{3} \right)$$

$$= \int_1^{\sqrt{2}} u^2 du - \int_1^{\sqrt{2}} du = \frac{2\sqrt{2} - 3\sqrt{2} + 2}{3}$$

$$= \frac{-\sqrt{2} + 2}{3}$$

Ejercicio 14 Capítulo 7 ABD

14.- Una partícula que se mueve a lo largo del eje-x, tiene una función velocidad:

$$v(t) = t^3 e^{-t}$$

Que tan lejos la partícula viaja desde el tiempo $t = 0$ hasta $t = 5$.

Para encontrar lo que recorrió debemos resolver la integral de la función $v(t)$ en el intervalo dado: (D = Distancia)

$$D = \int_0^5 v(t) dt$$

Es decir:

$$D = \int_0^5 t^3 e^{-t} dt$$

Para resolver esta integral, lo haremos por Integración por Partes y haciendo uso de:

$$\int u dv = uv - \int v du$$

Resolviendo:

$$D = \int_0^5 t^3 e^{-t} dt$$

Con:

$$\begin{aligned} u &= t^2 \\ du &= 2t dt \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} dv &= e^{-t} dt \\ \int dv &= \int e^{-t} dt \\ v &= -e^{-t} \end{aligned}$$

Sust en la Fórmula de Integración por Partes:

$$D = (t^2)(-e^{-t}) - \int_0^5 -e^{-t} 2t dt \quad (1)$$

$$D = (t^2)(-e^{-t}) + 2 \int_0^5 e^{-t} t dt$$

Ahora, para resolver:

$$\int_0^5 e^{-t} t dt$$

Usaremos:

$$\begin{aligned} u &= t \\ du &= dt \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} dv &= e^{-t} dt \\ \int dv &= \int e^{-t} dt \\ v &= -e^{-t} \end{aligned}$$

Así:

$$\begin{aligned}\int_0^5 e^{-t} t dt &= (t)(-e^{-t}) - \int -e^{-t} dt \\ \int_0^5 e^{-t} t dt &= (t)(-e^{-t}) + \int e^{-t} dt \\ \int_0^5 e^{-t} t dt &= (t)(-e^{-t}) - e^{-t} \\ \int_0^5 e^{-t} t dt &= (e^{-t})(-t - 1) \\ \int_0^5 e^{-t} t dt &= (-e^{-t})(t + 1)\end{aligned}$$

Reemplazado de vuelta en (1):

$$\begin{aligned}D &= (t^2)(-e^{-t}) + 2 \int_0^5 e^{-t} t dt = (t^2)(e^{-t}) + 2[(-e^{-t})(t + 1)] \Big|_0^5 \\ D &= (t^2)(-e^{-t}) + 2(-e^{-t})(t + 1) \Big|_0^5 \\ D &= (-e^{-t})[t^2 + 2(t + 1)] \Big|_0^5 \\ D &= (-e^{-t})[t^2 + 2t + 2] \Big|_0^5 \\ D &= (-e^{-t})[t^2 + 2t + 2] \Big|_0^5 \\ D &= [(-e^{-(5)})((5)^2 + 2(5) + 2)] - [(-e^{-(0)})((0)^2 + 2(0) + 2)] \\ D &= [(-e^{-(5)})[25 + 10 + 2]] - [(-e^{-(0)})[0 + 0 + 2]] \\ D &= [(-e^{-(5)})[37]] - [(-e^{-(0)})[2]] \\ D &= [(-e^{-(5)})[37]] - [-\frac{1}{e^0}[2]] \\ D &= [(-e^{-(5)})[37]] - [-\frac{1}{1}[2]] \\ D &= -37e^{-(5)} - [-2] \\ D &= -37e^{-(5)} + 2\end{aligned}$$

Así la partícula se movió:

$$D = -37e^{-5} + 2 \text{ unidades}$$

o

$$D = -\frac{37}{e^5} + 2 \text{ unidades}$$

Capítulo 7 ABD Ejercicio 33

Queremos resolver la integral:

$$\int \frac{1}{x^3 - x} dx.$$

Parte (a): Sustitución $x = \sec \theta$

Sea $x = \sec \theta$, entonces:

$$dx = \sec \theta \tan \theta d\theta.$$

La expresión $x^3 - x$ se transforma en:

$$x^3 - x = \sec^3 \theta - \sec \theta = \sec \theta (\sec^2 \theta - 1) = \sec \theta \tan^2 \theta.$$

Sustituyendo todo en la integral:

$$\int \frac{1}{x^3 - x} dx = \int \frac{\sec \theta \tan \theta d\theta}{\sec \theta \tan^2 \theta} = \int \frac{1}{\tan \theta} d\theta = \int \cot \theta d\theta.$$

La integral de $\cot \theta$ es:

$$\int \cot \theta d\theta = \ln |\sin \theta| + C.$$

Regresamos a la variable x :

$$\sin \theta = \sqrt{\frac{x^2 - 1}{x^2}}, \quad \text{por lo tanto: } \ln |\sin \theta| = \ln \sqrt{\frac{x^2 - 1}{x^2}} = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{x^2 - 1}{x^2} \right).$$

Finalmente:

$$\boxed{\int \frac{1}{x^3 - x} dx = \ln \sqrt{\frac{x^2 - 1}{x^2}} + C = \ln \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{|x|} + C}$$

Esta expresión es válida para $|x| > 1$.

Parte (b): Sustitución $x = \sin \theta$

Sea $x = \sin \theta$, entonces:

$$dx = \cos \theta d\theta.$$

La expresión $x^3 - x$ se transforma en:

$$x^3 - x = \sin^3 \theta - \sin \theta = \sin \theta (\sin^2 \theta - 1) = -\sin \theta \cos^2 \theta.$$

Sustituyendo todo en la integral:

$$\int \frac{1}{x^3 - x} dx = \int \frac{\cos \theta d\theta}{-\sin \theta \cos^2 \theta} = -\int \frac{1}{\sin \theta \cos \theta} d\theta = -\int \csc \theta d\theta.$$

La integral de $\csc \theta$ es:

$$\int \csc \theta d\theta = \ln |\csc \theta - \cot \theta| + C.$$

Regresamos a la variable x :

$$\csc \theta = \frac{1}{x}, \quad \cot \theta = \sqrt{\frac{1 - x^2}{x^2}}, \quad \text{entonces:}$$

$$\ln |\csc \theta - \cot \theta| = \ln \left| \frac{1}{x} - \sqrt{\frac{1 - x^2}{x^2}} \right| = \ln \left| \frac{1 - \sqrt{1 - x^2}}{x} \right|.$$

Por lo tanto:

$$\boxed{\int \frac{1}{x^3 - x} dx = \ln \left| \frac{1 - \sqrt{1 - x^2}}{x} \right| + C}$$

Esta expresión es válida para $0 < |x| < 1$.

Parte (c): Fracciones parciales

Factorizamos $x^3 - x$:

$$x^3 - x = x(x - 1)(x + 1).$$

Escribimos la fracción como suma de fracciones parciales:

$$\frac{1}{x^3 - x} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x - 1} + \frac{C}{x + 1}.$$

Resolviendo para A , B , y C , obtenemos:

$$\frac{1}{x^3 - x} = \frac{1}{x} - \frac{1}{2(x - 1)} + \frac{1}{2(x + 1)}.$$

Entonces:

$$\int \frac{1}{x^3 - x} dx = \int \frac{1}{x} dx - \frac{1}{2} \int \frac{1}{x - 1} dx + \frac{1}{2} \int \frac{1}{x + 1} dx.$$

Resolvemos las integrales:

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln |x|, \quad \int \frac{1}{x - 1} dx = \ln |x - 1|, \quad \int \frac{1}{x + 1} dx = \ln |x + 1|.$$

Por lo tanto:

$$\boxed{\int \frac{1}{x^3 - x} dx = \ln |x| - \frac{1}{2} \ln |x - 1| + \frac{1}{2} \ln |x + 1| + C}$$

Capítulo 7 ABD ejercicio 41

Aproxima la integral utilizando (a) la aproximación del punto medio M_{10} , (b) la aproximación trapezoidal T_{10} y (c) la aproximación de la regla de Simpson S_{20} . En cada caso, encuentra el valor exacto de la integral y aproxima el error absoluto. Expresa tus respuestas con al menos cuatro decimales.

Sea la integral $\int_1^3 \frac{1}{\sqrt{x+1}} dx$
 Calculemos la integral

$$\begin{aligned} \int_1^3 \frac{1}{\sqrt{x+1}} dx &= \int_1^3 (x+1)^{-1/2} dx \\ u = x+1, du = dx &\implies, u(1) = 2, u(3) = 4 \int_2^4 u^{-1/2} du = \frac{u^{1/2}}{1/2} \Big|_2^4 \\ &= 2u^{1/2} \Big|_2^4 = 2\sqrt{4} - 2\sqrt{2} \simeq 1.1715728 \end{aligned}$$

1) Aproximación con el punto medio (M_{10})

$$\sum_{j=1}^n f(x_j^*) \Delta x = \Delta x \sum_{j=1}^n f(x_j^*)$$

donde $\Delta x = \frac{(b-a)}{n}$ y $x_j^* = a + (j - \frac{1}{2})\Delta x$

Definimos $\Delta x = \frac{3-1}{10} = \frac{1}{5}$ y $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x+1}}$

$$\int_1^3 \frac{1}{\sqrt{x+1}} dx \approx \Delta x \sum_{j=1}^n f(x_j^*) = \Delta x \sum_{j=1}^n \frac{1}{\sqrt{(1 + (j - \frac{1}{2})\Delta x) + 1}}$$

| $n = 10, \Delta x = \frac{1}{5} = 0.2$ | | | |
|--|------------------------------------|--|-------------|
| i | $(j - \frac{1}{2}) \cdot \Delta x$ | $x_j = 1 + (j - \frac{1}{2}) \cdot \Delta x$ | $f(x_j)$ |
| 1 | 0.1 | 1.1 | 0.690065559 |
| 2 | 0.3 | 1.3 | 0.659380473 |
| 3 | 0.5 | 1.5 | 0.632455532 |
| 4 | 0.7 | 1.7 | 0.608580619 |
| 5 | 0.9 | 1.9 | 0.58722022 |
| 6 | 1.1 | 2.1 | 0.567961834 |
| 7 | 1.3 | 2.3 | 0.550481883 |
| 8 | 1.5 | 2.5 | 0.534522484 |
| 9 | 1.7 | 2.7 | 0.519875245 |
| 10 | 1.9 | 2.9 | 0.506369684 |
| suma = 5.856913533 | | | |
| $A \approx \Delta x \sum_{j=1}^{10} = 1.171382707$ | | | |

Tabla 7: Metodo de Aproximación por el método del punto medio

\therefore el área con esta aproximación es $A \approx \Delta x \sum_{j=1}^{10} = 1.171382707$

$$|EM| = |4 - 2\sqrt{2} - M_{10}| = 1.171572875 - 1.171382707 = 0.000190169$$

2) Aproximación con el método trapezoidal (T_{10})

$$\sum_{j=1}^n A(T_j) \Delta x = \frac{\Delta x}{2} \left[f(x_0) + 2 \sum_{j=1}^{n-1} f(x_j) + f(x_n) \right]$$

donde $\Delta x = \frac{(b-a)}{n} = \frac{3-1}{10} = \frac{2}{10} = 0.2$ y $x_j = a + j\Delta x$

Definimos $f(0) = f(a)$, $f(x_j) = \frac{1}{\sqrt{x_j+1}}$, $f(n-1) = f(x_{n-1}) = \frac{1}{\sqrt{x_{n-1}+1}}$, $f(n) = f(x_n) = \frac{1}{\sqrt{x_n+1}}$

$$\int_1^3 \frac{1}{\sqrt{x+1}} dx \approx \frac{\Delta x}{2} \left[\frac{1}{\sqrt{a+1}} + 2 \sum_{j=1}^{n-1} \frac{1}{\sqrt{x_j+1}} + \frac{1}{\sqrt{x_n+1}} \right]$$

| $n = 10, \Delta x = \frac{1}{5} = 0.2$ | | | |
|--|-------|--|-------------|
| i | x_j | $x_j = 1 + (j - \frac{1}{2}) \cdot \Delta x$ | $f(x_j)$ |
| 0 | 1 | 0.707106781 | 0.707106781 |
| 1 | 1.2 | 0.674199862 | 1.348399725 |
| 2 | 1.4 | 0.645497224 | 1.290994449 |
| 3 | 1.6 | 0.620173673 | 1.240347346 |
| 4 | 1.8 | 0.597614305 | 1.195228609 |
| 5 | 2 | 0.577350269 | 1.154700538 |
| 6 | 2.2 | 0.559016994 | 1.118033989 |
| 7 | 2.4 | 0.542326145 | 1.084652289 |
| 8 | 2.6 | 0.527046277 | 1.054092553 |
| 9 | 2.8 | 0.512989176 | 1.025978352 |
| 10 | 3 | 0.5 | 0.5 |
| suma = 11.71953463 | | | |
| $A \approx \frac{\Delta x}{2} \sum_{j=1}^{10} A(T_j) = 1.1719583463$ | | | |

Tabla 8: Metodo de Aproximación por el método del trapecio

\therefore el área con esta aproximación es $A \approx \Delta x \sum_{j=1}^{10} = 1.1719583463$

$$|EM| = |4 - 2\sqrt{2} - T_{10}| = 1.171572875 - 1.1719583463 = 0.000380588$$

3) Aproximación con la regla de Simpson(S_{10})

$$\int_a^b v(t)dt \simeq \frac{b-a}{3n} \left[v(t_0) + 4v(t_1) + 2v(t_2) + \dots + 2v(t_{2n-2}) + 4v(t_{2n-1}) + v(t_{2n}) \right]$$

Se sugiere que si combinamos dos veces la aproximación del punto medio con la aproximación trapezoidal, los errores se cancelan entre sí. Por lo tanto, la integral se puede aproximar como:

$$S_n = \frac{1}{3}(2M_k + T_k), n = 2k$$

Entonces, sustituyendo en la formula los resultados anteriormente dados

$$S_{20} = \frac{1}{3}(2(1.171382707) + 1.1719583463) = \frac{1}{3}(3.514718876) = 1.171572959$$

$$|EM| = |4 - 2\sqrt{2} - S_{20}| = 1.171572875 - 1.171572959 = -8.35151 \cdot 10^{-8}$$

Como se puede observar, el error es casi nulo siendo un número muy pequeño.

Ejercicio 51 Capítulo 7 ABD

51.- Encuentra el área encerrada entre el eje-x y la curva:

$$y = \frac{\ln(x) - 1}{x^2}$$

Para $x \geq e$.

Esto quiere decir que encontraremos el área dada por la Integral:

$$A = \int_e^\infty \frac{\ln(x) - 1}{x^2} dx$$

Para hacer el calculo de esta integral que es infinita en su límite superior de la integral, haremos uso de un límite: Así el área esta dad por:

$$A = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_e^k \frac{\ln(x) - 1}{x^2} dx$$

Usaremos también el método de Integración por Partes:

$$\int u dv = uv - \int v du$$

Con:

$$\begin{aligned} u &= \ln(x) - 1 \\ du &= \frac{1}{x} dx \end{aligned} \qquad \begin{aligned} dv &= \frac{1}{x^2} dx \\ \int dv &= \int x^{-2} dx \\ v &= -\frac{1}{x} \end{aligned}$$

Así, reemplazando tenemos que:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_e^k \frac{\ln(x) - 1}{x^2} dx = (\ln(x) - 1)\left(\frac{-1}{x}\right) - \int \left(\frac{-1}{x}\right)\left(\frac{1}{x}\right) dx$$

Resilviendo sin aplicar el Límite:

$$\begin{aligned} (\ln(x) - 1)\left(\frac{-1}{x}\right) - \int \left(\frac{-1}{x}\right)\left(\frac{1}{x}\right) dx &= -(\ln(x) - 1)\left(\frac{1}{x}\right) + \int \left(\frac{1}{x}\right)\left(\frac{1}{x}\right) dx \\ &= (\ln(x) - 1)\left(-\frac{1}{x}\right) + \int x^{-2} dx \\ &= (\ln(x) - 1)\left(-\frac{1}{x}\right) + \frac{x^{-1}}{-1} \\ &= (\ln(x) - 1)\left(-\frac{1}{x}\right) - \frac{1}{x} \\ &= \left(-\frac{1}{x}\right)((\ln(x) - 1) + 1) \\ &= \left(-\frac{1}{x}\right)(\ln(x)) \\ &= -\frac{\ln(x)}{x} \end{aligned}$$

Evaluando:

$$\begin{aligned} & \lim_{k \rightarrow \infty} \left[-\frac{\ln(x)}{x} \right]_e^k \\ & \left[\lim_{k \rightarrow \infty} -\frac{\ln(k)}{k} \right] - \left[-\frac{\ln(e)}{e} \right] \\ & \left[\lim_{k \rightarrow \infty} -\frac{\ln(k)}{k} \right] - \left[-\frac{\ln(e)}{e} \right] \\ & \left[\lim_{k \rightarrow \infty} -\frac{\ln(k)}{k} \right] - \left[-\frac{1}{e} \right] \end{aligned}$$

El Límite $\left[\lim_{k \rightarrow \infty} -\frac{\ln(k)}{k} \right]$ tiende a 0, por lo tanto:

$$[0] - \left[-\frac{1}{e} \right]$$

$$0 + \frac{1}{e}$$

Así el área encerrada entre el eje x y la curva $y = \frac{\ln(x)-1}{x^2}$ es:

$$A = \frac{1}{e} \text{ unidades cuadradas}$$

Problema planteado por el maestro

Se perfora una esfera de metal de radio R ¿ 6 mm haciéndole un "túnel cilíndrico de 6 mm de largo que pasa por el centro de la esfera y que deja un sólido con forma de "anillo". Mostrar que el volumen del sólido no depende de R y que es igual a 36π mm³:

$$f(3) = \sqrt{R^2 - x^2} \Big|_{x=3} = \sqrt{R^2 - 3^2} = \sqrt{R^2 - 9}$$

$$\begin{aligned} & 2 \cdot 2\pi \int_{f(3)}^R x \sqrt{R^2 - x^2} dx \\ &= 4\pi \int_9^0 -\frac{1}{2} \sqrt{u} du = -2\pi \int_9^0 \sqrt{u} du \end{aligned}$$

$$\text{Sustituyendo: } u = R^2 - x^2, \quad du = -2x dx, \quad x dx = -\frac{1}{2} du$$

$$u(f(3)) = u(\sqrt{R^2 - 9}) = R^2 - (R^2 - 9) = 9$$

$$u(R) = R^2 - R^2 = 0$$

$$-2\pi \int_9^0 \sqrt{u} du = 2\pi \int_0^9 \sqrt{u} du$$

$$2\pi \int_0^9 u^{1/2} du = 2\pi \left[\frac{2u^{3/2}}{3} \right]_0^9$$

$$= 2\pi \left(\frac{2(9)^{3/2}}{3} - \frac{2(0)^{3/2}}{3} \right)$$

$$= \frac{4\pi \cdot 9^{3/2}}{3} = \frac{4}{3}\pi(27) = 9 \cdot 4\pi = 36\pi$$