

CASO REAL · MANEJO BIOLÓGICO GREEN SCIENCE

SORGO

En un suelo degradado, arcilloso y compactado, tras maíz forrajero, aplicamos BIOGUARD (Trichoderma) y BIOMAX 43. En el rastrojo se ven los hongos benéficos multiplicándose: el producto queda en el suelo, lo sana y recoloniza la flora microbiana. En simultáneo, control biológico del cogollero.

ZONAS DE TRABAJO EN BOLIVIA

Norte Integrado – Santa Cruz

Cuatro Cañadas

San Julián

Pailón

RESULTADOS DEL CASO

Trichoderma

Colonizando el rastrojo

+ M.O.

Recuperación de materia orgánica

3x

Aplicaciones de BIOMAX 43

Sin

residuos

MEJORAS EN EL SUELO

- ✓ El biofungicida (Trichoderma) queda en el rastrojo y se multiplica en el suelo.
- ✓ Recolonización de la flora microbiana benéfica, sanando el suelo.
- ✓ Recuperación de suelos degradados, arcillosos y compactados.
- ✓ Más materia orgánica y mejor estructura campaña tras campaña.

CONTROL DE PLAGAS Y SANIDAD

- ✓ BIOMAX 43: control biológico del cogollero (vs. benzoato + piretroide).
- ✓ BIOGUARD: sanidad del cultivo y del suelo.
- ✓ Menor presión de plagas con manejo biológico sostenido.
- ✓ Sin residuos, cuidando la fauna benéfica.



El producto queda en el rastrojo y se multiplica en el suelo: va sanando el suelo y recolonizando la flora microbiana.

— Ing. de campo · Recuperación de suelo, Santa Cruz

ANTES Y DESPUÉS — RECUPERACIÓN DEL SUELO

SUELO DEGRADADO



Suelo arcilloso, compactado y sin materia orgánica

SUELO EN RECUPERACIÓN



Rastrojo colonizado por hongos benéficos (Trichoderma)

REGISTRO DEL ENSAYO



Monitoreo del cogollero



Micelio benéfico en el rastrojo



Hongos multiplicándose en el suelo



Inspección del cultivo

DATOS DEL ENSAYO

Zona / lote: Norte de Santa Cruz

Cultivo: Sorgo / maíz forrajero

Productos: BIOGUARD (Trichoderma) · BIOMAX 43

Manejo: Biológico

Resultado: Suelo colonizado por hongos benéficos

Fuente: Equipo técnico

Caso real documentado por BioAgroSolutions · Línea Green Science. Fotos y datos aportados por productores y equipo técnico en campo.