

GRUPO BIOLÓGICO · ORGÁNICO MICROBIANO

BIOMAX 43

BIOINSECTICIDA LÍQUIDO



Control biológico de plagas por ingestión y contacto, sin residuos.

BENEFICIOS CLAVE

- ✓ Control total de plagas
- ✓ Reacción rápida
- ✓ 100% biológico, sin residuos
- ✓ Orugas, chinches, trips y ácaros

DESCRIPCIÓN Y MODO DE ACCIÓN

BIOMAX 43 combina bacterias, actinomicetos y hongos entomopatógenos con distintos modos de acción, lo que dificulta la aparición de resistencias. Actúa por ingestión (cristales Bt y spinosinas) y por contacto (hongos que infectan al insecto).

Una vez que el insecto ingiere o entra en contacto con el producto, se interrumpe su alimentación, se reduce su reproducción y sobreviene la muerte. Al ser microorganismos vivos, no deja residuos tóxicos y cuida la fauna benéfica y la sanidad del cultivo.

COMPOSICIÓN DEL CONSORCIO

Chromobacterium subtsugae	20%	Bacillus thuringiensis aizawai	10%
Saccharopolyspora spinosa	20%	Beauveria bassiana	10%
Ácidos húmicos y fúlvicos	20%	Metarhizium anisopliae	10%
Bacillus thuringiensis kurstaki	10%		

FUNCIÓN DE CADA MICROORGANISMO DEL CONSORCIO

Cada cepa cumple un rol específico; juntas actúan de forma complementaria.

Chromobacterium subtsugae	Bacteria con metabolitos insecticidas de amplio espectro (chinches, escarabajos, ácaros); actúa por ingestión y contacto.
Saccharopolyspora spinosa	Actinomiceto que produce spinosinas, insecticida natural que actúa sobre el sistema nervioso del insecto por ingestión y contacto.
Bacillus thuringiensis kurstaki	Produce cristales proteicos (Cry) que, ingeridos por las orugas (lepidópteros), dañan su intestino y las matan.
Bacillus thuringiensis aizawai	Cristales Bt específicos para orugas, útiles ante poblaciones resistentes; actúan por ingestión.
Beauveria bassiana	Hongo entomopatógeno (muscardina blanca): germina sobre el insecto, lo penetra y lo mata por dentro.
Metarhizium anisopliae	Hongo entomopatógeno (muscardina verde): infecta al insecto por contacto, penetra su cutícula y lo coloniza hasta matarlo.
Ácidos húmicos y fúlvicos	Coadyuvantes orgánicos: mejoran la estructura del suelo, quelatan nutrientes y potencian la acción de los microorganismos.

MOMENTOS DE APLICACIÓN

- ✓ Al detectar la plaga en el monitoreo.
- ✓ Secuencial cada 10–15 días bajo presión.
- ✓ Preferible al atardecer o en días nublados.

MODO DE EMPLEO Y DOSIS

Aplicar según el monitoreo de la plaga, con buena cobertura del follaje. Diluir 1 L en 200 L de agua para hortalizas y frutales.

Dosis: Secuencial 1 L/ha

CULTIVOS

Aplicable en todos los cultivos. Controla plagas de insectos en cereales, oleaginosas, hortalizas, frutales, vid, berries y más.

COMPATIBILIDAD

Compatible con la mayoría de abonos y plaguicidas. No mezclar con fungicidas/bactericidas químicos que puedan dañar los microorganismos; realizar prueba previa.

ALMACENAMIENTO Y CARENCIA

Envase de 1 L. Conservar cerrado, fresco y bajo sombra. Sin periodo de carencia por la naturaleza biológica del producto.