



BioAgroSolutions

SOLUCIONES BIOLÓGICAS PARA EL SUELO

GUÍA PRÁCTICA GRATUITA

Tips para frenar las hierbas no deseadas

Cómo reducir la presión de malezas con manejo, cobertura y
competencia, antes de depender del herbicida



Argentina · Bolivia

Material de distribución libre · 2026

WhatsApp [+54 9 2262 48-7998](https://wa.me/5492262487998)

La maleza no es el problema: es el síntoma

Una maleza que domina un lote está contando algo del suelo. Compactación, exceso de humedad, desbalance de nutrientes o suelo desnudo: siempre hay una condición que la favorece. Si solo se ataca la planta, vuelve la campaña que viene.

El herbicida resuelve el presente, pero la presión de malezas se define mucho antes: en la rotación, en la cobertura del suelo, en la densidad de siembra y en el banco de semillas que se fue acumulando. Esta guía ordena las herramientas de manejo de la más preventiva a la más reactiva.

5 años

VIVEN LAS SEMILLAS
o más, en el banco del suelo

1 planta

PUEDA DEJAR
hasta 200.000 semillas

30 %

DE PÉRDIDA
por competencia sin control

Primero: qué te está diciendo esa maleza

Las malezas son indicadores de las condiciones del suelo. Identificar la dominante orienta qué corregir:

Maleza dominante	Qué suele indicar	Qué corregir
Cardo	Suelo compactado y con alto nitrógeno.	Descompactar y equilibrar la fertilización.
Cola de caballo	Exceso de humedad, mal drenaje y acidez.	Drenaje y corrección de pH.
Cebollín (Cyperus)	Compactación y encharcamiento.	Estructura del suelo y drenaje.
Diente de león y llantén	Compactación superficial y bajo calcio.	Descompactar y revisar bases.
Yuyo colorado (Amaranthus)	Suelo fértil, removido y con espacios libres.	Cobertura y competencia del cultivo.
Rama negra (Conyza)	Suelo descubierto en el barbecho.	Cultivos de servicio y cobertura.
Gramón (Cynodon)	Suelo degradado y con historia de laboreo.	Recuperación biológica y rotación.
Verdolaga	Suelo fértil con buena humedad superficial.	Manejo de la cobertura.
Ortiga	Alto contenido de nitrógeno y materia orgánica.	Ajustar la fertilización nitrogenada.

CÓMO USAR ESTA TABLA

No es una regla exacta, pero funciona como pista. Si una maleza domina año tras año en el mismo sector, revisá esa condición del suelo: casi siempre está ahí la causa de fondo.

1. Cortar el ingreso de semillas

Toda semilla que entra al lote va a estar dando trabajo durante años. Prevenir es lo más barato que existe.

- ✓ Usá semilla limpia y certificada. Una partida contaminada siembra la maleza junto con el cultivo.
- ✓ Limpiá la cosechadora y la maquinaria al pasar de un lote a otro, sobre todo si viene de un lote con resistencia conocida.
- ✓ Controlá los bordes, alambrados, banquinas y canales: son el reservorio desde el que se reinfesta el lote.
- ✓ No dejes que las escapadas semillen. Una planta que llega a semilla anula todo el control de la campaña.
- ✓ Cuidado con el estiércol y las camas sin compostar: son una vía clásica de entrada de semillas viables.

2. Tapar el suelo: cobertura y cultivos de servicio

El suelo desnudo es una invitación. La maleza necesita luz para germinar y establecerse; una cobertura densa se la quita.

- ✓ Un rastrojo abundante y bien distribuido reduce la germinación de malezas de semilla chica, que necesitan luz.
- ✓ Los cultivos de servicio (centeno, avena, vicia, nabo forrajero) compiten por luz, agua y nutrientes durante el barbecho, que es cuando más se infesta el lote.
- ✓ El centeno además tiene efecto alelopático: libera sustancias que inhiben la germinación de otras semillas.
- ✓ Para que funcione, el cultivo de servicio tiene que generar volumen: una cobertura rala no suprime nada.
- ✓ En huerta y frutales, el acolchado o mulch con paja, chip o cobertura viva cumple la misma función.

3. Hacer que el cultivo gane la carrera

La competencia del propio cultivo es la herramienta más subestimada. Un cultivo que cierra el surco rápido deja poco espacio para la maleza.

- ✓ Densidad de siembra: dentro del rango recomendado, la densidad alta cierra antes el entresurco.
- ✓ Distancia entre surcos: reducirla acelera el cierre del canopeo y reduce la luz que llega al suelo.
- ✓ Fecha de siembra: sembrar cuando la temperatura favorece al cultivo y no a la maleza le da ventaja de arranque.
- ✓ Uniformidad de emergencia: un cultivo parejo compite mejor que uno con fallas y manchones.
- ✓ Vigor inicial: una plántula que arranca fuerte, con buena raíz, sombrea antes. Acá el tratamiento de semilla hace diferencia real.

EL PERÍODO CRÍTICO DE COMPETENCIA

Cada cultivo tiene una ventana en la que la maleza le hace el daño irreversible: en general entre los 20 y los 45 días desde la emergencia. Si el lote llega limpio a esa ventana, lo que nazca después casi no afecta el rendimiento. Concentrá el esfuerzo ahí.

4. Rotar de verdad

- ✓ El monocultivo selecciona las malezas adaptadas a ese ciclo y a ese herbicida. Es la fábrica de resistencias.
- ✓ Alternar cultivos de invierno y de verano rompe el ciclo de emergencia de muchas especies.
- ✓ Alternar gramíneas con leguminosas cambia el ambiente, la competencia y los modos de acción utilizados.
- ✓ Incluir una pastura o un cultivo de cobertura por unos años reduce fuertemente el banco de semillas.

5. Control mecánico, bien usado

- ✓ Rastra de dientes flexibles: efectiva sobre malezas recién emergidas, en estado de hilo blanco. Después ya no.
- ✓ Escardillo o cultivador entre surcos: útil en cultivos de surco ancho y en huerta.
- ✓ Corte o desmalezada: no elimina la planta pero evita que semille, que es lo importante.
- ✓ Cuidado con el laboreo excesivo: remover el suelo trae semillas viejas a la superficie, destruye la estructura y a mediano plazo empeora el problema.
- ✓ En huerta, la carpida temprana y superficial es más efectiva que la profunda y tardía.

6. Herramientas para huerta y superficies chicas

- ✓ Solarización: cubrir el suelo húmedo con polietileno transparente durante 4 a 6 semanas en verano. El calor mata semillas y patógenos.
- ✓ Acolchado con material orgánico: paja, pasto seco o chip, en capa de al menos 5 a 8 cm.
- ✓ Agua caliente o vapor en senderos y bordes.
- ✓ Densidad y asociación de cultivos: ocupar todo el espacio disponible con plantas útiles.

7. Pastoreo e integración animal

- ✓ El pastoreo controlado sobre rastrojos y verdeos consume malezas antes de que semillen.
- ✓ Los animales aportan estiércol y ciclan nutrientes, mejorando el suelo al mismo tiempo.
- ✓ Hay que manejar la carga y el tiempo: el sobrepastoreo deja el suelo desnudo y empeora el problema de malezas.
- ✓ Evita que el ganado pase de un lote infestado a uno limpio sin un período de descanso: transportan semillas.

8. Herbicida: cuándo y cómo

El herbicida es una herramienta más, no la estrategia completa. Usado como único recurso genera resistencia y deja de funcionar.

- ✓ Aplica sobre malezas chicas y en activo crecimiento: es cuando más eficaz es y menos dosis requiere.
- ✓ Rotá modos de acción, no solo marcas comerciales. Dos productos distintos pueden tener el mismo mecanismo.
- ✓ Respetá dosis y condiciones de aplicación: subdosificar es la forma más rápida de seleccionar resistencia.
- ✓ Cuidá la calidad de aplicación: pastillas, presión, volumen, agua limpia y sin exceso de dureza.
- ✓ Aplica con viento y temperatura adecuados. La deriva es pérdida de producto y riesgo para el vecino.
- ✓ No mezcles herbicidas con productos biológicos sin verificar compatibilidad: podés anular los microorganismos.

Un suelo sano compite mejor

Los lotes con buena estructura, buena cobertura y actividad biológica tienen menos presión de malezas, porque el cultivo arranca más rápido y ocupa el espacio antes. Trabajar el suelo desde la biología no reemplaza al control de malezas, pero baja la presión año tras año y hace que cada herramienta funcione mejor.

Resumen: el orden que funciona

Prioridad	Acción	Cuándo se decide
1	Evitar el ingreso de semillas y controlar bordes.	Todo el año.
2	Mantener el suelo cubierto: rastrojo y cultivos de servicio.	Barbecho.
3	Rotación de cultivos y de modos de acción.	Al planificar la campaña.
4	Competencia del cultivo: densidad, surco, fecha, vigor.	A la siembra.
5	Control mecánico o químico oportuno y bien aplicado.	Período crítico.
6	Impedir que las escapadas lleguen a semilla.	Antes de cosecha.

¿Hay una maleza que no podés frenar?

Contanos cuál es y cómo viene tu lote. Te ayudamos a entender por qué aparece y a armar una estrategia que no dependa solo del herbicida.

Escribinos por WhatsApp

+54 9 2262 48-7998

Asesoramiento técnico sin costo · Argentina y Bolivia

BioAgroSolutions · Línea Green Science