



BioAgroSolutions

SOLUCIONES BIOLÓGICAS PARA EL SUELO

GUÍA PRÁCTICA GRATUITA

Cómo hacer ganadería regenerativa

Pastoreo planificado, descanso del pasto y suelo vivo: más kilos por hectárea mejorando el campo en lugar de gastarlo



Argentina · Bolivia

Material de distribución libre · 2026

WhatsApp +54 9 2262 48-7998

Qué es la ganadería regenerativa

Es producir carne o leche mejorando el suelo, el pasto y el agua al mismo tiempo. No es dejar de producir: es entender que el pasto y el suelo son el capital, y que el animal es la herramienta para hacerlos crecer.

La diferencia con la ganadería tradicional está en el manejo del tiempo. En el pastoreo continuo el animal elige y vuelve a comer el mismo rebrote una y otra vez, agotando las plantas más buenas. En el pastoreo planificado se controla cuánto tiempo está el animal en la parcela y, sobre todo, cuánto descansa esa parcela antes de volver a pastorearla.

+ kg

POR HECTÁREA
con la misma superficie

Descanso

LA CLAVE
el pasto se recupera entero

Suelo

EL CAPITAL
que se construye o se gasta

Los cinco principios

1 Mantener el suelo cubierto

El suelo desnudo se calienta, se seca, se erosiona y pierde biología. La cobertura es la primera regla: nunca dejar el suelo pelado, ni siquiera después del pastoreo.

2 Minimizar la perturbación

Menos laboreo, menos químicos innecesarios, menos sobrepastoreo. Cada perturbación innecesaria le cuesta al suelo años de recuperación.

3 Maximizar la diversidad

Un pastizal diverso, con gramíneas, leguminosas y hierbas, es más productivo, más estable frente a la seca y mejor alimento que un monocultivo forrajero.

4 Mantener raíces vivas todo el año

Las raíces vivas alimentan a los microorganismos del suelo. Un campo con plantas activas todo el año construye materia orgánica; uno que queda pelado en invierno, la pierde.

5 Integrar el animal

El animal bien manejado cicla nutrientes, deposita estiércol y orina, pisa el rastrojo y estimula el rebrote. Mal manejado, hace exactamente lo contrario.

El corazón del sistema: tiempo de ocupación y descanso

Dos números definen todo: cuántos días está el animal en la parcela y cuántos días descansa esa parcela antes de que vuelva.

| Tiempo de ocupación

- ✓ Cuanto más corto, mejor. Lo ideal es que el animal no esté en la parcela el tiempo suficiente como para comer el rebrote de la planta que ya comió.
- ✓ En pastos de crecimiento rápido, no más de 3 días por parcela. Con franjas diarias el resultado es aún mejor.
- ✓ Ocupaciones largas equivalen a pastoreo continuo dentro de la parcela: la planta buena se sobrepastorea igual.

Tiempo de descanso

- ✓ Es la variable más importante y la que más se descuida. El descanso debe alcanzar para que la planta recupere sus reservas y su volumen de hoja.
- ✓ No es un número fijo: depende de la velocidad de rebrote. En primavera con humedad puede ser de 25 a 35 días; en verano seco o en invierno, de 60 a 90 días o más.
- ✓ La regla práctica: se vuelve a la parcela cuando la planta recuperó su altura y su vigor, no cuando lo dice el calendario.
- ✓ Volver antes de tiempo es la causa número uno del deterioro de un campo ganadero.

EL ERROR CLÁSICO

Dividir el campo en parcelas y rotar sin ajustar el descanso a la velocidad de rebrote. En un verano seco, mantener la misma rotación que en primavera destruye la pastura: la planta no llegó a recuperarse y se la vuelve a comer.

Alturas de entrada y salida

Trabajar con altura de pasto es la forma más simple de acertarle al momento. Valores orientativos, a ajustar según especie y zona:

Recurso forrajero	Altura de entrada	Altura de salida
Raigrás anual	20 – 25 cm	5 – 8 cm
Festuca	20 – 25 cm	8 – 10 cm
Alfalfa	Inicio de floración o rebrotes basales	5 – 8 cm
Pasturas consociadas	20 – 30 cm	8 – 10 cm
Campo natural	Según especie dominante	Dejar 50 % del volumen
Verdeos de verano (sorgo, moha)	50 – 70 cm	15 – 20 cm

La altura de salida es tan importante como la de entrada: si se come demasiado bajo, la planta tarda mucho más en rebrotar porque tiene que reconstruir hoja antes de poder crecer.

Cómo calcular la carga

1 Estimá el forraje disponible

Cortá y pesá el pasto de un metro cuadrado en varios puntos y lleválo a materia seca por hectárea. Con práctica se estima a ojo comparando con cortes conocidos.

2 Calculá el consumo

Un animal consume aproximadamente entre 2,5 y 3 % de su peso vivo en materia seca por día. Una vaca de 400 kg come del orden de 10 a 12 kg de materia seca diarios.

3 Ajustá por eficiencia de cosecha

No todo el pasto disponible se aprovecha. En pastoreo planificado se cosecha en el orden del 50 a 60 % del forraje ofrecido.

4 Dimensioná la parcela

Dividí el forraje aprovechable por la demanda diaria del rodeo y vas a tener cuántos días alcanza esa parcela o cuánta superficie necesitás por día.

Diseño del sistema

- ✓ Empezá simple: dividir un potrero grande en 4 u 8 parcelas ya cambia el resultado. No hace falta hacer todo el campo de entrada.
- ✓ El boyero eléctrico es la herramienta más flexible y barata para subdividir. Un alambrado fijo perimetral y divisiones eléctricas móviles suele ser la mejor combinación.
- ✓ El agua es el factor limitante del diseño: el animal no debería caminar más de 250 a 400 metros hasta la aguada. Si camina más, pastorea desperejo y gasta energía.
- ✓ Diseñá las parcelas de forma que el acceso al agua sea cómodo desde todas, con bebederos centrales o corredores.
- ✓ Sombra y reparo: fundamentales en verano y en parición. Los árboles no son un lujo, son parte del sistema.

El suelo bajo la pastura

Todo lo anterior tiene un solo objetivo: que el suelo mejore. Estos son los indicadores para saber si vas bien:

Indicador	Cómo se mide	Qué buscar
Cobertura del suelo	Mirar el suelo al ras después del pastoreo.	Sin suelo desnudo visible.
Diversidad de especies	Contar especies distintas en un metro cuadrado.	Que aumente año a año.
Infiltración	Cuánto tarda en absorber 1 litro de agua.	Cada vez más rápido.
Lombrices	Contar en un bloque de 20 x 20 x 20 cm.	Más de 8 a 10 por bloque.
Materia orgánica	Análisis de laboratorio.	Tendencia creciente.
Estiércol	Cuánto tarda en desaparecer la bosta.	Que se degrade rápido: indica biología activa.

LA BOSTA COMO INDICADOR

Si las bostas quedan meses secas y enteras en el campo, la vida del suelo está apagada: faltan escarabajos, lombrices y microorganismos. En un campo sano, la bosta se integra al suelo en semanas y no deja el manchón de rechazo alrededor.

Agua, estiércol e instalaciones

- ✓ El agua de bebida limpia impacta directo en el consumo y en la ganancia de peso. Un animal no toma bien de un bebedero sucio.
- ✓ Los bebederos y comederos con biofilm y materia orgánica acumulada son foco de problemas sanitarios.
- ✓ El estiércol acumulado en corrales, si se maneja bien, es un recurso: compostado vuelve al campo como fertilizante biológico.
- ✓ Los bioactivadores y probióticos se usan para acelerar la degradación de la materia orgánica en instalaciones, aguas residuales y camas, y para mejorar la flora digestiva del animal.

Cómo empezar sin arriesgar el sistema

1 Elegí un potrero piloto

No conviertas todo el campo de golpe. Empezá por uno y aprendé ahí.

2 Dividilo y medí antes de empezar

Registrá cobertura, especies presentes, lombrices e infiltración. Sin la foto inicial no vas a poder demostrar la mejora.

3 Definí el descanso según el rebrote

Observá la planta, no el calendario. Ajustá la rotación cada estación.

4 Llevá registro

Fechas de entrada y salida, carga, altura de pasto y observaciones. El registro es lo que convierte la experiencia en conocimiento.

5 Ampliá lo que funcionó

Con los resultados del piloto, escalá al resto del campo con los ajustes aprendidos.

Errores más frecuentes

- ✓ Rotar sin respetar el descanso: es la causa principal de fracaso del sistema.
- ✓ Dejar el animal demasiados días en la misma parcela.
- ✓ Pastorear demasiado bajo y no dejar remanente: la planta pierde capacidad de rebrote.
- ✓ No adaptar la rotación a la estación y a la seca.
- ✓ Diseñar parcelas sin resolver el acceso al agua.
- ✓ No medir: sin registro no se sabe si el campo está mejorando o solo se está trabajando más.

Lo que hay que entender

En ganadería regenerativa no se alimenta al animal: se alimenta al suelo, que alimenta al pasto, que alimenta al animal. Cuando ese orden se respeta, el campo produce más cada año en lugar de menos. Y la biología del suelo es la que hace todo el trabajo pesado, gratis, si se le dan las condiciones.

¿Querés empezar con pastoreo planificado?

Te ayudamos a diseñar las parcelas, calcular la carga y definir los descansos de tu campo. Empezamos por un potrero piloto y medimos los resultados.

Escribinos por WhatsApp

+54 9 2262 48-7998

Asesoramiento técnico sin costo · Argentina y Bolivia

BioAgroSolutions · Línea Green Science