

# Splošna topologija

Luka Horjak ([lukahorjak@student.uni-lj.si](mailto:lukahorjak@student.uni-lj.si))

29. november 2021

# Kazalo

<b>Uvod</b>	<b>3</b>
<b>1 Prostori in preslikave</b>	<b>4</b>
1.1 Topološki prostori . . . . .	4
1.2 Zvezne preslikave . . . . .	5
1.3 Homeomorfizmi . . . . .	6
1.4 Baze in predbaze . . . . .	7
1.5 Podprostori . . . . .	9
<b>2 Topološke lastnosti</b>	<b>11</b>
2.1 Ločljivost . . . . .	11
<b>Stvarno kazalo</b>	<b>14</b>

## Uvod

V tem dokumentu so zbrani moji zapiski s predavanj predmeta Splošna topologija v letu 2021/22. Predavatelj v tem letu je bil prof. dr. Petar Pavešić.

Zapiski niso popolni. Manjka večina zgledov, ki pomagajo pri razumevanju definicij in izrekov. Poleg tega nisem dokazoval čisto vsakega izreka, pogosto sem kakšnega označil kot očitnega ali pa le nakazal pomembnejše korake v dokazu.

Zelo verjetno se mi je pri pregledu zapiskov izmuznila kakšna napaka – popravki so vselej dobrodošli.

# 1 Prostori in preslikave

## 1.1 Topološki prostori

**Definicija 1.1.1.** Naj bo  $X$  množica. *Topologija* na  $X$  je družina  $\tau$  podmnožic  $X$ , ki zadošča pogojem:

- i)  $\emptyset, X \in \tau$ ,
- ii) poljubna unija elementov  $\tau$  je element  $\tau$ ,
- iii) poljuben končen presek elementov  $\tau$  je element  $\tau$ .

*Topološki prostor* je par  $(X, \tau)$ . Elementom  $\tau$  pravimo *odprte množice*, njihovim komplementom pa *zaprte*.

**Opomba 1.1.1.1.** V metričnih prostorih  $(X, d)$  odprte množice<sup>1</sup> tvorijo topologijo  $\tau_d$ .

**Definicija 1.1.2.** Topološki prostor  $(X, \tau)$  je *metrizabilen*, če obstaja taka metrika  $d$  na  $X$ , da je  $\tau = \tau_d$  pri zgornjih oznakah.

**Opomba 1.1.2.1.** Za metriko  $d'(x, x') = \min \{d(x, x'), 1\}$  velja  $\tau_d = \tau_{d'}$ .

<sup>1</sup> Tu vzamemo definicijo odprtih množic v metričnih prostorih.

## 1.2 Zvezne preslikave

**Definicija 1.2.1.** Preslikava  $f: (X, \tau) \rightarrow (X', \tau')$  je *zvezna*, če je praslika vsake odprte množice odprta, oziroma

$$V \in \tau' \implies f^{-1}(V) \in \tau.$$

**Opomba 1.2.1.1.** Zvezne preslikave med metričnimi prostori so zvezne tudi glede na z metrikami porojene topologije.

**Opomba 1.2.1.2.** Identiteta  $\text{id}: (X, \tau) \rightarrow (X, \tau')$  je zvezna natanko tedaj, ko je  $\tau' \subseteq \tau$ . Pravimo, da je topologija  $\tau$  *finejša*,  $\tau'$  pa *bolj groba*.

**Trditev 1.2.2.** Kompozitum zveznih preslikav je zvezna preslikava.

*Dokaz.* Naj bosta  $f: (X, \tau) \rightarrow (X', \tau')$  in  $g: (X', \tau') \rightarrow (X'', \tau'')$  zvezni. Sledi

$$V \in \tau'' \implies g^{-1}(V) \in \tau' \implies (g \circ f)^{-1}(V) \in \tau. \quad \square$$

**Opomba 1.2.2.1.** Množico vseh zveznih preslikav med  $(X, \tau)$  in  $(Y, \tau')$  označimo z  $\mathcal{C}((X, \tau), (Y, \tau'))$ , oziroma  $\mathcal{C}(X, Y)$ .

**Izrek 1.2.3.** Naslednje izjave so ekvivalentne:

- i)  $f: (X, \tau) \rightarrow (Y, \tau')$  je zvezna,
- ii)  $V \in \tau' \implies f^{-1}(V) \in \tau$ ,
- iii)  $B^c \in \tau' \implies (f^{-1}(B))^c \in \tau$ ,
- iv)  $\forall A \subseteq X: f(\overline{A}) \subseteq \overline{f(A)}$ .

*Dokaz.* Prvi dve trditvi sta očitno ekvivalentni po definiciji zveznosti. 2. in 3. trditev sta očitno ekvivalentni, saj velja  $f^{-1}(B^c) = f^{-1}(B)^c$ . Dokažimo še ekvivalenco 3. in 4. trditve.

Naj bo  $A \subseteq X$  poljubna in predpostavimo, da velja 3. trditev. Sledi, da je

$$A \subseteq f^{-1}(f(A)) \subseteq f^{-1}(\overline{f(A)}).$$

Desna stran je zaprta množica, zato je  $\overline{A} \subseteq f^{-1}(\overline{f(A)})$  in

$$f(\overline{A}) \subseteq \overline{f(A)}.$$

Sedaj predpostavimo, da velja 4. točka. Naj bo  $B$  poljubna zaprta podmnožica  $Y$ . Potem je

$$f(\overline{f^{-1}(B)}) \subseteq \overline{f(f^{-1}(B))} \subseteq \overline{B} = B.$$

Sledi, da je

$$\overline{f^{-1}(B)} \subseteq f^{-1}(B),$$

zato je  $f^{-1}(B)$  zaprta.  $\square$

### 1.3 Homeomorfizmi

**Definicija 1.3.1.** Funkcija  $f: X \rightarrow X'$  določa *homeomorfizem* med prostoroma  $(X, \tau)$  in  $(X', \tau')$ , če je  $f$  bijekcija in obenem inducirana bijekcija  $f: \tau \rightarrow \tau'$ . Pišemo  $(X, \tau) \approx (X', \tau')$  in pravimo, da sta prostora *homeomorfn*.

**Definicija 1.3.2.** Preslikava je *odprta*, če je slika vsake odprte podmnožice  $X$  odprta v  $X'$ . Simetrično definiramo *zaprte* preslikave.

**Trditev 1.3.3.** Naslednje izjave so ekvivalentne:

- i)  $f: X \rightarrow X'$  je homeomorfizem,
- ii)  $f$  je bijekcija,  $f$  in  $f^{-1}$  sta zvezni,
- iii)  $f$  je zvezna, odprta bijekcija,
- iv)  $f$  je zvezna, zaprta bijekcija.

*Dokaz.* The proof is obvious and need not be mentioned. □

**Definicija 1.3.4.** *Topološka lastnost* je vsaka lastnost topologije, ki se ohranja pri homeomorfizmih.

**Opomba 1.3.4.1.** Kompaktnost in povezanost sta topološki lastnosti, polnost pa ne.

**Definicija 1.3.5.** Definiramo naslednje množice:

- i)  $B^n = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^n \mid \|\vec{x}\| \leq 1\}$  – zaprta enotska krogla
- ii)  $\mathring{B}^n = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^n \mid \|\vec{x}\| < 1\}$  – odprta enotska krogla
- iii)  $S^{n-1} = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^n \mid \|\vec{x}\| = 1\}$  – enotska sfera

**Trditev 1.3.6.** Velja  $\mathring{B}^n \approx \mathbb{R}^n$ .

*Dokaz.* Vzamemo bijekcijo

$$f(\vec{x}) = \frac{\vec{x}}{1 - \|\vec{x}\|}.$$

□

**Trditev 1.3.7.** Velja  $S^{n-1} \setminus \{(0, 0, \dots, 1)\} \approx \mathbb{R}^{n-1}$ .

*Dokaz.* Naredimo inverzijo v točki  $(0, 0, \dots, 1)$ . □

**Opomba 1.3.7.1.** Zgornji preslikavi pravimo *stereografska projekcija*.

**Opomba 1.3.7.2.** Posebej velja  $S^2 \approx \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ . Temu prostoru pravimo *Riemannova sfera*.

## 1.4 Baze in predbaze

**Definicija 1.4.1.** Družina odprtih množic  $\mathcal{B} \subseteq \tau$  je *baza* topologije  $\tau$ , če lahko vsak element  $\tau$  dobimo kot unijo elementov  $\mathcal{B}$ .

**Trditev 1.4.2.** Naj bo  $\mathcal{B}$  baza topologije  $\tau$  množice  $x$ .  $A \subseteq X$  je odprta natanko tedaj, ko za vsak  $x \in A$  obstaja  $B \in \mathcal{B}$ , za katero je  $x \in B$  in  $B \subseteq A$ .

*Dokaz.* The proof is obvious and need not be mentioned. □

**Trditev 1.4.3.** Naj bo  $f: (X, \tau) \rightarrow (X', \tau')$ ,  $\mathcal{B}$  baza  $\tau$  in  $\mathcal{B}'$  baza  $\tau'$ . Potem velja

- i)  $f$  je zvezna natanko tedaj, ko je  $f^{-1}(\mathcal{B}') \subseteq \tau$  in
- ii)  $f$  je odprta natanko tedaj, ko je  $f(\mathcal{B}) \subseteq \tau'$ .

*Dokaz.* The proof is obvious and need not be mentioned. □

**Definicija 1.4.4.** Naj bo  $\mathcal{B}_x \subseteq \tau$  neka poddružina topologije, katere elementi vsebujejo  $x$ . Pravimo, da je  $\mathcal{B}_x$  *lokalna baza* okolice pri  $x$ , če za vsak  $U \in \tau$ , ki vsebuje  $x$ , obstaja  $B \in \mathcal{B}_x$ , za katero je  $B \subseteq U$ .

**Trditev 1.4.5.** Naj bo  $\mathcal{B}$  družina podmnožic  $X$  in  $\tau$  množica unij elementov  $\mathcal{B}$ . Potem je  $\tau$  topologija natanko tedaj, ko je  $\mathcal{B}$  pokritje  $X$  in velja

$$\forall B_1, B_2 \in \mathcal{B}, x \in B_1 \cap B_2 \exists B \in \mathcal{B}: x \in B \wedge B \subseteq B_1 \cap B_2.$$

*Dokaz.* The proof is obvious and need not be mentioned. □

**Definicija 1.4.6.** Naj bo  $\mathcal{P}$  neka družina podmnožic  $X$ . Množica  $\mathcal{B}$  vseh končnih presekov elementov  $\mathcal{P}$  je baza. Družini  $\mathcal{P}$  pravimo *predbaza* baze  $\mathcal{B}$ .

**Trditev 1.4.7.** Naj bo  $f: (X, \tau) \rightarrow (X', \tau')$  in  $\mathcal{P}'$  podbaza za  $\tau'$ . Potem je  $f$  zvezna natanko tedaj, ko je  $f^{-1}(\mathcal{P}') \subseteq \tau$ .

*Dokaz.* The proof is obvious and need not be mentioned. □

**Trditev 1.4.8.** Preslikava  $f: Z \rightarrow X_1 \times \cdots \times X_n$  je zvezna za produktno topologijo<sup>2</sup> natanko tedaj, ko so zvezne vse komponente  $f$ .

*Dokaz.* Očitno je trditev dovolj dokazati za  $n = 2$ . Naj bo  $f: Z \rightarrow X \times Y$  zvezna. Potem sta komponenti kartezični produkt projekcije z  $f$ , ki sta obe zvezni.

Če sta obe komponenti zvezni, pa ni težko videti, da so praslike pasov odprte, ti pa tvorijo predbasis. □

**Definicija 1.4.9.** Prostor je *1-števen*, če za vsak  $x$  obstaja števna lokalna baza pri  $x$ . Prostor je *2-števen*, če ima števno bazo.

<sup>2</sup> Produktna topologija je topologija, ki jo dobimo iz baze  $\{U_1 \times \cdots \times U_n \mid \forall i: U_i \in \tau_i\}$ .

**Trditev 1.4.10.** Naj bo  $X$  1-števen topološki prostor. Potem za vsak  $A \in \mathcal{A}$  velja, da je  $\overline{A} = L(A) = \{x \mid x \text{ je limita zaporedja v } A\}$ .

*Dokaz.* Za vsak  $x \in \overline{A}$  obstaja števna lokalna baza, zato lahko za vsak člen zaporedja preprosto izberemo poljuben

$$a_n \in A \cap \bigcap_{i=1}^n B_i. \quad \square$$

**Trditev 1.4.11.**  $f: X \rightarrow Y$  je zvezna natanko tedaj, ko za vsak  $A \subseteq X$  velja  $f(L(A)) \subseteq L(f(A))$ .

**Definicija 1.4.12.** Množica  $A \subseteq X$  je *gosta*, če je  $\overline{A} = X$ .

**Definicija 1.4.13.** Prostor  $(X, \tau)$  je *separabilen*, če v njem obstaja števna gosta množica.

**Izrek 1.4.14.** Metrični prostor je 2-števen natanko tedaj, ko je separabilen.

*Dokaz.* Naj bo  $Q$  števna in gosta podmnožica  $X$ . Sedaj preprosto vzamemo

$$\mathcal{B} = \{\mathcal{K}(q, r) \mid q \in Q, r \in \mathbb{Q}\}. \quad \square$$



## 1.5 Podprostori

**Definicija 1.5.1.** Naj bo  $(X, \tau)$  topološki prostor in  $A \subseteq X$ . Množica

$$\tau_A = \{A \cap U \mid U \in \tau\}$$

je topologija na  $A$ , ki ji pravimo *inducirana* ali *podedovana topologija*. Prostor  $(A, \tau_A)$  je *podprostor* prostora  $(X, \tau)$ .

**Trditev 1.5.2.** Zaprte množice v  $A$  so preseki  $A$  z zaprtimi množicami  $X$ .

*Dokaz.* The proof is obvious and need not be mentioned. □

**Trditev 1.5.3.** Naj bo  $\mathcal{B}$  baza  $\tau$ . Potem je

$$\mathcal{B}_A = \{B \cap A \mid B \in \mathcal{B}\}$$

baza inducirane topologije.

**Definicija 1.5.4.** Topološka lastnost je *dedna*, če se prenaša na podprostore.

**Opomba 1.5.4.1.** Separabilnost ni dedna lastnost, a se deduje na odprte podprostore. Podobno se kompaktnost deduje na zaprte podprostore.

**Trditev 1.5.5.** Naj bo  $B \subseteq A \subseteq X$ . Potem je

$$\text{Cl}_A B = A \cap \text{Cl}_X B, \quad \text{Int}_A B \supseteq A \cap \text{Int}_X B \quad \text{in} \quad \text{Fr}_A B \subseteq A \cap \text{Fr}_X B.$$

*Dokaz.* Velja

$$\begin{aligned} \text{Cl}_A B &= \bigcap \{F \mid B \subseteq F \subseteq A \wedge F \text{ je zaprta v } A\} \\ &= \bigcap \{A \cap F \mid B \subseteq F \subseteq X \wedge F \text{ je zaprta v } X\} \\ &= A \cap \text{Cl}_X B. \end{aligned}$$

Podobno je

$$\begin{aligned} \text{Int}_A B &= \bigcup \{U \mid U \subseteq A \wedge U \subseteq B \wedge U \text{ je odprta v } A\} \\ &= \bigcup \{A \cap U \mid U \subseteq X \wedge U \cap A \subseteq B \wedge U \text{ je odprta v } X\} \\ &\supseteq A \cap \left( \bigcup \{U \mid U \subseteq X \wedge U \subseteq B \wedge U \text{ je odprta v } X \text{ in } B\} \right) \\ &= A \cap \text{Int}_X B. \end{aligned}$$

Zadnja inkluzija je direktna posledica prejšnje enakosti in inkluzije. □

**Trditev 1.5.6.** Če je  $B$  odprta v  $A$  in  $A$  odprta v  $X$ , je  $B$  odprta v  $X$ . Podobno, če je  $B$  zaprta v  $A$  in  $A$  zaprta v  $X$ , je  $B$  zaprta v  $X$ .

*Dokaz.* The proof is obvious and need not be mentioned. □

**Trditev 1.5.7.** Inkluzija  $i: (A, \tau_A) \hookrightarrow (X, \tau)$  je zvezna.

*Dokaz.* The proof is obvious and need not be mentioned. □

**Trditev 1.5.8.** Skrčitev zvezne funkcije na podprostor je zvezna.

*Dokaz.* The proof is obvious and need not be mentioned.  $\square$

**Definicija 1.5.9.** Pokritjem  $\{X_\lambda\}$  topološkega prostora pravimo *atlas*.

**Izrek 1.5.10.** Naj bo  $\{X_\lambda\}$  odprto pokritje za  $X$ . Potem velja

$$A \text{ je odprta v } X \iff \forall \lambda: A \cap X_\lambda \text{ je odprta v } X_\lambda.$$

Če je  $\{X_\lambda\}$  zaprto in lokalno končno pokritje za  $X$ , velja

$$A \text{ je zaprta v } X \iff \forall \lambda: A \cap X_\lambda \text{ je zaprta v } X_\lambda.$$

*Dokaz.* Če je  $A \cap X_\lambda$  odprta v  $X$  za vse  $\lambda$ , je  $A$  odprta v  $X$ , saj je

$$A = \bigcup_{\lambda} A \cap X_\lambda.$$

Naj bo sedaj  $A \cap X_\lambda$  zaprta v  $X$  za vse  $\lambda$ .<sup>3</sup> Naj bo  $x \in X \setminus A$  in  $U$  okolica  $x$ , ki seka končno mnogo elementov  $\{X_\lambda\}$  – naj bodo to  $X_{\lambda_1}, \dots, X_{\lambda_n}$ . Sledi, da je

$$x \in U \setminus \bigcup_{i=1}^n A \cap X_{\lambda_i},$$

kar je odprta okolica  $x$ , ki ne seka  $A$ .  $\square$

**Izrek 1.5.11.** Naj bo  $\{X_\lambda\}$  odprto ali lokalno končno zaprto pokritje  $X$  in  $f: X \rightarrow Y$  funkcija. Potem velja

$$f \text{ je zvezna} \iff \forall \lambda: f|_{X_\lambda} \text{ je zvezna.}$$

*Dokaz.* Naj bo  $\{X_\lambda\}$  odprto pokritje. Za odprto množico  $U \subseteq Y$  velja

$$f^{-1}(U) = \bigcup_{\lambda} f^{-1}(U) \cap X_\lambda = \bigcup_{\lambda} (f|_{X_\lambda})^{-1}(U),$$

kar je odprto v  $X$ .

Naj bo  $\{X_\lambda\}$  lokalno končno zaprto pokritje. Za zaprto množico  $F \subseteq Y$  velja

$$f^{-1}(F) = \bigcup_{\lambda} f^{-1}(F) \cap X_\lambda = \bigcup_{\lambda} (f|_{X_\lambda})^{-1}(F),$$

kar je zaprto v  $X$ .  $\square$

**Definicija 1.5.12.** Preslikava  $f: X \rightarrow Y$  je *vložitev*, če je  $f: X \rightarrow f(X)$  homeomorfizem.

---

<sup>3</sup> Obe preostali implikaciji sta direktna posledica definicije inducirane topologije.

## 2 Topološke lastnosti

### 2.1 Ločljivost

**Definicija 2.1.1.** Pravimo, da topologija *loči* disjunktni množici  $A, B \subseteq X$ , če obstajata taki množici  $U, V \in \tau$ , da velja

$$A \subseteq U, \quad B \subseteq V, \quad B \cap U = \emptyset \quad \text{in} \quad A \cap V = \emptyset.$$

Pravimo, da topologija *ostro loči* množici, če sta v zgornji definiciji  $U$  in  $V$  disjunktni.

**Definicija 2.1.2.** Topološki prostor  $(X, \tau)$  je *Hausdorffov*, če  $\tau$  ostro loči vse točke.

**Trditev 2.1.3.** Naslednje izjave so ekvivalentne:

- i)  $X$  je Hausdorffov
- ii) Za vse  $x \neq y$  obstaja tak  $U \in \tau$ , da je  $x \in U$  in  $y \notin \bar{U}$
- iii) Diagonala<sup>4</sup> je zaprt podprostor v  $X \times X$ .

*Dokaz.* Če je prostor Hausdorffov, lahko preprosto vzamemo  $U$  iz definicije. Sledi, da  $y \notin \bar{U}$ . Če velja druga točka, pa lahko preprosto vzamemo  $V = \bar{U}^c$ .

Naj bo  $x \neq y$ ,  $U$  in  $V$  pa taki odprti množici, da je  $x \in U$  in  $y \in V$ .  $U$  in  $V$  sta disjunktni natanko tedaj, ko  $U \times V$  ne seka diagonale. Če je prostor Hausdorffov, lahko preprosto vzamemo  $U$  iz definicije. Obratno, če je diagonala zaprta, obstaja škatlasta okolica  $(x, y)$ , ki ne seka diagonale, iz te pa dobimo zelene okolice.  $\square$

**Izrek 2.1.4.** Naj bo  $Y$  Hausdorffov.

- i) Vsaka končna podmnožica  $Y$  je zaprta
- ii) Zaporedja v  $Y$  imajo največ eno limito
- iii) Če sta  $f, g: X \rightarrow Y$  zvezni, je  $\{x \in X \mid f(x) = g(x)\}$  zaprta v  $X$
- iv) Če se zvezni preslikavi  $f, g: X \rightarrow Y$  ujemata na gosti podmnožici  $X$ , sta enaki
- v) Graf zvezne preslikave  $f: X \rightarrow Y$  je zaprt v  $X \times Y$ .

*Dokaz.* Prvi dve točki sta očitni.

Vidimo, da je  $(f, g)$  zvezna, velja pa  $\{x \in X \mid f(x) = g(x)\} = (f, g)^{-1}(\Delta_x)$ .

4. točka sledi iz 3. – če se preslikavi ujemata na neki množici, se ujemata tudi na zaprtju.

Za dokaz 5. točke definirajmo preslikavi  $u, v: X \times Y \rightarrow Y$  z  $u(x, y) = f(x)$  in  $v(x, y) = y$ . Množica točk ujemanja  $u$  in  $v$  je ravno graf  $\Gamma_f = \{(x, y) \in X \times Y \mid y = f(x)\} \subseteq X \times Y$  funkcije  $f$ , ki je po 3. točki zaprt.  $\square$

**Izrek 2.1.5.** Naj bo  $X$  1-števen in  $Y$  Hausdorffov. Potem je preslikava  $f: X \rightarrow Y$  zvezna natanko tedaj, ko za vsako konvergentno zaporedje v  $X$  velja

$$f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n).$$

<sup>4</sup> Diagonala je množica  $\Delta_x = \{(x, x) \mid x \in X\}$ .

*Dokaz.* Privzemimo, da je  $f$  zvezna in opazujemo zaporedje  $(x_n)$  v  $X$ , ki konvergira proti  $x$ . Za poljubno okolico  $U$  točke  $f(x)$  je zaradi zveznosti  $f^{-1}(U)$  okolica točke  $x$ , kar pomeni, da so v  $f^{-1}(U)$  skoraj vsi elementi zaporedja  $(x_n)$ . Od tod pa sledi, da so v  $U$  skoraj vsi elementi zaporedja  $(f(x_n))$ , torej je  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x)$ .

Predpostavimo sedaj, da  $f$  ohranja limite. Naj bo  $x$  točka, ki je v zaprtju množice  $A \subseteq X$ , in naj bo  $U_1, U_2, \dots$  neka baza okolic za  $x$ . Tedaj za vsak  $n$  lahko izberemo točko  $x_n \in A \cap U_1 \cap \dots \cap U_n$  (ker je ta množica neprazna, saj je  $U_1 \cap \dots \cap U_n$  odprta okolica  $x$ , ki je iz zaprtja  $A$ ). Tako smo konstruirali zaporedje  $(x_n)$ , ki konvergira proti točki  $x$  in so obenem vsi  $f(x_n) \in f(A)$ . Po predpostavki je

$$f(x) = f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \in \overline{f(A)}.$$

To pa pomeni, da za poljuben  $A \subseteq X$  velja  $f(\overline{A}) \subseteq \overline{f(A)}$ , torej je  $f$  zvezna po izreku 1.2.3.  $\square$

**Definicija 2.1.6.** Prostor  $(X, \tau)$  je *Fréchetov*, če  $\tau$  loči točke.

**Trditev 2.1.7.**  $X$  je Fréchetov natanko tedaj, ko  $\tau$  finejša od topologije končnih komplementov.

*Dokaz.* Če je prostor Fréchetov, za vse različne  $x$  in  $y$  obstaja tak  $V \in \tau$ , da je  $y \in V$  in  $x \notin V$ , zato je  $y$  notranja v  $X \setminus \{x\}$ . Če pa so enojčki zaprti, pa  $X \setminus \{x\}$  in  $X \setminus \{y\}$  ločita  $x$  in  $y$ .  $\square$

**Trditev 2.1.8.** Hausdorffova in Fréchetova lastnost sta dedni in multiplikativni.<sup>5</sup>

*Dokaz.* The proof is obvious and need not be mentioned.  $\square$

**Definicija 2.1.9.** Prostor  $(X, \tau)$  je regularen, če je Hausdorffov in  $\tau$  ostro loči točke od zaprtih množic.

**Definicija 2.1.10.** Prostor  $(X, \tau)$  je normalen, če je Hausdorffov in  $\tau$  ostro loči disjunktne zaprte množice.

**Izrek 2.1.11.** Če je  $X$  metričen, je normalen.

*Dokaz.* Očitno je  $X$  Hausdorffov, zato je dovolj dokazati, da  $\tau$  ostro loči disjunktne zaprte množice. Naj bosta  $A$  in  $B$  taki množici. Sedaj preprosto vzamemo

$$U = \{x \in X \mid d(x, A) < d(x, B)\} \quad \text{in} \quad V = \{x \in X \mid d(x, B) < d(x, A)\}.$$

Ni težko videti, da sta ti množici res odprti in disjunktni.  $\square$

**Trditev 2.1.12.** Regularnost je dedna, normalnost pa se deduje na zaprte podprostore.

*Dokaz.* The proof is obvious and need not be mentioned.  $\square$

**Izrek 2.1.13.** Prostor, ki je regularen in 2-števen, je normalen.

<sup>5</sup> Lastnost je *multiplikativna*, če za vse prostore  $X$  in  $Y$  s to lastnostjo velja, da jo ima tudi  $X \times Y$ .

*Dokaz.* Naj bosta  $A$  in  $B$  disjunktni zaprti množici v  $X$  s števno bazo  $\mathcal{B}$ .

Za vsak  $a \in A$  obstajata taki disjunktni odprti množici  $U_a$  in  $U'_a$ , da je  $a \in U_a$  in  $B \subseteq U'_a$ . Za  $U_a$  lahko vzamemo kar bazično okolico. Unija

$$\bigcup_{a \in A} U_a$$

je tako števno pokritje  $A$ , ki je disjunktno  $B$ . Podobno lahko najdemo števno pokritje

$$\bigcup_{b \in B} V_b$$

množice  $B$ , ki je disjunktno  $A$ . Te množice lahko zapišemo v zaporedjih  $(U_n)$  in  $(V_n)$ . Sedaj preprosto vzamemo

$$U'_i = U_i \setminus \bigcup_{j \leq i} \overline{V_j} \quad \text{in} \quad V'_i = V_i \setminus \bigcup_{j \leq i} \overline{U_j}.$$

Uniji teh množic sta disjunktni in odprti. □

**Definicija 2.1.14.** Različne stopnje ločljivosti označimo na naslednji način:<sup>6</sup>

$T_0$ : Za vse  $x \neq y$  ima vsaj ena izmed njiju okolico, ki ne vsebuje druge.

$T_1$ : Prostor je Fréchetov.

$T_2$ : Prostor je Hausdorffov.

$T_3$ : Za vsako zaprto množico  $A$  in  $x \notin A$  obstajata okolici, ki ju ostro ločita.

$T_4$ : Topologija ostro loči disjunktno zaprte množice.

**Trditev 2.1.15.** Prostor je  $T_3$  natanko tedaj, ko za vsako odprto množico  $U$  in  $x \in U$  obstaja taka odprta množica  $V$ , da je  $x \in V$  in  $\overline{V} \subseteq U$ .

*Dokaz.* The proof is obvious and need not be mentioned. □

**Trditev 2.1.16.** Regularnost je multiplikativna.

*Dokaz.* Naj bo  $U$  odprta množica in  $x \in U$ . Brez škode za splošnost naj bo  $U$  bazična. Sedaj uporabimo regularnost na komponentah in vzamemo njun kartezični produkt. □

**Trditev 2.1.17.** Prostor je  $T_4$  natanko tedaj, ko za vsako zaprto množico  $A$ , vsebovano v odprti množici  $U$ , obstaja taka odprta množica  $V$ , za katero je  $A \subseteq V$  in  $\overline{V} \subseteq U$ .

*Dokaz.* The proof is obvious and need not be mentioned. □

---

<sup>6</sup> Oznaka ni enotna.

# Stvarno kazalo

## G

Gosta množica, [8](#)

## P

Preslikava

Odprta, zaprta, [6](#)

Stereografska projekcija, [6](#)

Vložitev, [10](#)

Zvezna, [5](#)

## T

Topologija, [4](#)

Baza, [7](#)

Lokalna, [7](#)

Predbaza, [7](#)

Finejša, bolj groba, [5](#)

Homeomorfizem, [6](#)

Inducirana, [9](#)

Odprte, zaprte množice, [4](#)

Topološka lastnost, [6](#)

Dedna, [9](#)

Topološka lastnost

Fréchetova, [12](#)

Hausdorffova, [11](#)

Ločljivost, [11](#)

Topološki prostor, [4](#)

1, 2-števen, [7](#)

Atlas, [10](#)

Homeomorfen, [6](#)

Metrizabilen, [4](#)

Podprostor, [9](#)

Riemannova sfera, [6](#)

Separabilen, [8](#)